실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	최상희	생년월일(성별)	1945.03.02 (여)	본인부담률	감경 12%	
생활실	501	입소일	2021.02.19	등급	2등급	
작성일	2022.07.12	조사사유	□ 1. 신규 ■ 2. 재사정 □ 3. 상태변화			

구 분	4점	3점	2점	1점	점수	
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	2	
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2	
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	1	
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2	
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	4	
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		3	
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4	
합계점수						

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

전신부종으로 소변배출이 안되어 충대병원 퇴원시 도뇨관 하고오심. 낙상위험이 높아 관찰필요함.목욕시 과체중으로 인해 주의필요

작성자명: 유순호 유(윤홍)

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	최상희	생년월일(성별)	1945.03.02 (여)	본인부담률	감경 12%	
생활실	502	입소일	2021.02.19	급	2등급	
작성일	2022.09.14	조사사유	유 □ 1. 신규 ■ 2. 재사정 □ 3. 상태변화			

구 분	4점	3점	2점	1점	점수	
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	2	
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2	
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	1	
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2	
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	4	
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		3	
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4	
합계점수						
※ Huhn의 낙상위험도 척도 (한계점수 해석)						

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

과체중으로 인해 휠체어로 이동 시 낙상위험이 높아서 주의가 필요 함.

작성자명: 유순호 유(윤遠)

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	최상희	생년월일(성별)	1945.03.02 (여)	본인부담률	일반 20%	
생활실	502	입소일	2021.02.19	등급	2등급	
작성일	2023.09.15	조사사유	□ 1. 신규 ■ 2. 재사정 □ 3. 상태변화			

구 분	4점	3점	2점	1점	점수	
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	2	
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4	
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	1	
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2	
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	4	
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4	
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4	
합계점수						

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

완전 운동장애, 스스로 수행할수 있는 동작이 없으며, 휠체어에 앉아있을때도 과체중과 몸의 중심을 잡지 못하여 낙사위험이 상당히 높으므로 주의가 필요함.

작성자명: 권해숙

行列会

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	최상희	생년월일(성별)	1945.03.02 (여)	본인부담률	감경 12%	
생활실	502	입소일	2021.02.19	- - - - -	1등급	
작성일	2024.07.30	조사사유	조사사유 □ 1. 신규 □ 2. 재사정 ■ 3. 상태변화			

구 분	4점	3점	2점	1점	점수	
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	2	
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4	
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	1	
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2	
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	4	
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4	
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4	
합계점수						

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

완전 운동장애, 스스로 수행할 수 있는 동작이 없으며, 낙상위험이 높으므로 주의가 필요함.

작성자명 : 유순호 🔭(윤홍)

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	최상희	생년월일(성별)	1945.03.02 (여)	본인부담률	감경 12%
생활실	502	입소일	2021.02.19	- - - - -	1등급
작성일	2024.09.13	조사사유 □ 1. 신규 ■ 2. 재사정 □ 3. 상태변화			

구 분	4점	3점	2점	1점	점수	
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	2	
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4	
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	1	
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2	
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	4	
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4	
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4	
합계점수						

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

완전 운동장애, 스스로 수행할 수 있는 동작이 없으며, 낙상위험이 높으므로 주의가 필요함.

작성자명 : 유순호 🔭 🔂 🕏

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	최상희	생년월일(성별)	1945.03.02 (여)	본인부담률	감경 12%	
생활실	501	입소일	2021.02.19	디피	1등급	
작성일	2025.03.05	조사사유	나유 □ 1. 신규 ■ 2. 재사정 □ 3. 상태변화			

구 분	4점	3점	2점	1점	점수	
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	2	
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4	
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	1	
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		2	
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	4	
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4	
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4	
합계점수						

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

· 4점 이하 : 낙상위험 낮음 · 5-10 점 : 낙상위험 높음

· 11점 이상: 낙상위험 아주 높음

비고

완전 운동장애, 스스로 수행할 수 있는 동작이 없으며, 낙상위험이 높으므로 주의가 필요함.

작성자명: 권해숙

行动会