

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	김부순	생년월일(성별)	1934.03.25 (여)	본인부담률	일반 20%
생활실	201	입소일	2023.10.23	등급	3등급
작성일	2023.10.23	조사사유	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 신규 <input type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		4
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					24

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	20년전 낙상으로 인한 하지 근력약화로 인하여 거동이 불가하였고 2021년 12월경 재낙상있었고 낙상위험 높음
----	---

작성자명 : 권해숙



낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	김부순	생년월일(성별)	1934.03.25 (여)	본인부담률	일반 20%
생활실	201	입소일	2023.10.23	등급	3등급
작성일	2024.01.08	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		4
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					24

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	20년전 낙상으로 인한 하지 근력약화로 인하여 거동이 불가하였고 2021년 12월경 재낙상, 23년 9월 빈번한 낙상발생하여 낙상위험 높음.
----	--

작성자명 : 유순호

유순호

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	김부순	생년월일(성별)	1934.03.25 (여)	본인부담률	일반 20%
생활실	201	입소일	2023.10.23	등급	3등급
작성일	2024.02.14	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		2
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		4
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					24

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	3번이상 빈번한 낙상발생으로 대퇴골수술 후유증으로 거동어려움이 있고 낙상위험 높음.
----	--

작성자명 : 권해숙

권해숙

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	김부순	생년월일(성별)	1934.03.25 (여)	본인부담률	일반 20%
생활실	201	입소일	2023.10.23	등급	3등급
작성일	2024.06.10	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input type="checkbox"/> 2. 재사정 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		4
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					26

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	3번이상 빈번한 낙상발생으로 대퇴골수술 후유증, 이석증으로 어지러움증을 동반하여 낙상위험이 높음.
----	--

작성자명 : 유순호

유순호

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	김부순	생년월일(성별)	1934.03.25 (여)	본인부담률	일반 20%
생활실	301	입소일	2023.10.23	등급	3등급
작성일	2024.12.10	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애		때때로 혼란스러움 / 방향감각장애		4
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요		유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		4
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립 / 세면대, 화장실 이용	3
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기		4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					26

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	3번이상 빈번한 낙상발생으로 대퇴골수술 후유증, 이석증으로 어지러움증을 동반하여 낙상위험이 높음.
----	---

작성자명 : 조민정

조민정

낙상위험도 평가지

실버메디컬 복지센터 노인요양원&재가

수급자	김부순	생년월일(성별)	1934.03.25 (여)	본인부담률	일반 20%
생활실	301	입소일	2023.10.23	등급	3등급
작성일	2025.02.21	조사사유	<input type="checkbox"/> 1. 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 재사정 <input type="checkbox"/> 3. 상태변화		

구 분	4점	3점	2점	1점	점수
연령	<div></div>	80세 이상	70-79세	60-69세	3
정신상태	혼란스러움 / 방향감각장애	<div></div>	때때로 혼란스러움 / 방향감각장애	<div></div>	4
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움 필요	<div></div>	유치도뇨관 / 인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐	<div></div>	이미 한 번 또는 두 번 넘어짐	<div></div>	4
활동	전적으로 도움을 받음	자리에서 일어나 앉기 도움	<div></div>	자립 / 세면대, 화장실 이용	3
걸음걸이 및 균형	불규칙 / 불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지 못함	일어서기 / 걸을 때 기립성 빈혈 / 혈액순환문제	보행장애 / 보조도구나 도움으로 걷기	<div></div>	4
지난 7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용	<div></div>	4
합계점수					26

※ Huhn의 낙상위험도 척도 (합계점수 해석)

- 4점 이하 : 낙상위험 낮음
- 5-10 점 : 낙상위험 높음
- 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음

비고	3번이상 빈번한 낙상발생으로 대퇴골수술 후유증, 이석증으로 어지러움증을 동반하여 낙상위험이 높음.
----	--

작성자명 : 김영희

김영희