#1 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.063
g_2 = 0.081
θ_{int} = -0.047
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.1
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0049
Δy_{disk} = -0.0048
r_{vscale} = 0.03

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3766
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 1.5
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 988
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
f_0^{Spec2} = 50.1

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1030
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
f_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 953
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -3.5
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 935
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 928
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -3.5
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_v=1.2
χ^2 = 1100
dof = 936

Wavelength (Å)


#1
g_1 0.08 ± 0.06
g_2 0.08 ± 0.04
θ_{int} -0.03 ± 0.04
v_{circ} 222.74 ± 17.83
cos (i) 0.11 ± 0.02
$r_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.09 ± 0.07
Hb : v_0 2.12 ± 3.33
Hb : I_0^{Spec1} 50.16 ± 3.94
Hb : I_0^{Spec2} 52.51 ± 4.13
Hb : I_0^{Spec3} 58.49 ± 4.16
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -3.13 ± 2.02
Ha : I_0^{Spec1} 50.95 ± 3.54
Ha : I_0^{Spec2} 54.18 ± 3.77
Ha : I_0^{Spec3} 48.38 ± 3.94
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.18

#2 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = -0.031
g_2 = 0.029
θ_{int} = 0.016
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.24
$r_{hl,\,disk}$ = 0.83
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0048
Δy_{disk} = -0.0049
r_{vscale} = 0.05

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3893
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 11.6
f_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1042
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 11.6
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 965
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 11.6
f_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1072
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.0
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 997
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -1.0
f_0^{Spec2} = 60.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1015
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -1.0
f_0^{Spec3} = 60.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 986
dof = 936

Wavelength (Å)

#2

g_1 0.00 ± 0.11
g_2 0.03 ± 0.02
θ_{int} 0.03 ± 0.02
v_{circ} 212.72 ± 7.76
cos (*i*) 0.28 ± 0.07
$r_{hl,disk}$ 0.81 ± 0.08
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.01 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.08 ± 0.05
Hb : v_0 11.94 ± 3.88
Hb : I_0^{Spec1} 44.46 ± 3.82
Hb : I_0^{Spec2} 49.52 ± 4.32
Hb : I_0^{Spec3} 57.44 ± 4.09
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.57 ± 2.09
Ha : I_0^{Spec1} 48.24 ± 3.50
Ha : I_0^{Spec2} 60.12 ± 4.19
Ha : I_0^{Spec3} 60.31 ± 3.85
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17

#3 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.059
g_2 = 0.047
θ_{int} = 0.016
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.46
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0053
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.03

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3811
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 4.0
l_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 978
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 4.0
l_0^{Spec2} = 70.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 994
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 4.0
l_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 954
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
l_0^{Spec1} = 50.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1013
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
l_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 896
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -3.5
l_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 928
dof = 936

Wavelength (Å)

#3

g_1 0.03 ± 0.10
g_2 0.05 ± 0.01
θ_{int} 0.00 ± 0.02
v_{circ} 220.13 ± 15.16
cos (*i*) 0.48 ± 0.10
$r_{hl,disk}$ 0.80 ± 0.08
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.07 ± 0.04
Hb : v_0 2.81 ± 3.46
Hb : I_0^{Spec1} 45.18 ± 3.75
Hb : I_0^{Spec2} 69.37 ± 4.51
Hb : I_0^{Spec3} 50.61 ± 4.02
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -3.34 ± 2.21
Ha : I_0^{Spec1} 52.57 ± 3.44
Ha : I_0^{Spec2} 56.94 ± 4.37
Ha : I_0^{Spec3} 58.12 ± 3.66
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#4 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.063
g_2 = 0.025
θ_{int} = 0.047
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.73
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = 0.0052
r_{vscale} = 0.05

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3795
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -1.0
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 990
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -1.0
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 997
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
f_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 973
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
f_0^{Spec1} = 55.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1012
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 968
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
f_0^{Spec3} = 60.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1048
dof = 936

Wavelength (Å)

#4

g_1 0.05 ± 0.05
g_2 0.02 ± 0.01
θ_{int} 0.04 ± 0.02
v_{circ} 222.09 ± 25.65
cos (*i*) 0.72 ± 0.07
$r_{hl,disk}$ 0.77 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.07 ± 0.04
Hb : v_0 -1.68 ± 3.73
Hb : I_0^{Spec1} 50.19 ± 3.80
Hb : I_0^{Spec2} 52.61 ± 4.43
Hb : I_0^{Spec3} 56.02 ± 3.93
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : v_0 0.65 ± 2.07
Ha : I_0^{Spec1} 55.72 ± 3.48
Ha : I_0^{Spec2} 48.41 ± 4.41
Ha : I_0^{Spec3} 58.72 ± 3.76
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.18
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#5 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.047
g_2 = 0.049
θ_{int} = -0.016
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.91
$r_{hl,\,disk}$ = 0.75
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0045
Δy_{disk} = 0.0049
r_{vscale} = 0.04

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3698
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
f_0^{Spec1} = 60.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1002
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -3.5
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 941
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -3.5
f_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1046
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 1.5
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 940
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
f_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 989
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 1.5
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 909
dof = 936

Wavelength (Å)

#5

g_1 0.05 ± 0.02
g_2 0.05 ± 0.01
θ_{int} -0.01 ± 0.03
v_{circ} 212.36 ± 29.90
cos (*i*) 0.90 ± 0.03
$r_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.01
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.01 ± 0.01
r_{vscale} 0.07 ± 0.04
Hb : v_0 -3.02 ± 3.00
Hb : I_0^{Spec1} 59.57 ± 3.84
Hb : I_0^{Spec2} 48.19 ± 4.29
Hb : I_0^{Spec3} 53.50 ± 3.96
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : v_0 0.55 ± 2.15
Ha : I_0^{Spec1} 48.28 ± 3.32
Ha : I_0^{Spec2} 55.18 ± 4.09
Ha : I_0^{Spec3} 52.69 ± 3.65
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17

#6 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 42

g_1 = 0.13
g_2 = 0.089
θ_{int} = 0.55
v_{circ} = 2.3e+02
cos (i) = 0.1
$r_{hl,\,disk}$ = 0.71
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0051
Δy_{disk} = 0.0052
r_{vscale} = 0.15

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3854
dof = 3819

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -6.0
I_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 928
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -6.0
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 988
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -6.0
I_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 929
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 953
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 934
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 1.5
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 890
dof = 936

Wavelength (Å)

#6

g_1 0.11 ± 0.04
g_2 0.10 ± 0.05
θ_{int} 0.55 ± 0.05
v_{circ} 232.45 ± 21.14
cos (*i*) 0.11 ± 0.02
$r_{hl,disk}$ 0.72 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.21 ± 0.11
Hb : v_0 -6.26 ± 4.10
Hb : I_0^{Spec1} 47.44 ± 3.83
Hb : I_0^{Spec2} 51.62 ± 4.14
Hb : I_0^{Spec3} 48.15 ± 4.32
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 2.12 ± 2.06
Ha : I_0^{Spec1} 48.89 ± 3.54
Ha : I_0^{Spec2} 54.12 ± 3.90
Ha : I_0^{Spec3} 55.22 ± 3.83
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#7 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.079
g_2 = 0.077
θ_{int} = 0.52
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.28
$r_{hl,\,disk}$ = 0.75
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0053
Δy_{disk} = 0.0045
r_{vscale} = 0.09

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3840
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -1.0
l_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 997
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -1.0
l_0^{Spec2} = 60.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 890
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.0
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 976
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 994
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 913
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 938
dof = 936

Wavelength (Å)

#7

g_1 0.05 ± 0.06
g_2 0.05 ± 0.09
θ_{int} 0.51 ± 0.02
v_{circ} 216.74 ± 8.67
cos (*i*) 0.31 ± 0.07
$r_{hl,disk}$ 0.78 ± 0.08
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.12 ± 0.06
Hb : v_0 0.31 ± 3.41
Hb : I_0^{Spec1} 53.19 ± 3.88
Hb : I_0^{Spec2} 62.37 ± 4.51
Hb : I_0^{Spec3} 54.22 ± 4.04
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 2.45 ± 2.68
Ha : I_0^{Spec1} 44.56 ± 3.44
Ha : I_0^{Spec2} 56.11 ± 4.54
Ha : I_0^{Spec3} 49.55 ± 3.79
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#8 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.029
g_2 = 0.043
θ_{int} = 0.49
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.46
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0052
Δy_{disk} = 0.0055
r_{vscale} = 0.04

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3775
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 4.1
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 990
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 4.1
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 996
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 4.1
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 953
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -6.0
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 1086
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -6.0
f_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 971
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -6.0
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 899
dof = 936

Wavelength (Å)


#8
g_1 0.02 ± 0.06
g_2 0.05 ± 0.09
θ_{int} 0.50 ± 0.02
v_{circ} 212.88 ± 16.02
cos (i) 0.49 ± 0.11
$r_{hl,disk}$ 0.79 ± 0.08
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.01
r_{rscale} 0.06 ± 0.03
Hb : v_0 4.98 ± 3.56
Hb : i_0^{Spec1} 51.56 ± 3.64
Hb : i_0^{Spec2} 51.41 ± 4.46
Hb : i_0^{Spec3} 48.03 ± 3.88
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -5.10 ± 2.38
Ha : i_0^{Spec1} 52.55 ± 3.42
Ha : i_0^{Spec2} 55.77 ± 4.41
Ha : i_0^{Spec3} 50.70 ± 3.61
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#9 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.037
g_2 = 0.045
θ_{int} = 0.52
v_{circ} = 1.9e+02
cos (i) = 0.64
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0052
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.04

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3924
dof = 3819

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -3.5
l_0^{Spec1} = 50.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 949
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -3.5
l_0^{Spec2} = 45.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 902
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1037
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -3.5
l_0^{Spec1} = 50.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1007
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
l_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 862
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -3.5
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 980
dof = 936

Wavelength (Å)

#9

g_1 0.02 ± 0.04
g_2 0.00 ± 0.07
θ_{int} 0.52 ± 0.02
v_{circ} 207.36 ± 25.83
cos (*i*) 0.64 ± 0.10
$r_{hl,disk}$ 0.81 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.06 ± 0.03
Hb : v_0 -3.55 ± 3.15
Hb : I_0^{Spec1} 49.31 ± 3.70
Hb : I_0^{Spec2} 47.46 ± 4.26
Hb : I_0^{Spec3} 56.42 ± 3.84
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -3.67 ± 2.11
Ha : I_0^{Spec1} 50.79 ± 3.38
Ha : I_0^{Spec2} 56.12 ± 4.14
Ha : I_0^{Spec3} 56.35 ± 3.60
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#10 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.049
g_2 = 0.045
θ_{int} = 0.52
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.89
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0049
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.12

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3794
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -3.5
f_0^{Spec1} = 45.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 895
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -3.5
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 971
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
f_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 864
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
f_0^{Spec1} = 55.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 978
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
f_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 957
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 1.5
f_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 874
dof = 936

Wavelength (Å)

#10

g_1 0.05 ± 0.01
g_2 0.04 ± 0.02
$\theta_{\rm int}$ 0.53 ± 0.02
$v_{\rm circ}$ 212.83 ± 31.24
cos (*i*) 0.88 ± 0.04
$r_{\rm hl,\,disk}$ 0.77 ± 0.02
log ($F_{\rm disk}$) 4.39 ± 0.00
$\Delta x_{\rm disk}$ -0.00 ± 0.01
$\Delta y_{\rm disk}$ -0.01 ± 0.01
$r_{\rm vscale}$ 0.13 ± 0.06
Hb : v_0 -3.10 ± 2.99
Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ 43.13 ± 3.79
Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ 53.38 ± 4.05
Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ 59.79 ± 3.91
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.68 ± 1.81
Ha : $I_0^{\rm Spec1}$ 54.98 ± 3.31
Ha : $I_0^{\rm Spec2}$ 61.44 ± 3.60
Ha : $I_0^{\rm Spec3}$ 59.23 ± 3.53
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.01 ± 0.17

#11 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 39

g_1 = -0.027
g_2 = 0.18
θ_{int} = 0.99
v_{circ} = 2.3e+02
cos (i) = 0.16
$r_{hl,\,disk}$ = 0.68
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0048
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.16

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3896
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
f_0^{Spec1} = 40.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 928
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -1.0
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 971
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.0
f_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1018
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
f_0^{Spec1} = 55.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 927
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -1.0
f_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 980
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 911
dof = 936

Wavelength (Å)

#11

g_1 -0.02 ± 0.04
g_2 0.14 ± 0.04
θ_{int} 1.01 ± 0.04
v_{circ} 242.54 ± 23.74
cos (*i*) 0.15 ± 0.02
$r_{hl,disk}$ 0.70 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{rscale} 0.28 ± 0.19
Hb : v_0 -0.18 ± 4.39
Hb : I_0^{Spec1} 38.73 ± 3.82
Hb : I_0^{Spec2} 52.21 ± 4.54
Hb : I_0^{Spec3} 53.37 ± 4.14
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.33 ± 2.03
Ha : I_0^{Spec1} 53.90 ± 3.45
Ha : I_0^{Spec2} 54.39 ± 3.97
Ha : I_0^{Spec3} 50.43 ± 3.64
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#12 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.033
g_2 = 0.12
θ_{int} = 1.1
v_{circ} = 2.3e+02
cos (i) = 0.31
$r_{hl,\,disk}$ = 0.72
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0052
Δy_{disk} = -0.0049
r_{vscale} = 0.03

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3953
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
l_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 934
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
l_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 944
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 934
dof = 936

Spec set A slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 55.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 902
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 55.0

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 978
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 966
dof = 936

Wavelength (Å)

#12

g_1 0.06 ± 0.05
g_2 0.08 ± 0.07
θ_{int} 1.06 ± 0.02
v_{circ} 228.31 ± 8.62
cos (*i*) 0.32 ± 0.06
$r_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.07
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.08 ± 0.05
Hb : v_0 -3.50 ± 3.75
Hb : I_0^{Spec1} 45.98 ± 3.83
Hb : I_0^{Spec2} 55.67 ± 4.35
Hb : I_0^{Spec3} 57.11 ± 4.19
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.18
Ha : v_0 1.17 ± 2.15
Ha : I_0^{Spec1} 53.20 ± 3.52
Ha : I_0^{Spec2} 54.97 ± 4.01
Ha : I_0^{Spec3} 55.45 ± 3.73
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#13 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.16
g_2 = -0.093
θ_{int} = 1.1
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.33
$r_{hl,\,disk}$ = 0.92
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.03

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3932
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 6.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 984
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 6.5
l_0^{Spec2} = 70.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 985
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 6.5
l_0^{Spec3} = 65.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 900
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 974
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 60.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 931
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1062
dof = 936

Wavelength (Å)

#13

g_1 0.12 ± 0.05
g_2 -0.03 ± 0.09
$\theta_{\rm int}$ 1.07 ± 0.02
$v_{\rm circ}$ 210.46 ± 11.60
cos (*i*) 0.41 ± 0.10
$r_{\rm hl,\,disk}$ 0.86 ± 0.09
log ($F_{\rm disk}$) 4.40 ± 0.00
$\Delta x_{\rm disk}$ 0.01 ± 0.01
$\Delta y_{\rm disk}$ -0.01 ± 0.00
$r_{\rm vscale}$ 0.06 ± 0.03
Hb : v_0 6.39 ± 2.96
Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ 52.02 ± 3.78
Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ 68.01 ± 4.10
Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ 66.26 ± 4.06
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 1.98 ± 1.96
Ha : $I_0^{\rm Spec1}$ 56.03 ± 3.47
Ha : $I_0^{\rm Spec2}$ 59.70 ± 3.77
Ha : $I_0^{\rm Spec3}$ 55.40 ± 3.74
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.01 ± 0.18
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#14 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 39

g_1 = 0.081
g_2 = 0.013
θ_{int} = 1.1
v_{circ} = 1.9e+02
cos (i) = 0.58
$r_{hl,\,disk}$ = 0.8
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0053
Δy_{disk} = 0.0049
r_{vscale} = 0.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 4026
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 4.0
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 958
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 4.0
l_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 951
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 4.0
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 979
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
l_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 972
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -1.0
l_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 906
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -1.0
l_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 958
dof = 936

Wavelength (Å)

#14

g_1 0.10 ± 0.05
g_2 -0.02 ± 0.07
θ_{int} 1.06 ± 0.02
v_{circ} 202.59 ± 22.38
cos (*i*) 0.58 ± 0.11
$r_{hl,disk}$ 0.84 ± 0.07
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} -0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.01 ± 0.01
r_{vscale} 0.11 ± 0.04
Hb : v_0 4.20 ± 3.05
Hb : I_0^{Spec1} 50.04 ± 3.67
Hb : I_0^{Spec2} 53.38 ± 3.95
Hb : I_0^{Spec3} 57.11 ± 3.91
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.16 ± 1.75
Ha : I_0^{Spec1} 55.13 ± 3.32
Ha : I_0^{Spec2} 53.99 ± 3.41
Ha : I_0^{Spec3} 58.06 ± 3.63
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17

#15 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.057
g_2 = 0.049
θ_{int} = 1
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.89
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0052
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.09

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3823
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 1.6
I_0^{Spec1} = 50.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1004
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 1.6
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 942
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.6
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 950
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 55.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_v=1.0
χ^2 = 934
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 954
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 50.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 916
dof = 936

Wavelength (Å)


#15
g_1 0.06 ± 0.01
g_2 0.04 ± 0.02
θ_{int} 1.02 ± 0.03
v_{circ} 210.49 ± 31.05
cos (i) 0.88 ± 0.04
$r_{hL,disk}$ 0.78 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} -0.01 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.12 ± 0.06
Hb : v_0 2.43 ± 3.14
Hb : I_0^{Spec1} 48.70 ± 3.70
Hb : I_0^{Spec2} 51.94 ± 3.86
Hb : I_0^{Spec3} 53.58 ± 3.77
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.58 ± 1.89
Ha : I_0^{Spec1} 55.91 ± 3.30
Ha : I_0^{Spec2} 52.36 ± 3.32
Ha : I_0^{Spec3} 51.26 ± 3.52
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#16 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.13
g_2 = 0.023
θ_{int} = 1.6
v_{circ} = 2.4e+02
cos (i) = 0.07
$r_{hl,\,disk}$ = 0.85
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = -0.0047
r_{vscale} = 0.22

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3964
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -6.0
f_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_v=1.0
χ^2 = 912
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -6.0
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1030
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -6.0
f_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 927
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -3.5
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 991
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -3.5
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 960
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -3.5
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 917
dof = 936

Wavelength (Å)

#16

g_1 0.12 ± 0.04
g_2 0.04 ± 0.06
θ_{int} 1.56 ± 0.05
v_{circ} 248.17 ± 21.00
cos (*i*) 0.07 ± 0.01
$n_{hl,disk}$ 0.84 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.26 ± 0.13
Hb : v_0 -7.02 ± 3.41
Hb : I_0^{Spec1} 56.21 ± 3.89
Hb : I_0^{Spec2} 50.71 ± 4.53
Hb : I_0^{Spec3} 56.66 ± 4.02
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : v_0 -2.42 ± 2.17
Ha : I_0^{Spec1} 49.85 ± 3.55
Ha : I_0^{Spec2} 54.96 ± 4.01
Ha : I_0^{Spec3} 50.63 ± 3.68
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#17 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 42

g_1 = 0.007
g_2 = 0.059
θ_{int} = 1.6
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.28
$r_{hl,\,disk}$ = 0.72
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0051
Δy_{disk} = 0.0049
r_{vscale} = 0.07

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3853
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 932
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1033
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1048
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
l_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 940
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -1.0
l_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 973
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.0
l_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 912
dof = 936

Wavelength (Å)

#17

g_1 0.01 ± 0.10
g_2 0.06 ± 0.02
θ_{int} 1.59 ± 0.02
v_{circ} 222.17 ± 9.07
cos (*i*) 0.34 ± 0.08
$r_{hl,disk}$ 0.74 ± 0.08
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.10 ± 0.05
Hb : v_0 0.74 ± 3.27
Hb : I_0^{Spec1} 53.53 ± 3.82
Hb : I_0^{Spec2} 62.24 ± 4.68
Hb : I_0^{Spec3} 57.27 ± 4.02
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.09 ± 2.16
Ha : I_0^{Spec1} 54.85 ± 3.61
Ha : I_0^{Spec2} 53.65 ± 4.46
Ha : I_0^{Spec3} 61.20 ± 3.79
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#18 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 42

g_1 = 0.18
g_2 = 0.037
θ_{int} = 1.6
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.38
$r_{hl,\,disk}$ = 0.88
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0049
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.12

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3813
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -3.6
f_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 914
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -3.6
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 942
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.6
f_0^{Spec3} = 65.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 998
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 1.5
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 892
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 1.5
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 938
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 1.5
f_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1034
dof = 936

Wavelength (Å)

#18

g_1 0.10 ± 0.07
g_2 0.04 ± 0.01
θ_{int} 1.57 ± 0.02
v_{circ} 222.35 ± 11.89
cos (*i*) 0.45 ± 0.08
$r_{hl,disk}$ 0.82 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.01 ± 0.00
r_{vscale} 0.12 ± 0.05
Hb : v_0 -4.22 ± 3.18
Hb : I_0^{Spec1} 52.71 ± 3.77
Hb : I_0^{Spec2} 49.33 ± 4.45
Hb : I_0^{Spec3} 63.42 ± 4.00
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 1.25 ± 2.22
Ha : I_0^{Spec1} 50.70 ± 3.49
Ha : I_0^{Spec2} 55.04 ± 4.20
Ha : I_0^{Spec3} 54.53 ± 3.75
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#19 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 39

g_1 = 0.083
g_2 = 0.061
θ_{int} = 1.6
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.64
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0063
Δy_{disk} = 0.0051
r_{vscale} = 0.13

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3901
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 1.5
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 980
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 1.5
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 950
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
f_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 978
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 4.0
f_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 954
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 4.0
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1023
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 4.0
f_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 982
dof = 936

Wavelength (Å)

#19

g_1 0.08 ± 0.07
g_2 0.06 ± 0.01
θ_{int} 1.61 ± 0.02
v_{circ} 216.00 ± 25.11
cos (*i*) 0.65 ± 0.09
$r_{hl,disk}$ 0.79 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.13 ± 0.06
Hb : v_0 2.90 ± 3.41
Hb : I_0^{Spec1} 52.76 ± 3.78
Hb : I_0^{Spec2} 57.50 ± 4.05
Hb : I_0^{Spec3} 53.77 ± 3.94
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 3.52 ± 2.27
Ha : I_0^{Spec1} 47.61 ± 3.40
Ha : I_0^{Spec2} 55.96 ± 4.00
Ha : I_0^{Spec3} 53.02 ± 3.63
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#20 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.043
g_2 = 0.059
θ_{int} = 1.6
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.89
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0053
Δy_{disk} = 0.0049
r_{vscale} = 0.09

χ^2_v=1.1
χ^2 = 4097
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 893
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1065
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1016
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 6.5
I_0^{Spec1} = 50.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 952
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 6.5
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 956
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 6.5
I_0^{Spec3} = 60.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 929
dof = 936

Wavelength (Å)

#20

g_1 0.05 ± 0.02
g_2 0.06 ± 0.01
θ_{int} 1.56 ± 0.03
v_{circ} 211.58 ± 30.28
cos (i) 0.88 ± 0.03
$r_{hl,disk}$ 0.77 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.01 ± 0.01
r_{vscale} 0.11 ± 0.06
Hb : v_0 -0.35 ± 2.86
Hb : I_0^{Spec1} 49.92 ± 3.82
Hb : I_0^{Spec2} 57.73 ± 4.08
Hb : I_0^{Spec3} 59.17 ± 3.91
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 6.40 ± 1.91
Ha : I_0^{Spec1} 50.07 ± 3.39
Ha : I_0^{Spec2} 51.58 ± 3.75
Ha : I_0^{Spec3} 58.83 ± 3.67
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

g_1 g_2 θ_{int} v_{circ} cos (i) $r_{hl,disk}$ log (F_{disk}) Δx_{disk} Δy_{disk} r_{vscale} Hb : v_0 Hb : I_0^{Spec1} Hb : I_0^{Spec2} Hb : I_0^{Spec3} Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{vel,Spec}$ Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : v_0 Ha : I_0^{Spec1} Ha : I_0^{Spec2} Ha : I_0^{Spec3} Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$

#21 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = -0.021
g_2 = 0.16
θ_{int} = 2.2
v_{circ} = 2.3e+02
cos (i) = 0.08
$r_{hl,\,disk}$ = 0.82
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.19

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3888
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -1.0
f_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 963
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -1.0
f_0^{Spec2} = 45.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 963
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -1.0
f_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 964
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 4.0
f_0^{Spec1} = 55.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1005
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 4.0
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 929
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 4.0
f_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 943
dof = 936

Wavelength (Å)

#21

g_1 -0.02 ± 0.05
g_2 0.13 ± 0.04
θ_{int} 2.19 ± 0.05
v_{circ} 237.28 ± 25.67
cos (*i*) 0.09 ± 0.02
$r_{hl,\,disk}$ 0.81 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.23 ± 0.13
Hb : v_0 -1.48 ± 3.09
Hb : I_0^{Spec1} 45.18 ± 3.97
Hb : I_0^{Spec2} 47.76 ± 4.21
Hb : I_0^{Spec3} 53.87 ± 4.13
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 5.02 ± 2.43
Ha : I_0^{Spec1} 53.61 ± 3.81
Ha : I_0^{Spec2} 52.30 ± 3.88
Ha : I_0^{Spec3} 55.40 ± 3.83
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#22 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.041
g_2 = 0.16
θ_{int} = 2.1
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.24
$r_{hl,\,disk}$ = 0.8
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0051
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.11

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3970
dof = 3819

N, E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 976
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1006
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1052
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 55.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 930
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 859
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.0

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 895
dof = 936

Wavelength (Å)

#22

g_1 0.03 ± 0.05
g_2 0.07 ± 0.09
θ_{int} 2.12 ± 0.02
v_{circ} 223.15 ± 8.43
cos (*i*) 0.30 ± 0.07
$r_{hl,disk}$ 0.78 ± 0.08
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.13 ± 0.05
Hb : v_0 -0.15 ± 4.07
Hb : I_0^{Spec1} 51.86 ± 3.83
Hb : I_0^{Spec2} 55.67 ± 4.57
Hb : I_0^{Spec3} 52.84 ± 3.87
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.16 ± 2.50
Ha : I_0^{Spec1} 57.27 ± 3.55
Ha : I_0^{Spec2} 52.64 ± 4.37
Ha : I_0^{Spec3} 53.49 ± 3.65
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17

#23 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.029
g_2 = -0.017
θ_{int} = 2.1
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.57
$r_{hl,\,disk}$ = 0.71
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0048
Δy_{disk} = -0.0046
r_{vscale} = 0.06

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3820
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -1.0
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 970
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
l_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 994
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -1.0
l_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 953
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 6.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1007
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 6.5
l_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 958
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 6.5
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 936
dof = 936

Wavelength (Å)

#23

g_1 0.04 ± 0.05
g_2 0.01 ± 0.08
θ_{int} 2.09 ± 0.02
v_{circ} 231.30 ± 20.40
cos (*i*) 0.56 ± 0.10
$r_{hl,disk}$ 0.74 ± 0.07
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.08 ± 0.04
Hb : v_0 -1.55 ± 3.29
Hb : I_0^{Spec1} 51.42 ± 3.74
Hb : I_0^{Spec2} 59.41 ± 4.55
Hb : I_0^{Spec3} 52.81 ± 3.99
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 6.14 ± 2.32
Ha : I_0^{Spec1} 49.68 ± 3.40
Ha : I_0^{Spec2} 61.08 ± 4.44
Ha : I_0^{Spec3} 56.77 ± 3.60
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

g_1 g_2 θ_{int} v_{circ} cos (*i*) $r_{hl,disk}$ log (F_{disk}) Δx_{disk} Δy_{disk} r_{vscale} Hb : v_0 Hb : I_0^{Spec1} Hb : I_0^{Spec2} Hb : I_0^{Spec3} Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : v_0 Ha : I_0^{Spec1} Ha : I_0^{Spec2} Ha : I_0^{Spec3} Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$

#24 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.069
g_2 = 0.067
θ_{int} = 2.1
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.63
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0052
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.15

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3844
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -1.0
l_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1053
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
l_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 900
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -1.0
l_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1006
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.0
l_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 918
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -1.0
l_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 888
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
l_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1004
dof = 936

Wavelength (Å)

#24

g_1 0.08 ± 0.03
g_2 0.09 ± 0.06
$\theta_{\rm int}$ 2.10 ± 0.02
$v_{\rm circ}$ 215.19 ± 23.21
cos (*i*) 0.63 ± 0.09
$r_{\rm hl,\,disk}$ 0.80 ± 0.06
log ($F_{\rm disk}$) 4.39 ± 0.00
$\Delta x_{\rm disk}$ -0.00 ± 0.01
$\Delta y_{\rm disk}$ -0.00 ± 0.01
$r_{\rm vscale}$ 0.15 ± 0.05
Hb : v_0 -1.16 ± 3.53
Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ 44.35 ± 3.81
Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ 50.08 ± 4.58
Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ 56.53 ± 4.07
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -1.79 ± 2.26
Ha : $I_0^{\rm Spec1}$ 55.91 ± 3.37
Ha : $I_0^{\rm Spec2}$ 53.85 ± 4.41
Ha : $I_0^{\rm Spec3}$ 51.44 ± 3.75
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.18

g_1 g_2 $\theta_{\rm int}$ $v_{\rm circ}$ cos (*i*) $r_{\rm hl,\,disk}$ log ($F_{\rm disk}$) $\Delta x_{\rm disk}$ $\Delta y_{\rm disk}$ $r_{\rm vscale}$ Hb : v_0 Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Ha : v_0 Ha : $I_0^{\rm Spec1}$ Ha : $I_0^{\rm Spec2}$ Ha : $I_0^{\rm Spec3}$ Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$

#25 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.057
g_2 = 0.053
θ_{int} = 2
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.88
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.13

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3802
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -6.1
f_0^{Spec1} = 55.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 989
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -6.1
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 961
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -6.1
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1033
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -3.5
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 906
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 977
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -3.5
f_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 979
dof = 936

Wavelength (Å)

#25

g_1 0.06 ± 0.02
g_2 0.06 ± 0.02
θ_{int} 2.03 ± 0.03
v_{circ} 211.99 ± 30.92
cos (*i*) 0.87 ± 0.04
$r_{hl,disk}$ 0.78 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.15 ± 0.06
Hb : v_0 -5.50 ± 3.39
Hb : I_0^{Spec1} 56.09 ± 3.77
Hb : I_0^{Spec2} 48.71 ± 4.09
Hb : I_0^{Spec3} 48.31 ± 3.89
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -2.98 ± 2.12
Ha : I_0^{Spec1} 51.58 ± 3.40
Ha : I_0^{Spec2} 54.59 ± 3.95
Ha : I_0^{Spec3} 60.30 ± 3.70
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#26 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.12
g_2 = 0.11
θ_{int} = 2.5
v_{circ} = 2.5e+02
cos (i) = 0.07
$r_{hl,\,disk}$ = 0.79
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = 0.0047
r_{vscale} = 0.05

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3818
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -3.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 999
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -3.5
l_0^{Spec2} = 45.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 917
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -3.5
l_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 970
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -3.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 937
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -3.5
l_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 962
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 978
dof = 936

Wavelength (Å)

#26

g_1 0.11 ± 0.05
g_2 0.10 ± 0.05
θ_{int} 2.55 ± 0.05
v_{circ} 255.82 ± 29.15
cos (*i*) 0.08 ± 0.02
$r_{hl,\,disk}$ 0.78 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.15 ± 0.12
Hb : v_0 -4.60 ± 3.10
Hb : I_0^{Spec1} 52.32 ± 3.88
Hb : I_0^{Spec2} 46.01 ± 3.99
Hb : I_0^{Spec3} 52.50 ± 3.86
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -3.02 ± 2.33
Ha : I_0^{Spec1} 50.17 ± 3.38
Ha : I_0^{Spec2} 48.72 ± 3.65
Ha : I_0^{Spec3} 56.41 ± 3.89
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#27 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.045
g_2 = 0.17
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 2.3e+02
cos (i) = 0.23
$r_{hl,\,disk}$ = 0.88
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.07

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3939
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.4
f_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 907
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 1.4
f_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 914
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 1.4
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_v=0.9
χ^2 = 886
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 4.0
f_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1007
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 4.0
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 937
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 4.0
f_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 937
dof = 936

Wavelength (Å)

#27

g_1 0.06 ± 0.04
g_2 0.10 ± 0.07
θ_{int} 2.58 ± 0.02
v_{circ} 229.27 ± 9.01
cos (i) 0.28 ± 0.06
$r_{hl,disk}$ 0.82 ± 0.07
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.10 ± 0.06
Hb : v_0 0.82 ± 3.14
Hb : I_0^{Spec1} 55.33 ± 3.82
Hb : I_0^{Spec2} 55.00 ± 4.28
Hb : I_0^{Spec3} 50.56 ± 4.06
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 3.42 ± 2.57
Ha : I_0^{Spec1} 43.23 ± 3.50
Ha : I_0^{Spec2} 52.31 ± 4.18
Ha : I_0^{Spec3} 54.54 ± 3.95
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#28 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.047
g_2 = 0.047
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 2.3e+02
cos (i) = 0.48
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0048
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.16

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3849
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 6.5
f_0^{Spec1} = 55.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 963
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 6.5
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 870
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = 6.5
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 967
dof = 936

Spec set A slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 1.5
f_0^{Spec1} = 60.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 944
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 967
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
f_0^{Spec3} = 60.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 962
dof = 936

Wavelength (Å)

#28

g_1 0.05 ± 0.05
g_2 0.05 ± 0.08
θ_{int} 2.62 ± 0.02
v_{circ} 234.76 ± 15.99
cos (*i*) 0.49 ± 0.09
$r_{hl,disk}$ 0.78 ± 0.07
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.17 ± 0.06
Hb : v_0 5.42 ± 3.43
Hb : I_0^{Spec1} 56.76 ± 3.77
Hb : I_0^{Spec2} 51.32 ± 4.46
Hb : I_0^{Spec3} 47.88 ± 4.10
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 1.15 ± 2.38
Ha : I_0^{Spec1} 58.75 ± 3.49
Ha : I_0^{Spec2} 54.96 ± 4.36
Ha : I_0^{Spec3} 59.41 ± 3.88
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#29 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.047
g_2 = 0.067
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.67
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0051
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.09

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3862
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -1.0
f_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 979
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -1.0
f_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1003
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -1.0
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 944
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 950
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 924
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 1.5
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1075
dof = 936

Wavelength (Å)

#29

g_1 0.04 ± 0.03
g_2 0.09 ± 0.06
$\theta_{\rm int}$ 2.59 ± 0.02
$v_{\rm circ}$ 211.60 ± 22.36
cos (*i*) 0.64 ± 0.09
$r_{\rm hl,\,disk}$ 0.80 ± 0.05
log ($F_{\rm disk}$) 4.39 ± 0.00
$\Delta x_{\rm disk}$ 0.00 ± 0.01
$\Delta y_{\rm disk}$ -0.00 ± 0.01
$r_{\rm vscale}$ 0.11 ± 0.06
Hb : v_0 -1.35 ± 3.41
Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ 44.51 ± 3.78
Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ 61.15 ± 4.44
Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ 52.41 ± 4.08
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.68 ± 2.46
Ha : $I_0^{\rm Spec1}$ 52.40 ± 3.43
Ha : $I_0^{\rm Spec2}$ 57.50 ± 4.43
Ha : $I_0^{\rm Spec3}$ 49.86 ± 3.77
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#30 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.045
g_2 = 0.043
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.89
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0051
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.07

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3740
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 55.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 943
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 962
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 954
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
I_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 997
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
I_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 951
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
I_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 936
dof = 936

Wavelength (Å)

#30

g_1 0.04 ± 0.01
g_2 0.05 ± 0.02
$\theta_{\rm int}$ 2.61 ± 0.03
$v_{\rm circ}$ 211.08 ± 29.58
cos (*i*) 0.88 ± 0.03
$r_{\rm hl,\,disk}$ 0.78 ± 0.02
log ($F_{\rm disk}$) 4.39 ± 0.00
$\Delta x_{\rm disk}$ -0.00 ± 0.01
$\Delta y_{\rm disk}$ -0.00 ± 0.01
$r_{\rm vscale}$ 0.10 ± 0.06
Hb : v_0 -0.40 ± 3.10
Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ 53.25 ± 3.75
Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ 50.83 ± 4.29
Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ 62.27 ± 3.84
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 1.78 ± 2.29
Ha : $I_0^{\rm Spec1}$ 47.10 ± 3.45
Ha : $I_0^{\rm Spec2}$ 58.03 ± 4.11
Ha : $I_0^{\rm Spec3}$ 59.40 ± 3.60
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.01 ± 0.17

g_1 g_2 $\theta_{\rm int}$ $v_{\rm circ}$ cos (*i*) $r_{\rm hl,\,disk}$ log ($F_{\rm disk}$) $\Delta x_{\rm disk}$ $\Delta y_{\rm disk}$ $r_{\rm vscale}$ Hb : v_0 Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Ha : v_0 Ha : $I_0^{\rm Spec1}$ Ha : $I_0^{\rm Spec2}$ Ha : $I_0^{\rm Spec3}$ Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$