#1 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 39

g_1 = -0.085
g_2 = 0.017
θ_{int} = -3.1
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 6.8e-08
$r_{hl,\,disk}$ = 0.89
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = 0.0051
r_{vscale} = 1.7

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3938
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 24.1
l_0^{Spec1} = 40.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1040
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 24.1
l_0^{Spec2} = 45.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 958
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 24.1
l_0^{Spec3} = 45.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 967
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 4.0
l_0^{Spec1} = 35.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1009
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 4.0
l_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 985
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 4.0
l_0^{Spec3} = 40.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 996
dof = 936

Wavelength (Å)

#1

g_1 -0.08 ± 0.03
g_2 -0.07 ± 0.07
θ_{int} -3.04 ± 0.07
v_{circ} 216.56 ± 32.45
cos (*i*) 0.00 ± 0.00
$r_{hl,disk}$ 0.89 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 1.03 ± 0.57
Hb : v_0 23.06 ± 8.04
Hb : I_0^{Spec1} 37.96 ± 4.42
Hb : I_0^{Spec2} 46.40 ± 4.22
Hb : I_0^{Spec3} 46.25 ± 4.54
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 3.26 ± 6.04
Ha : I_0^{Spec1} 35.53 ± 4.24
Ha : I_0^{Spec2} 49.62 ± 4.25
Ha : I_0^{Spec3} 40.36 ± 4.65
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#2 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = -0.031
g_2 = 0.049
θ_{int} = -0.016
v_{circ} = 2.3e+02
cos (i) = 0.25
$r_{hl,\,disk}$ = 0.82
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.15

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3866
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 4.0
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 913
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 4.0
l_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 908
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 4.0
l_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 923
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 939
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 924
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1009
dof = 936

Wavelength (Å)

#2

g_1 0.01 ± 0.10
g_2 0.06 ± 0.03
θ_{int} -0.01 ± 0.04
v_{circ} 235.23 ± 16.03
cos (*i*) 0.28 ± 0.07
$r_{hl,disk}$ 0.81 ± 0.08
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.19 ± 0.10
Hb : v_0 4.44 ± 5.17
Hb : I_0^{Spec1} 50.41 ± 4.06
Hb : I_0^{Spec2} 59.87 ± 4.63
Hb : I_0^{Spec3} 51.20 ± 4.43
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : v_0 0.77 ± 4.27
Ha : I_0^{Spec1} 48.74 ± 4.07
Ha : I_0^{Spec2} 54.20 ± 4.87
Ha : I_0^{Spec3} 52.12 ± 4.39
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#3 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.047
g_2 = 0.059
θ_{int} = -0.016
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.44
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = 0.0052
r_{vscale} = 0.08

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3996
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 4.0
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 957
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 4.0
l_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 986
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 4.0
l_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1023
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 950
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -3.5
l_0^{Spec2} = 55.1

χ^2_v=1.1
χ^2 = 990
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -3.5
l_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1004
dof = 936

Wavelength (Å)

#3

g_1 0.00 ± 0.11
g_2 0.06 ± 0.02
θ_{int} -0.01 ± 0.03
v_{circ} 212.66 ± 16.09
cos (*i*) 0.46 ± 0.11
$r_{hl,disk}$ 0.82 ± 0.09
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.09 ± 0.05
Hb : v_0 5.64 ± 5.12
Hb : I_0^{Spec1} 49.41 ± 4.04
Hb : I_0^{Spec2} 57.10 ± 4.82
Hb : I_0^{Spec3} 58.78 ± 4.30
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : v_0 -2.82 ± 4.12
Ha : I_0^{Spec1} 48.53 ± 4.00
Ha : I_0^{Spec2} 56.37 ± 5.17
Ha : I_0^{Spec3} 51.86 ± 4.43
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

g_1 g_2 θ_{int} v_{circ} cos (*i*) $r_{hl,disk}$ log (F_{disk}) Δx_{disk} Δy_{disk} r_{vscale} Hb : v_0 Hb : I_0^{Spec1} Hb : I_0^{Spec2} Hb : I_0^{Spec3} Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : v_0 Ha : I_0^{Spec1} Ha : I_0^{Spec2} Ha : I_0^{Spec3} Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$

#4 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.039
g_2 = 0.027
θ_{int} = 0.047
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.68
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0047
Δy_{disk} = 0.0048
r_{vscale} = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3881
dof = 3819

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -6.1
I_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 868
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -6.1
I_0^{Spec2} = 45.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 983
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -6.1
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 881
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 978
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 1.5
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 989
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
I_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 942
dof = 936

Wavelength (Å)

#4

g_1 -0.01 ± 0.08
g_2 0.02 ± 0.02
θ_{int} 0.05 ± 0.04
v_{circ} 211.05 ± 27.34
cos (*i*) 0.64 ± 0.11
$r_{hl,disk}$ 0.81 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.14 ± 0.08
Hb : v_0 -5.19 ± 5.11
Hb : I_0^{Spec1} 46.14 ± 3.96
Hb : I_0^{Spec2} 47.19 ± 4.64
Hb : I_0^{Spec3} 54.71 ± 4.33
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : v_0 0.98 ± 3.99
Ha : I_0^{Spec1} 51.07 ± 4.03
Ha : I_0^{Spec2} 52.40 ± 4.97
Ha : I_0^{Spec3} 58.48 ± 4.34
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.18

#5 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 43

g_1 = 0.035
g_2 = 0.043
θ_{int} = 0.047
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.88
$r_{hl,\,disk}$ = 0.79
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0049
Δy_{disk} = -0.0049
r_{vscale} = 0.08

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3692
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -6.1
l_0^{Spec1} = 55.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 961
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -6.1
l_0^{Spec2} = 55.1

χ^2_v=1.0
χ^2 = 959
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -6.1
l_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 975
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -6.1
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 922
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -6.1
l_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 958
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -6.1
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1073
dof = 936

Wavelength (Å)

#5

g_1 0.01 ± 0.05
g_2 0.04 ± 0.01
θ_{int} 0.05 ± 0.05
v_{circ} 215.09 ± 31.03
cos (*i*) 0.84 ± 0.07
$r_{hl,disk}$ 0.81 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.28 ± 0.26
Hb : v_0 -5.40 ± 5.03
Hb : I_0^{Spec1} 53.04 ± 4.02
Hb : I_0^{Spec2} 56.00 ± 4.51
Hb : I_0^{Spec3} 50.82 ± 4.38
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -7.08 ± 4.19
Ha : I_0^{Spec1} 52.82 ± 4.12
Ha : I_0^{Spec2} 48.90 ± 5.00
Ha : I_0^{Spec3} 53.65 ± 4.25
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

g_1 g_2 θ_{int} v_{circ} cos (*i*) $r_{hl,disk}$ log (F_{disk}) Δx_{disk} Δy_{disk} r_{vscale} Hb : v_0 Hb : I_0^{Spec1} Hb : I_0^{Spec2} Hb : I_0^{Spec3} Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : v_0 Ha : I_0^{Spec1} Ha : I_0^{Spec2} Ha : I_0^{Spec3} Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$

#6 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 39

g_1 = -0.13
g_2 = -0.013
θ_{int} = -2.7
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 1.9e-10
$r_{hl,\,disk}$ = 0.85
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0049
Δy_{disk} = 0.0051
r_{vscale} = 0.51

χ^2_v=1.1
χ^2 = 4160
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 1.5
I_0^{Spec1} = 40.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_v=1.0
χ^2 = 943
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 1.5
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 941
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 1.5
I_0^{Spec3} = 45.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1053
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 6.5
I_0^{Spec1} = 35.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0

χ^2_v=1.0
χ^2 = 966
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 6.5
I_0^{Spec2} = 45.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 970
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 6.5
I_0^{Spec3} = 50.1

χ^2_v=1.0
χ^2 = 931
dof = 936

Wavelength (Å)


#6
g_1 -0.04 ± 0.11
g_2 0.02 ± 0.08
θ_{int} -2.68 ± 0.13
v_{circ} 217.60 ± 33.71
cos (i) 0.00 ± 0.00
$r_{hl,disk}$ 0.85 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 1.01 ± 0.57
Hb : v_0 -0.08 ± 6.53
Hb : I_0^{Spec1} 38.19 ± 4.01
Hb : I_0^{Spec2} 51.84 ± 4.04
Hb : I_0^{Spec3} 45.84 ± 4.40
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 5.76 ± 5.02
Ha : I_0^{Spec1} 35.52 ± 4.06
Ha : I_0^{Spec2} 46.11 ± 4.07
Ha : I_0^{Spec3} 47.84 ± 4.32
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#7 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = -0.027
g_2 = -0.067
θ_{int} = 0.52
v_{circ} = 2.3e+02
cos (i) = 0.19
$r_{hl,\,disk}$ = 0.9
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.18

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3996
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -6.0
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 956
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -6.0
f_0^{Spec2} = 50.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 990
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -6.0
f_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 945
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -3.5
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 990
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -3.5
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1008
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 988
dof = 936

Wavelength (Å)

#7

g_1 -0.02 ± 0.08
g_2 -0.03 ± 0.10
θ_{int} 0.50 ± 0.04
v_{circ} 228.91 ± 14.58
cos (*i*) 0.24 ± 0.07
$r_{hl,\,disk}$ 0.86 ± 0.10
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.22 ± 0.10
Hb : v_0 -6.22 ± 5.14
Hb : ζ_0^{Spec1} 49.58 ± 4.03
Hb : ζ_0^{Spec2} 51.56 ± 4.56
Hb : ζ_0^{Spec3} 54.99 ± 4.27
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -3.66 ± 4.08
Ha : ζ_0^{Spec1} 49.77 ± 4.02
Ha : ζ_0^{Spec2} 56.74 ± 4.98
Ha : ζ_0^{Spec3} 50.95 ± 4.37
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#8 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.049
g_2 = 0.019
θ_{int} = 0.52
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.4
$r_{hl,\,disk}$ = 0.75
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0051
Δy_{disk} = 0.0046
r_{vscale} = 0.03

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 4084
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 4.0
f_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 967
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 4.0
f_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 887
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 4.0
f_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1032
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -3.6
f_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 934
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -3.6
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 909
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -3.6
f_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 967
dof = 936

Wavelength (Å)

#8

g_1 0.02 ± 0.07
g_2 -0.01 ± 0.10
θ_{int} 0.51 ± 0.03
v_{circ} 202.52 ± 18.02
cos (*i*) 0.45 ± 0.12
$r_{hl,disk}$ 0.82 ± 0.10
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.08 ± 0.06
Hb : v_0 5.34 ± 5.54
Hb : I_0^{Spec1} 47.24 ± 3.90
Hb : I_0^{Spec2} 54.85 ± 4.62
Hb : I_0^{Spec3} 56.54 ± 4.27
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -3.22 ± 3.75
Ha : I_0^{Spec1} 56.24 ± 3.91
Ha : I_0^{Spec2} 53.68 ± 4.92
Ha : I_0^{Spec3} 59.78 ± 4.30
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17


#9 Observation
Best fit model
Residual (= obs - model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40
g_1 = 0.029
g_2 = 0.031
θ_{int} = 0.49
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.63
$r_{hl, disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = -0.0053
r_{vscale} = 0.17
χ^2_v=1.0
χ^2 = 3857
dof = 3819
N
E
Δ RA (arcsec)
Spec set A
slit position (arcsec)
Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6
v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 45.1
$\Delta x_{vel, Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel, Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel, Spec1}$ = -0.1
χ^2_v=1.0
χ^2 = 954
dof = 936
Spec set C
slit position (arcsec)
Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4
v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 60.3
χ^2_v=1.0
χ^2 = 972
dof = 936
Spec set B
slit position (arcsec)
Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5
v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 50.2
χ^2_v=1.1
χ^2 = 1013
dof = 936
Spec set A
slit position (arcsec)
Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5
v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel, Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel, Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel, Spec1}$ = 0.2
χ^2_v=1.1
χ^2 = 998
dof = 936
Spec set C
slit position (arcsec)
Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3
v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.1
χ^2_v=1.0
χ^2 = 974
dof = 936
Spec set B
slit position (arcsec)
Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5
v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 60.3
χ^2_v=1.0
χ^2 = 958
dof = 936
Wavelength (Å)

#9

g_1 0.01 ± 0.04
g_2 0.01 ± 0.06
θ_{int} 0.50 ± 0.03
v_{circ} 219.52 ± 25.54
cos (*i*) 0.63 ± 0.10
$r_{hl,disk}$ 0.82 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.18 ± 0.06
Hb : v_0 -0.23 ± 5.34
Hb : I_0^{Spec1} 47.19 ± 3.93
Hb : I_0^{Spec2} 60.16 ± 4.51
Hb : I_0^{Spec3} 52.38 ± 4.38
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.71 ± 3.78
Ha : I_0^{Spec1} 51.35 ± 3.96
Ha : I_0^{Spec2} 56.61 ± 4.62
Ha : I_0^{Spec3} 59.45 ± 4.36
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.18
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17

#10 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.035
g_2 = 0.041
θ_{int} = 0.52
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.89
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = 0.0052
r_{vscale} = 0.08

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3892
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -0.9
I_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 957
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -0.9
I_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 879
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -0.9
I_0^{Spec3} = 60.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 945
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -3.5
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 937
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -3.5
I_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 964
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -3.5
I_0^{Spec3} = 45.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 961
dof = 936

Wavelength (Å)

#10

g_1 0.03 ± 0.02
g_2 0.04 ± 0.02
θ_{int} 0.51 ± 0.05
v_{circ} 213.72 ± 32.64
cos (*i*) 0.87 ± 0.05
$r_{hl,disk}$ 0.78 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.01 ± 0.01
r_{vscale} 0.13 ± 0.08
Hb : v_0 -0.98 ± 4.48
Hb : I_0^{Spec1} 53.60 ± 4.07
Hb : I_0^{Spec2} 58.03 ± 4.49
Hb : I_0^{Spec3} 61.29 ± 4.40
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Ha : v_0 -2.81 ± 3.83
Ha : I_0^{Spec1} 49.18 ± 4.12
Ha : I_0^{Spec2} 58.23 ± 4.54
Ha : I_0^{Spec3} 45.68 ± 4.45
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#11 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 42

g_1 = 0.1
g_2 = 0.087
θ_{int} = 1.1
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.095
$r_{hl,\,disk}$ = 0.79
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0046
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.06

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3882
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 9.1
f_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 973
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 9.1
f_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 971
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 9.1
f_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 969
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
f_0^{Spec1} = 50.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 951
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 962
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 975
dof = 936

Wavelength (Å)


#11
g_1 0.08 ± 0.07
g_2 0.08 ± 0.06
θ_{int} 1.09 ± 0.07
v_{circ} 222.44 ± 24.85
cos (i) 0.11 ± 0.03
$r_{hl,disk}$ 0.77 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.22 ± 0.19
Hb : v_0 7.68 ± 4.51
Hb : I_0^{Spec1} 43.30 ± 3.93
Hb : I_0^{Spec2} 57.05 ± 4.54
Hb : I_0^{Spec3} 58.53 ± 4.34
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 1.34 ± 3.93
Ha : I_0^{Spec1} 51.91 ± 4.14
Ha : I_0^{Spec2} 57.41 ± 4.66
Ha : I_0^{Spec3} 52.56 ± 4.50
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.18
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17

#12 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.017
g_2 = -0.037
θ_{int} = 0.99
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.24
$r_{hl,\,disk}$ = 0.82
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0048
Δy_{disk} = -0.0049
r_{vscale} = 0.05

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3812
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 19.1
I_0^{Spec1} = 50.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 945
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 19.1
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 =973
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 19.1
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 971
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 988
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.1

χ^2_v=1.0
χ^2 = 929
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 960
dof = 936

Wavelength (Å)

#12

g_1 0.03 ± 0.06
g_2 -0.01 ± 0.11
θ_{int} 0.99 ± 0.04
v_{circ} 217.25 ± 14.10
cos (*i*) 0.28 ± 0.08
$r_{hl,disk}$ 0.81 ± 0.09
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.14 ± 0.10
Hb : v_0 19.07 ± 5.32
Hb : I_0^{Spec1} 49.77 ± 3.90
Hb : I_0^{Spec2} 51.65 ± 4.39
Hb : I_0^{Spec3} 55.18 ± 4.33
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : v_0 -2.23 ± 3.87
Ha : I_0^{Spec1} 47.80 ± 4.04
Ha : I_0^{Spec2} 57.19 ± 4.67
Ha : I_0^{Spec3} 49.24 ± 4.49
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#13 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.063
g_2 = 0.029
θ_{int} = 1.1
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.43
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0049
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.02

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 4014
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 4.0
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 936
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 4.0
f_0^{Spec2} = 60.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 981
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 4.0
f_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 860
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -8.5
f_0^{Spec1} = 55.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 963
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -8.5
f_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 987
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -8.5
f_0^{Spec3} = 50.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 939
dof = 936

Wavelength (Å)

#13

g_1 0.07 ± 0.06
g_2 0.03 ± 0.09
θ_{int} 1.07 ± 0.03
v_{circ} 223.97 ± 18.19
cos (*i*) 0.48 ± 0.11
$r_{hl,disk}$ 0.80 ± 0.08
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.04 ± 0.03
Hb : v_0 5.69 ± 4.64
Hb : I_0^{Spec1} 51.23 ± 3.96
Hb : I_0^{Spec2} 57.77 ± 4.25
Hb : I_0^{Spec3} 58.23 ± 4.39
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -8.08 ± 3.83
Ha : I_0^{Spec1} 55.77 ± 3.97
Ha : I_0^{Spec2} 60.82 ± 4.32
Ha : I_0^{Spec3} 51.88 ± 4.42
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18

#14 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.073
g_2 = -0.031
θ_{int} = 1
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.55
$r_{hl,\,disk}$ = 0.83
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0051
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.15

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 4109
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
f_0^{Spec1} = 40.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 936
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -3.5
f_0^{Spec2} = 50.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 981
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -3.5
f_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1035
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -8.6
f_0^{Spec1} = 40.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 975
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -8.6
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 945
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -8.6
f_0^{Spec3} = 60.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 958
dof = 936

Wavelength (Å)

#14

g_1 0.08 ± 0.04
g_2 -0.04 ± 0.07
θ_{int} 1.03 ± 0.03
v_{circ} 228.15 ± 23.86
cos (*i*) 0.58 ± 0.10
$r_{hl,disk}$ 0.86 ± 0.07
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.18 ± 0.09
Hb : v_0 -2.90 ± 5.62
Hb : I_0^{Spec1} 40.22 ± 3.88
Hb : I_0^{Spec2} 52.40 ± 4.18
Hb : I_0^{Spec3} 55.15 ± 4.37
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -7.24 ± 3.86
Ha : I_0^{Spec1} 42.18 ± 3.94
Ha : I_0^{Spec2} 49.01 ± 4.22
Ha : I_0^{Spec3} 59.33 ± 4.30
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17

#15 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.061
g_2 = 0.055
θ_{int} = 1.1
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.9
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = 0.0052
r_{vscale} = 0.08

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3826
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 4.0
I_0^{Spec1} = 50.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 950
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 4.0
I_0^{Spec2} = 55.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 933
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 4.0
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 872
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 9.0
I_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 933
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = 9.0
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 900
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 9.0
I_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 930
dof = 936

Wavelength (Å)

#15

g_1 0.06 ± 0.01
g_2 0.05 ± 0.02
$\theta_{\rm int}$ 1.08 ± 0.05
$v_{\rm circ}$ 212.37 ± 31.69
cos (*i*) 0.89 ± 0.04
$r_{\rm hL\,disk}$ 0.76 ± 0.02
log ($F_{\rm disk}$) 4.39 ± 0.00
$\Delta x_{\rm disk}$ -0.01 ± 0.01
$\Delta y_{\rm disk}$ 0.00 ± 0.01
$r_{\rm vscale}$ 0.12 ± 0.08
Hb : v_0 3.58 ± 4.80
Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ 52.27 ± 4.07
Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ 54.52 ± 4.30
Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ 53.88 ± 4.43
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : v_0 8.26 ± 3.77
Ha : $I_0^{\rm Spec1}$ 45.42 ± 3.99
Ha : $I_0^{\rm Spec2}$ 50.26 ± 4.26
Ha : $I_0^{\rm Spec3}$ 50.72 ± 4.43
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#16 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.075
g_2 = 0.085
θ_{int} = 1.6
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.08
$r_{hl,\,disk}$ = 0.79
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = -0.0048
r_{vscale} = 0.19

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3938
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -6.0
I_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 921
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -6.0
I_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 992
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -6.0
I_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 926
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 6.5
I_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 885
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 6.5
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 992
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 6.5
I_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 939
dof = 936

Wavelength (Å)

#16

g_1 0.03 ± 0.08
g_2 0.07 ± 0.07
θ_{int} 1.59 ± 0.07
v_{circ} 226.84 ± 32.82
cos (i) 0.10 ± 0.04
$r_{hl,disk}$ 0.77 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.01 ± 0.00
r_{vscale} 0.26 ± 0.16
Hb : v_0 -5.26 ± 4.99
Hb : I_0^{Spec1} 43.94 ± 3.96
Hb : I_0^{Spec2} 60.15 ± 4.60
Hb : I_0^{Spec3} 50.99 ± 4.35
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 6.09 ± 4.45
Ha : I_0^{Spec1} 47.62 ± 4.09
Ha : I_0^{Spec2} 49.84 ± 4.63
Ha : I_0^{Spec3} 52.48 ± 4.46
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#17 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.12
g_2 = 0.017
θ_{int} = 1.5
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.25
$r_{hl,\,disk}$ = 0.82
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.03

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3767
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 967
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 918
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 997
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 4.0
l_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 926
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 0

v_0 = 4.0
l_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 928
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 4.0
l_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 928
dof = 936

Wavelength (Å)


#17
g_1 0.04 ± 0.11
g_2 0.01 ± 0.03
θ_{int} 1.52 ± 0.03
v_{circ} 222.32 ± 11.93
cos (i) 0.32 ± 0.08
$r_{hl,disk}$ 0.77 ± 0.08
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.07 ± 0.05
Hb : v_0 2.09 ± 5.81
Hb : I_0^{Spec1} 46.15 ± 4.01
Hb : I_0^{Spec2} 51.95 ± 4.70
Hb : I_0^{Spec3} 55.06 ± 4.39
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 3.73 ± 4.00
Ha : I_0^{Spec1} 53.13 ± 4.05
Ha : I_0^{Spec2} 49.61 ± 5.13
Ha : I_0^{Spec3} 56.47 ± 4.37
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#18 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = -0.019
g_2 = 0.033
θ_{int} = 1.5
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.56
$r_{hl,\,disk}$ = 0.73
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = -0.0048
r_{vscale} = 0.03

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3839
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -6.0
f_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 922
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -6.0
f_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 926
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -6.0
f_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 893
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 9.0
f_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 955
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 9.0
f_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 994
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 9.0
f_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 993
dof = 936

Wavelength (Å)

#18

g_1 0.01 ± 0.09
g_2 0.03 ± 0.02
θ_{int} 1.54 ± 0.03
v_{circ} 220.05 ± 19.14
cos (i) 0.54 ± 0.10
$r_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.07
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.06 ± 0.04
Hb : v_0 -6.32 ± 4.98
Hb : I_0^{Spec1} 47.51 ± 3.90
Hb : I_0^{Spec2} 55.21 ± 4.48
Hb : I_0^{Spec3} 57.18 ± 4.36
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 9.21 ± 4.13
Ha : I_0^{Spec1} 42.96 ± 3.94
Ha : I_0^{Spec2} 55.97 ± 4.80
Ha : I_0^{Spec3} 53.08 ± 4.45
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17

g_1 g_2 θ_{int} v_{circ} cos (i) $r_{hl,disk}$ log (F_{disk}) Δx_{disk} Δy_{disk} r_{vscale} Hb : v_0 Hb : I_0^{Spec1} Hb : I_0^{Spec2} Hb : I_0^{Spec3} Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : v_0 Ha : I_0^{Spec1} Ha : I_0^{Spec2} Ha : I_0^{Spec3} Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$

#19 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.041
g_2 = 0.031
θ_{int} = 1.5
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.71
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.02

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3784
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -6.1
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 938
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -6.1
I_0^{Spec2} = 60.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 953
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -6.1
I_0^{Spec3} = 50.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 954
dof = 936

Spec set A slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 6.5
I_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 979
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = 6.5
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 949
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 6.5
I_0^{Spec3} = 60.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 964
dof = 936

Wavelength (Å)


#19
g_1 0.06 ± 0.06
g_2 0.03 ± 0.01
θ_{int} 1.54 ± 0.03
v_{circ} 217.00 ± 30.26
cos (i) 0.69 ± 0.09
$r_{hl,disk}$ 0.78 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.06 ± 0.03
Hb : v_0 -5.14 ± 5.30
Hb : I_0^{Spec1} 48.57 ± 3.99
Hb : I_0^{Spec2} 58.07 ± 4.42
Hb : I_0^{Spec3} 50.81 ± 4.36
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : v_0 7.06 ± 3.71
Ha : I_0^{Spec1} 45.12 ± 4.02
Ha : I_0^{Spec2} 50.60 ± 4.67
Ha : I_0^{Spec3} 57.92 ± 4.38
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#20 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.043
g_2 = 0.059
θ_{int} = 1.7
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.92
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0048
Δy_{disk} = 0.0052
r_{vscale} = 0.03

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3932
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.6
f_0^{Spec1} = 40.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 969
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.6
f_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 949
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 1.6
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 898
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
f_0^{Spec1} = 55.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 972
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
f_0^{Spec2} = 45.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 941
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 1.5
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1019
dof = 936

Wavelength (Å)


#20
g_1 0.05 ± 0.02
g_2 0.06 ± 0.01
θ_{int} 1.67 ± 0.06
v_{circ} 212.51 ± 31.92
cos (i) 0.91 ± 0.03
$r_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.08 ± 0.07
Hb : v_0 2.73 ± 5.28
Hb : I_0^{Spec1} 41.16 ± 4.17
Hb : I_0^{Spec2} 58.55 ± 4.41
Hb : I_0^{Spec3} 48.62 ± 4.53
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : v_0 0.94 ± 4.12
Ha : I_0^{Spec1} 53.76 ± 4.07
Ha : I_0^{Spec2} 45.49 ± 4.57
Ha : I_0^{Spec3} 49.27 ± 4.54
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#21 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 39

g_1 = -0.069
g_2 = 0.095
θ_{int} = 2.2
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.085
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0051
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.09

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3905
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 999
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 1.5
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 973
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 1.5
f_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 933
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -6.1
f_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 1078
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -6.1
f_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 951
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -6.1
f_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 954
dof = 936

Wavelength (Å)

#21

g_1 -0.05 ± 0.07
g_2 0.07 ± 0.07
θ_{int} 2.20 ± 0.07
v_{circ} 226.09 ± 26.88
cos (*i*) 0.10 ± 0.03
$r_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.01 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.24 ± 0.17
Hb : v_0 1.91 ± 5.30
Hb : I_0^{Spec1} 48.50 ± 4.09
Hb : I_0^{Spec2} 51.50 ± 4.39
Hb : I_0^{Spec3} 57.94 ± 4.45
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -5.23 ± 3.82
Ha : I_0^{Spec1} 45.87 ± 4.16
Ha : I_0^{Spec2} 60.23 ± 4.63
Ha : I_0^{Spec3} 58.49 ± 4.65
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#22 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 39

g_1 = -0.013
g_2 = 0.013
θ_{int} = 2.1
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.31
$r_{hl,\,disk}$ = 0.69
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0052
Δy_{disk} = -0.0049
r_{vscale} = 0.03

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 4054
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 990
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 966
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 991
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -8.5
I_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 863
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -8.5
I_0^{Spec2} = 65.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 890
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -8.5
I_0^{Spec3} = 50.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 975
dof = 936

Wavelength (Å)

#22

g_1 -0.02 ± 0.06
g_2 -0.01 ± 0.11
θ_{int} 2.12 ± 0.03
v_{circ} 224.59 ± 12.22
cos (*i*) 0.38 ± 0.10
$r_{hl,disk}$ 0.70 ± 0.08
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.01 ± 0.01
r_{vscale} 0.06 ± 0.03
Hb : v_0 -1.47 ± 5.24
Hb : I_0^{Spec1} 49.83 ± 3.94
Hb : I_0^{Spec2} 55.41 ± 4.70
Hb : I_0^{Spec3} 50.07 ± 4.40
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : v_0 -7.12 ± 4.18
Ha : I_0^{Spec1} 46.66 ± 4.09
Ha : I_0^{Spec2} 63.59 ± 5.15
Ha : I_0^{Spec3} 48.19 ± 4.40
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

g_1 g_2 θ_{int} v_{circ} cos (*i*) $r_{hl,disk}$ log (F_{disk}) Δx_{disk} Δy_{disk} r_{vscale} Hb : v_0 Hb : I_0^{Spec1} Hb : I_0^{Spec2} Hb : I_0^{Spec3} Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : v_0 Ha : I_0^{Spec1} Ha : I_0^{Spec2} Ha : I_0^{Spec3} Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$

#23 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 43

g_1 = 0.007
g_2 = 0.057
θ_{int} = 2.2
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.45
$r_{hl,\,disk}$ = 0.75
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0049
Δy_{disk} = 0.0048
r_{vscale} = 0.12

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3871
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 11.5
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 945
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 11.5
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 928
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 11.5
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1066
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 9.0
f_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 925
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 9.0
f_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 960
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 9.0
f_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1034
dof = 936

Wavelength (Å)

#23

g_1 0.01 ± 0.04
g_2 0.06 ± 0.08
θ_{int} 2.16 ± 0.03
v_{circ} 229.25 ± 19.22
cos (*i*) 0.51 ± 0.10
$r_{hl,disk}$ 0.77 ± 0.07
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.15 ± 0.07
Hb : v_0 11.91 ± 6.22
Hb : I_0^{Spec1} 48.32 ± 4.00
Hb : I_0^{Spec2} 52.11 ± 4.75
Hb : I_0^{Spec3} 52.05 ± 4.36
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 9.96 ± 3.98
Ha : I_0^{Spec1} 46.83 ± 3.97
Ha : I_0^{Spec2} 59.56 ± 5.22
Ha : I_0^{Spec3} 58.65 ± 4.36
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#24 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.077
g_2 = 0.047
θ_{int} = 2.1
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.65
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0051
Δy_{disk} = 0.0051
r_{vscale} = 0.13

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 4085
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -11.1
I_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 888
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -11.1
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 938
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -11.1
I_0^{Spec3} = 40.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 929
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -6.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 911
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -6.0
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 965
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -6.0
I_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 977
dof = 936

Wavelength (Å)

#24

g_1 0.08 ± 0.04
g_2 0.08 ± 0.06
θ_{int} 2.08 ± 0.04
v_{circ} 221.24 ± 27.21
cos (*i*) 0.64 ± 0.10
$r_{hl,disk}$ 0.81 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.17 ± 0.09
Hb : v_0 -11.58 ± 5.84
Hb : I_0^{Spec1} 46.00 ± 3.97
Hb : I_0^{Spec2} 50.00 ± 4.65
Hb : I_0^{Spec3} 42.01 ± 4.36
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -5.72 ± 4.06
Ha : I_0^{Spec1} 48.54 ± 4.05
Ha : I_0^{Spec2} 48.98 ± 4.94
Ha : I_0^{Spec3} 51.79 ± 4.39
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17

#25 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.053
g_2 = 0.065
θ_{int} = 2
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.88
$r_{hl,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0049
Δy_{disk} = -0.0053
r_{vscale} = 0.16

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3973
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 11.6
l_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 951
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 11.6
l_0^{Spec2} = 60.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 950
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 11.6
l_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1005
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -6.1
l_0^{Spec1} = 55.3
$\Delta x_{vel,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 949
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -6.1
l_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1015
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -6.1
l_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 998
dof = 936

Wavelength (Å)


#25
g_1 0.07 ± 0.03
g_2 0.08 ± 0.03
θ_{int} 2.03 ± 0.06
v_{circ} 212.03 ± 32.96
cos (i) 0.84 ± 0.07
$r_{hl,disk}$ 0.79 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.27 ± 0.20
Hb : v_0 10.70 ± 5.40
Hb : I_0^{Spec1} 47.18 ± 4.08
Hb : I_0^{Spec2} 59.50 ± 4.41
Hb : I_0^{Spec3} 54.40 ± 4.38
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.18
Ha : v_0 -6.91 ± 4.04
Ha : I_0^{Spec1} 53.04 ± 4.12
Ha : I_0^{Spec2} 58.86 ± 5.00
Ha : I_0^{Spec3} 48.06 ± 4.37
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#26 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.18
g_2 = -0.057
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 2.3e+02
cos (i) = 0.16
$r_{hl,\,disk}$ = 0.68
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0051
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.55

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3920
dof = 3819

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 966
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1001
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 929
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 896
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 45.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 995
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 50.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 920
dof = 936

Wavelength (Å)

#26

g_1 0.13 ± 0.05
g_2 -0.06 ± 0.08
θ_{int} 2.61 ± 0.05
v_{circ} 229.50 ± 28.12
cos (i) 0.17 ± 0.04
$r_{hl,disk}$ 0.69 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.58 ± 0.23
Hb : v_0 -1.30 ± 4.44
Hb : I_0^{Spect} 53.53 ± 3.97
Hb : I_0^{Spec1}
Hb : I_0^{Spec2} 56.46 ± 4.22
Hb : I_0^{Spec3} 60.38 ± 4.43
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.14 ± 4.48
Ha : I_0^{Spec1} 45.20 ± 4.01
Ha : I_0^{Spec2} 46.23 ± 4.30
Ha : I_0^{Spec3} 49.50 ± 4.35
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#27 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = -0.001
g_2 = 0.073
θ_{int} = 2.7
v_{circ} = 2.8e+02
cos (i) = 0.24
$r_{hl,\,disk}$ = 0.8
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = -0.0048
r_{vscale} = 0.42

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3861
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -1.0
f_0^{Spec1} = 55.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1007
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 997
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
f_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 920
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -1.0
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1016
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 962
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -1.0
f_0^{Spec3} = 45.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1010
dof = 936

Wavelength (Å)


#27
g_1 0.01 ± 0.07
g_2 0.04 ± 0.09
θ_{int} 2.67 ± 0.04
v_{circ} 283.92 ± 22.85
cos (i) 0.29 ± 0.08
$r_{hl,disk}$ 0.79 ± 0.09
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.44 ± 0.14
Hb : v_0 -1.88 ± 5.68
Hb : I_0^{Spec1} 53.49 ± 4.02
Hb : I_0^{Spec2} 47.61 ± 4.60
Hb : I_0^{Spec3} 57.57 ± 4.50
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.90 ± 4.64
Ha : I_0^{Spec1} 51.39 ± 4.18
Ha : I_0^{Spec2} 52.87 ± 4.89
Ha : I_0^{Spec3} 47.35 ± 4.63
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#28 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.047
g_2 = 0.091
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 2.5e+02
cos (i) = 0.45
$r_{hl,\,disk}$ = 0.81
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0054
Δy_{disk} = 0.0053
r_{vscale} = 0.25

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3862
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 1.5
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 973
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 1.5
f_0^{Spec2} = 60.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 991
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 1.5
f_0^{Spec3} = 60.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 930
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -3.5
f_0^{Spec1} = 55.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 919
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 934
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
f_0^{Spec3} = 60.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 948
dof = 936

Wavelength (Å)


#28
g_1 0.05 ± 0.04
g_2 0.07 ± 0.07
θ_{int} 2.60 ± 0.03
v_{circ} 257.37 ± 21.25
cos (i) 0.49 ± 0.09
$r_{hl,disk}$ 0.80 ± 0.07
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.28 ± 0.11
Hb : v_0 0.61 ± 5.19
Hb : I_0^{Spec1} 49.66 ± 4.02
Hb : I_0^{Spec2} 59.61 ± 4.75
Hb : I_0^{Spec3} 62.09 ± 4.47
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -4.74 ± 4.00
Ha : I_0^{Spec1} 55.33 ± 4.09
Ha : I_0^{Spec2} 57.31 ± 5.07
Ha : I_0^{Spec3} 58.71 ± 4.59
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.18
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#29 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 42

g_1 = 0.017
g_2 = 0.085
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.63
$r_{hl,\,disk}$ = 0.82
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0049
Δy_{disk} = -0.0052
r_{vscale} = 0.18

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3708
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -6.0
f_0^{Spec1} = 60.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 931
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -6.0
f_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 936
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -6.0
f_0^{Spec3} = 50.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 945
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 4.0
f_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 966
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 4.0
f_0^{Spec2} = 60.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 982
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 4.0
f_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 950
dof = 936

Wavelength (Å)


#29
g_1 0.00 ± 0.04
g_2 0.10 ± 0.06
θ_{int} 2.63 ± 0.04
v_{circ} 217.02 ± 23.64
cos (i) 0.63 ± 0.09
$r_{hl,disk}$ 0.82 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.20 ± 0.09
Hb : v_0 -5.32 ± 5.50
Hb : i_0^{Spec1} 58.89 ± 4.05
Hb : i_0^{Spec2} 51.18 ± 4.86
Hb : i_0^{Spec3} 51.88 ± 4.38
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.18
Ha : v_0 4.39 ± 4.39
Ha : i_0^{Spec1} 44.26 ± 4.07
Ha : i_0^{Spec2} 59.08 ± 5.05
Ha : i_0^{Spec3} 48.95 ± 4.53
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.18
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17

#30 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 39

g_1 = 0.031
g_2 = 0.095
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.83
$r_{hl,\,disk}$ = 0.79
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.015
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.47

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3885
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 4.0
I_0^{Spec1} = 45.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 900
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 4.0
I_0^{Spec2} = 60.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 956
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 4.0
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 988
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 40.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 946
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 993
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 942
dof = 936

Wavelength (Å)


#30
g_1 0.01 ± 0.04
g_2 0.12 ± 0.04
θ_{int} 2.61 ± 0.07
v_{circ} 215.92 ± 32.07
cos (i) 0.78 ± 0.09
$r_{hl,disk}$ 0.82 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} -0.01 ± 0.01
r_{vscale} 0.60 ± 0.35
Hb : v_0 4.52 ± 5.38
Hb : I_0^{Spec1} 43.29 ± 3.96
Hb : I_0^{Spec2} 59.08 ± 4.46
Hb : I_0^{Spec3} 52.76 ± 4.36
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.15 ± 4.22
Ha : I_0^{Spec1} 41.17 ± 3.87
Ha : I_0^{Spec2} 50.59 ± 4.61
Ha : I_0^{Spec3} 51.44 ± 4.43
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17