#1 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.039
g_2 = 0.041
θ_{int} = 0.016
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.095
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.02

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3844
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 954
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 980
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 1123
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 995
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 971
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=2.4
χ^2 = 2232
dof = 913

Wavelength (Å)


#1
g_1 0.04 ± 0.05
g_2 0.04 ± 0.01
θ_{int} 0.01 ± 0.01
v_{circ} 215.38 ± 5.08
cos (i) 0.10 ± 0.01
$r_{hl,disk}$ 0.78 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.05 ± 0.03
Hb : v_0 -0.17 ± 0.69
Hb : I_0^{Spec1} 50.45 ± 0.81
Hb : I_0^{Spec2} 53.66 ± 0.86
Hb : I_0^{Spec3} 56.49 ± 1.09
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.57 ± 0.51
Ha : I_0^{Spec1} 51.90 ± 0.78
Ha : I_0^{Spec2} 54.34 ± 0.84
Ha : I_0^{Spec3} 55.72 ± 1.42
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#2 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.073
g_2 = 0.051
θ_{int} = 0.016
v_{circ} = 2.3e+02
cos (i) = 0.31
$r_{hl,\,disk}$ = 0.75
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0051
Δy_{disk} = 0.0051
r_{vscale} = 0.11

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3880
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 886
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 966
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 60.2

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1191
dof = 936

Spec set A slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = 1.6
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 917
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = 1.6
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 908
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = 1.6
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=3.3
χ^2 = 2959
dof = 907

Wavelength (Å)

#2

g_1 0.08 ± 0.07
g_2 0.05 ± 0.00
θ_{int} 0.01 ± 0.01
v_{circ} 226.10 ± 3.84
cos (*i*) 0.32 ± 0.05
$r_{hl,disk}$ 0.75 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.11 ± 0.02
Hb : v_0 -0.51 ± 0.70
Hb : I_0^{Spec1} 51.99 ± 0.79
Hb : I_0^{Spec2} 55.18 ± 0.85
Hb : I_0^{Spec3} 57.85 ± 1.06
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.38 ± 0.53
Ha : I_0^{Spec1} 51.43 ± 0.74
Ha : I_0^{Spec2} 55.43 ± 0.86
Ha : I_0^{Spec3} 57.31 ± 1.35
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.18

#3 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.11
g_2 = 0.051
θ_{int} = -0.016
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.56
$r_{hl,\,disk}$ = 0.71
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.13

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3829
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 955
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 947
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1213
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = 1.5
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 865
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = 1.5
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 997
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = 1.5
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=2.9
χ^2 = 2611
dof = 901

Wavelength (Å)

#3

g_1 0.08 ± 0.07
g_2 0.05 ± 0.00
θ_{int} -0.00 ± 0.01
v_{circ} 233.17 ± 14.07
cos (*i*) 0.54 ± 0.08
$r_{hl,disk}$ 0.74 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.14 ± 0.02
Hb : v_0 -0.49 ± 0.75
Hb : I_0^{Spec1} 51.44 ± 0.78
Hb : I_0^{Spec2} 54.73 ± 0.87
Hb : I_0^{Spec3} 57.57 ± 1.05
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.67 ± 0.54
Ha : I_0^{Spec1} 51.56 ± 0.74
Ha : I_0^{Spec2} 56.30 ± 0.89
Ha : I_0^{Spec3} 56.06 ± 1.35
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#4 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.037
g_2 = 0.049
θ_{int} = 0.016
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.65
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.11

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3879
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 904
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 33

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 923
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1199
dof = 936

Spec set A slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 940
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 939
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=2.1
χ^2 = 1867
dof = 901

Wavelength (Å)

#4

g_1 0.03 ± 0.05
g_2 0.05 ± 0.01
θ_{int} -0.00 ± 0.01
v_{circ} 219.72 ± 21.64
cos (*i*) 0.67 ± 0.07
$r_{hl,disk}$ 0.78 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.01 ± 0.01
r_{vscale} 0.12 ± 0.01
Hb : v_0 -0.49 ± 0.71
Hb : I_0^{Spec1} 51.12 ± 0.79
Hb : I_0^{Spec2} 55.14 ± 0.87
Hb : I_0^{Spec3} 57.63 ± 1.05
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.13 ± 0.55
Ha : I_0^{Spec1} 51.64 ± 0.73
Ha : I_0^{Spec2} 54.56 ± 0.90
Ha : I_0^{Spec3} 57.09 ± 1.35
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#5 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.045
g_2 = 0.059
θ_{int} = -0.016
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.9
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.09

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3808
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0

χ^2_v=1.1
χ^2 = 989
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 959
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_v=1.3
χ^2 = 1197
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 964
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 941
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_v=3.1
χ^2 = 2829
dof = 900

Wavelength (Å)

#5

g_1 0.05 ± 0.01
g_2 0.06 ± 0.01
θ_{int} -0.00 ± 0.01
v_{circ} 222.96 ± 23.50
cos (*i*) 0.90 ± 0.02
$r_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.01
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.09 ± 0.01
Hb : v_0 -0.93 ± 0.69
Hb : I_0^{Spec1} 50.94 ± 0.80
Hb : I_0^{Spec2} 55.06 ± 0.86
Hb : I_0^{Spec3} 55.60 ± 1.07
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.05 ± 0.52
Ha : I_0^{Spec1} 52.09 ± 0.74
Ha : I_0^{Spec2} 55.36 ± 0.89
Ha : I_0^{Spec3} 55.77 ± 1.33
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.18
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#6 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 43

g_1 = 0.067
g_2 = 0.083
θ_{int} = 0.52
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.12
$r_{hl,\,disk}$ = 0.73
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0049
Δy_{disk} = -0.0049
r_{vscale} = 0.05

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3762
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 976
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 891
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 1134
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 26

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 994
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 963
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=3.7
χ^2 = 3312
dof = 902

Wavelength (Å)

#6

g_1 0.07 ± 0.03
g_2 0.09 ± 0.05
θ_{int} 0.52 ± 0.01
v_{circ} 210.94 ± 4.33
cos (*i*) 0.12 ± 0.01
$r_{hl,disk}$ 0.74 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.05 ± 0.02
Hb : v_0 0.68 ± 0.75
Hb : I_0^{Spec1} 50.16 ± 0.78
Hb : I_0^{Spec2} 55.21 ± 0.88
Hb : I_0^{Spec3} 56.64 ± 1.12
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : v_0 0.42 ± 0.51
Ha : I_0^{Spec1} 51.61 ± 0.74
Ha : I_0^{Spec2} 56.04 ± 0.87
Ha : I_0^{Spec3} 55.03 ± 1.40
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#7 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 42

g_1 = 0.027
g_2 = -0.003
θ_{int} = 0.52
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.26
$r_{hl,\,disk}$ = 0.82
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = 0.0049
r_{vscale} = 0.08

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3822
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 889
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 978
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.1

χ^2_v=1.3
χ^2 = 1221
dof = 936

Spec set A slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = 1.5
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_v=0.9
χ^2 = 841
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 33

v_0 = 1.5
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 914
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = 1.5
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_v=1.8
χ^2 = 1637
dof = 906

Wavelength (Å)

#7

g_1 0.04 ± 0.03
g_2 0.02 ± 0.06
θ_{int} 0.53 ± 0.01
v_{circ} 218.78 ± 2.81
cos (*i*) 0.27 ± 0.04
$r_{hl,disk}$ 0.80 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.08 ± 0.01
Hb : v_0 0.23 ± 0.74
Hb : I_0^{Spec1} 50.21 ± 0.79
Hb : I_0^{Spec2} 56.07 ± 0.88
Hb : I_0^{Spec3} 57.14 ± 1.07
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 1.07 ± 0.55
Ha : I_0^{Spec1} 52.15 ± 0.72
Ha : I_0^{Spec2} 56.22 ± 0.90
Ha : I_0^{Spec3} 56.94 ± 1.34
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#8 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 38

g_1 = -0.005
g_2 = -0.035
θ_{int} = 0.52
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.4
$r_{hl,\,disk}$ = 0.83
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = 0.0051
r_{vscale} = 0.08

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3916
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
l_0^{Spec1} = 50.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 958
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
l_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 950
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
l_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 1166
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 937
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 924
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 55.1

χ^2_ν=3.6
χ^2 = 3240
dof = 907

Wavelength (Å)


#8
g_1 0.01 ± 0.04
g_2 -0.02 ± 0.06
θ_{int} 0.53 ± 0.00
v_{circ} 209.34 ± 7.49
cos (i) 0.42 ± 0.07
$r_{hl,disk}$ 0.83 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.08 ± 0.01
Hb : v_0 -1.83 ± 0.74
Hb : l_0^{Spec1} 51.82 ± 0.77
Hb : l_0^{Spec2} 54.71 ± 0.89
Hb : l_0^{Spec3} 57.07 ± 1.06
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : v_0 0.26 ± 0.54
Ha : l_0^{Spec1} 50.15 ± 0.72
Ha : l_0^{Spec2} 55.29 ± 0.88
Ha : l_0^{Spec3} 57.25 ± 1.32
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#9 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 42

g_1 = 0.051
g_2 = 0.059
θ_{int} = 0.52
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.69
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0052
Δy_{disk} = -0.0049
r_{vscale} = 0.09

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3732
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 936
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 957
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1332
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 995
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 952
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=3.6
χ^2 = 3225
dof = 908

Wavelength (Å)


#9
g_1 0.05 ± 0.02
g_2 0.06 ± 0.04
θ_{int} 0.53 ± 0.00
v_{circ} 225.55 ± 20.38
cos (i) 0.71 ± 0.06
$r_{hl,disk}$ 0.77 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} -0.01 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.09 ± 0.01
Hb : v_0 -0.88 ± 0.69
Hb : I_0^{Spec1} 51.73 ± 0.78
Hb : I_0^{Spec2} 55.17 ± 0.86
Hb : I_0^{Spec3} 56.63 ± 1.04
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.20 ± 0.53
Ha : I_0^{Spec1} 51.71 ± 0.71
Ha : I_0^{Spec2} 55.29 ± 0.87
Ha : I_0^{Spec3} 56.22 ± 1.30
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#10 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 38

g_1 = 0.055
g_2 = 0.059
θ_{int} = 0.52
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.89
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.08

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3920
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -0.9
I_0^{Spec1} = 50.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 923
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -0.9
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 931
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -0.9
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1215
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -0.9
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 952
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -0.9
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 937
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -0.9
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=3.5
χ^2 = 3088
dof = 894

Wavelength (Å)

#10

g_1 0.06 ± 0.01
g_2 0.06 ± 0.01
θ_{int} 0.52 ± 0.01
v_{circ} 220.43 ± 23.54
cos (*i*) 0.90 ± 0.02
$r_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.01
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} -0.01 ± 0.01
Δy_{disk} -0.01 ± 0.01
r_{vscale} 0.08 ± 0.01
Hb : v_0 -0.69 ± 0.64
Hb : l_0^{Spec1} 51.13 ± 0.77
Hb : l_0^{Spec2} 55.08 ± 0.82
Hb : l_0^{Spec3} 56.34 ± 1.02
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.30 ± 0.47
Ha : l_0^{Spec1} 52.15 ± 0.73
Ha : l_0^{Spec2} 55.24 ± 0.82
Ha : l_0^{Spec3} 55.35 ± 1.30
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#11 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.011
g_2 = 0.12
θ_{int} = 1
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.12
$r_{hl,\,disk}$ = 0.71
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = 0.0048
r_{vscale} = 0.07

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3945
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -0.9
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 968
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -0.9
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 952
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -0.9
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1195
dof = 936

Spec set A slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 865
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 958
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=2.1
χ^2 = 1878
dof = 903

Wavelength (Å)

#11

g_1 0.01 ± 0.03
g_2 0.12 ± 0.04
θ_{int} 1.04 ± 0.01
v_{circ} 210.87 ± 6.25
cos (i) 0.12 ± 0.01
$r_{hl,disk}$ 0.72 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.08 ± 0.03
Hb : v_0 -0.25 ± 0.74
Hb : l_0^{Spec1} 52.44 ± 0.80
Hb : l_0^{Spec2} 54.39 ± 0.88
Hb : l_0^{Spec3} 56.60 ± 1.10
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.09 ± 0.49
Ha : l_0^{Spec1} 50.93 ± 0.74
Ha : l_0^{Spec2} 55.00 ± 0.88
Ha : l_0^{Spec3} 56.27 ± 1.36
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#12 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.047
g_2 = 0.053
θ_{int} = 1.1
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.29
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = 0.0051
r_{vscale} = 0.06

χ^2_v=1.1
χ^2 = 4016
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_v=1.0
χ^2 = 969
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 910
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1002
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

v_0 = -0.8
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 978
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -0.8
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 970
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -0.8
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_v=3.9
χ^2 = 3594
dof = 910

Wavelength (Å)


#12
g_1 0.04 ± 0.04
g_2 0.07 ± 0.06
θ_{int} 1.05 ± 0.01
v_{circ} 217.67 ± 3.80
cos (i) 0.31 ± 0.05
$r_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.06 ± 0.02
Hb : v_0 -0.48 ± 0.78
Hb : I_0^{Spec1} 51.62 ± 0.80
Hb : I_0^{Spec2} 54.47 ± 0.88
Hb : I_0^{Spec3} 56.54 ± 1.07
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.04 ± 0.53
Ha : I_0^{Spec1} 51.08 ± 0.74
Ha : I_0^{Spec2} 57.37 ± 0.88
Ha : I_0^{Spec3} 57.11 ± 1.40
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#13 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.1
g_2 = -0.023
θ_{int} = 1.1
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.39
$r_{hl,\,disk}$ = 0.83
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0051
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.06

χ^2_v=1.1
χ^2 = 4098
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = 1.6
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 921
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = 1.6
l_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 938
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = 1.6
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1006
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1049
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 921
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_v=3.9
χ^2 = 3576
dof = 906

Wavelength (Å)


#13
g_1 0.09 ± 0.04
g_2 -0.01 ± 0.06
θ_{int} 1.05 ± 0.01
v_{circ} 208.06 ± 8.21
cos (i) 0.43 ± 0.07
$r_{hl,disk}$ 0.83 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.06 ± 0.01
Hb : v_0 1.00 ± 0.72
Hb : I_0^{Spec1} 52.38 ± 0.78
Hb : I_0^{Spec2} 55.14 ± 0.84
Hb : I_0^{Spec3} 56.49 ± 1.05
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.43 ± 0.49
Ha : I_0^{Spec1} 51.97 ± 0.74
Ha : I_0^{Spec2} 54.92 ± 0.83
Ha : I_0^{Spec3} 57.87 ± 1.32
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#14 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.051
g_2 = 0.045
θ_{int} = 1.1
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.67
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0049
Δy_{disk} = 0.0049
r_{vscale} = 0.08

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3812
dof = 3819

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 936
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1052
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 33

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 1139
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 953
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 978
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=3.3
χ^2 = 3014
dof = 910

Wavelength (Å)

#14

g_1 0.04 ± 0.02
g_2 0.06 ± 0.03
θ_{int} 1.05 ± 0.01
v_{circ} 219.98 ± 19.59
cos (*i*) 0.70 ± 0.06
$r_{hl,disk}$ 0.77 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.08 ± 0.01
Hb : v_0 0.22 ± 0.68
Hb : I_0^{Spec1} 51.22 ± 0.79
Hb : I_0^{Spec2} 52.53 ± 0.81
Hb : I_0^{Spec3} 55.66 ± 1.05
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : v_0 -0.42 ± 0.47
Ha : I_0^{Spec1} 52.05 ± 0.72
Ha : I_0^{Spec2} 55.13 ± 0.80
Ha : I_0^{Spec3} 54.53 ± 1.29
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#15 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.047
g_2 = 0.059
θ_{int} = 1
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.9
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0051
Δy_{disk} = 0.0051
r_{vscale} = 0.08

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3636
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 949
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_v=1.1
χ^2 = 986
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 33

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_v=1.3
χ^2 = 1248
dof = 936

Spec set A slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_v=1.1
χ^2 = 992
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_v=1.0
χ^2 = 978
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_v=1.8
χ^2 = 1688
dof = 921

Wavelength (Å)

#15

g_1 0.05 ± 0.01
g_2 0.06 ± 0.01
$\theta_{\rm int}$ 1.04 ± 0.01
$v_{\rm circ}$ 220.63 ± 21.62
cos (*i*) 0.90 ± 0.02
$r_{\rm hl,\,disk}$ 0.76 ± 0.01
log ($F_{\rm disk}$) 4.39 ± 0.00
$\Delta x_{\rm disk}$ 0.00 ± 0.01
$\Delta y_{\rm disk}$ 0.00 ± 0.01
$r_{\rm vscale}$ 0.08 ± 0.01
Hb : v_0 -0.34 ± 0.65
Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ 51.49 ± 0.77
Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ 54.50 ± 0.81
Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ 55.98 ± 1.05
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : v_0 0.17 ± 0.45
Ha : $I_0^{\rm Spec1}$ 51.24 ± 0.71
Ha : $I_0^{\rm Spec2}$ 54.23 ± 0.77
Ha : $I_0^{\rm Spec3}$ 55.40 ± 1.27
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#16 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.055
g_2 = 0.053
θ_{int} = 1.6
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.1
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0051
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3891
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.1
I_0^{Spec1} = 50.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 961
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.1
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 958
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.1
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 1077
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 953
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 862
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=2.4
χ^2 = 2150
dof = 910

Wavelength (Å)


#16
g_1 0.05 ± 0.04
g_2 0.05 ± 0.01
θ_{int} 1.57 ± 0.01
v_{circ} 213.92 ± 4.31
cos (i) 0.11 ± 0.01
$r_{hl,disk}$ 0.77 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.10 ± 0.03
Hb : v_0 -0.35 ± 0.76
Hb : I_0^{Spec1} 51.32 ± 0.82
Hb : I_0^{Spec2} 55.19 ± 0.93
Hb : I_0^{Spec3} 56.60 ± 1.11
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.26 ± 0.54
Ha : I_0^{Spec1} 52.03 ± 0.79
Ha : I_0^{Spec2} 54.85 ± 0.90
Ha : I_0^{Spec3} 55.10 ± 1.38
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.18

#17 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.055
g_2 = 0.053
θ_{int} = 1.6
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.29
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0051
Δy_{disk} = -0.0052
r_{vscale} = 0.08

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3812
dof = 3819

N, E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 946
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 35

v_0 = -1.0
f_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 935
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
f_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1183
dof = 935

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -0.9
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 955
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -0.9
f_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 961
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -0.9
f_0^{Spec3} = 55.0

χ^2_ν=2.9
χ^2 = 2600
dof = 908

Wavelength (Å)

#17

g_1 0.04 ± 0.08
g_2 0.05 ± 0.01
θ_{int} 1.57 ± 0.01
v_{circ} 219.87 ± 4.01
cos (*i*) 0.31 ± 0.05
$r_{hl,disk}$ 0.77 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.08 ± 0.01
Hb : v_0 -0.90 ± 0.76
Hb : I_0^{Spec1} 51.03 ± 0.78
Hb : I_0^{Spec2} 55.59 ± 0.91
Hb : I_0^{Spec3} 55.89 ± 1.05
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.07 ± 0.57
Ha : I_0^{Spec1} 51.54 ± 0.75
Ha : I_0^{Spec2} 55.96 ± 0.91
Ha : I_0^{Spec3} 56.14 ± 1.35
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17

#18 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.1
g_2 = 0.059
θ_{int} = 1.6
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.4
$r_{hl,\,disk}$ = 0.82
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.08

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 4090
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 876
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
l_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 932
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1270
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 50.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 974
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 953
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 55.1

χ^2_ν=4.0
χ^2 = 3619
dof = 913

Wavelength (Å)

#18

g_1 0.09 ± 0.07
g_2 0.06 ± 0.00
θ_{int} 1.57 ± 0.01
v_{circ} 216.67 ± 9.56
cos (*i*) 0.45 ± 0.07
$r_{hl,disk}$ 0.82 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.08 ± 0.01
Hb : v_0 0.03 ± 0.73
Hb : I_0^{Spec1} 51.17 ± 0.77
Hb : I_0^{Spec2} 54.07 ± 0.86
Hb : I_0^{Spec3} 56.92 ± 1.07
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.44 ± 0.54
Ha : I_0^{Spec1} 52.13 ± 0.73
Ha : I_0^{Spec2} 57.43 ± 0.91
Ha : I_0^{Spec3} 57.18 ± 1.39
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#19 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.051
g_2 = 0.065
θ_{int} = 1.6
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.67
$r_{hl,\,disk}$ = 0.79
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0049
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.07

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3769
dof = 3819

N, E

Δ RA (arcsec)

Spec set A — slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 932
dof = 936

Spec set C — slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 33

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 894
dof = 936

Spec set B — slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 1144
dof = 936

Spec set A — slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 907
dof = 936

Spec set C — slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 862
dof = 936

Spec set B — slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=7.8
χ^2 = 7132
dof = 918

Wavelength (Å)

#19

g_1 0.04 ± 0.04
g_2 0.07 ± 0.01
θ_{int} 1.57 ± 0.01
v_{circ} 219.78 ± 18.68
cos (*i*) 0.70 ± 0.06
$r_{hl,\,disk}$ 0.78 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.07 ± 0.01
Hb : v_0 0.64 ± 0.70
Hb : I_0^{Spec1} 50.14 ± 0.77
Hb : I_0^{Spec2} 54.25 ± 0.85
Hb : I_0^{Spec3} 56.43 ± 1.05
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.53 ± 0.51
Ha : I_0^{Spec1} 51.58 ± 0.71
Ha : I_0^{Spec2} 57.06 ± 0.86
Ha : I_0^{Spec3} 56.04 ± 1.31
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ -0.01 ± 0.17

#20 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 42

g_1 = 0.033
g_2 = 0.049
θ_{int} = 1.6
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.9
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0049
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.08

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3769
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 927
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 50.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 963
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1306
dof = 936

Spec set A slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = 1.5
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 915
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 26

v_0 = 1.5
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1009
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = 1.5
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=2.0
χ^2 = 1851
dof = 905

Wavelength (Å)

#20

g_1 0.03 ± 0.01
g_2 0.05 ± 0.01
$\theta_{\rm int}$ 1.57 ± 0.01
$v_{\rm circ}$ 222.45 ± 21.82
cos (*i*) 0.90 ± 0.02
$r_{\rm hl,\,disk}$ 0.78 ± 0.01
log ($F_{\rm disk}$) 4.40 ± 0.00
$\Delta x_{\rm disk}$ 0.01 ± 0.01
$\Delta y_{\rm disk}$ -0.00 ± 0.01
$r_{\rm vscale}$ 0.08 ± 0.01
Hb : v_0 -0.09 ± 0.68
Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ 51.31 ± 0.77
Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ 52.68 ± 0.81
Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ 56.91 ± 1.04
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : v_0 0.96 ± 0.47
Ha : $I_0^{\rm Spec1}$ 50.96 ± 0.71
Ha : $I_0^{\rm Spec2}$ 54.51 ± 0.81
Ha : $I_0^{\rm Spec3}$ 56.31 ± 1.30
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

g_1 g_2 $\theta_{\rm int}$ $v_{\rm circ}$ cos (*i*) $r_{\rm hl,\,disk}$ log ($F_{\rm disk}$) $\Delta x_{\rm disk}$ $\Delta y_{\rm disk}$ $r_{\rm vscale}$ Hb : v_0 Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Ha : v_0 Ha : $I_0^{\rm Spec1}$ Ha : $I_0^{\rm Spec2}$ Ha : $I_0^{\rm Spec3}$ Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$

#21 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 38

g_1 = 0.049
g_2 = 0.063
θ_{int} = 2.1
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.1
$r_{hl,\,disk}$ = 0.79
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.06

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 4088
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 33

v_0 = -1.0
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 872
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
f_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 911
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
f_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1284
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1000
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.0
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1050
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 26

v_0 = -1.0
f_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=2.1
χ^2 = 1952
dof = 911

Wavelength (Å)

#21

g_1 0.05 ± 0.02
g_2 0.06 ± 0.03
θ_{int} 2.10 ± 0.01
v_{circ} 213.60 ± 4.28
cos (*i*) 0.10 ± 0.01
$r_{hl,\,disk}$ 0.78 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{dsk} -0.00 ± 0.01
Δy_{dsk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.07 ± 0.03
Hb : v_0 -0.48 ± 0.71
Hb : I_0^{Spec1} 51.78 ± 0.83
Hb : I_0^{Spec2} 53.48 ± 0.86
Hb : I_0^{Spec3} 56.53 ± 1.11
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.16 ± 0.54
Ha : I_0^{Spec1} 51.57 ± 0.80
Ha : I_0^{Spec2} 54.75 ± 0.87
Ha : I_0^{Spec3} 56.51 ± 1.41
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#22 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.079
g_2 = 0.11
θ_{int} = 2.1
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.25
$r_{hl,\,disk}$ = 0.82
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.11

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3898
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 967
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 26

v_0 = -1.0
l_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 972
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.0
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1219
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.0
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 949
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
l_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 961
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

v_0 = -1.0
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=2.8
χ^2 = 2516
dof = 902

Wavelength (Å)

#22

g_1 0.07 ± 0.03
g_2 0.10 ± 0.05
θ_{int} 2.09 ± 0.00
v_{circ} 219.68 ± 2.53
cos (i) 0.27 ± 0.04
$r_{hl,disk}$ 0.81 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.01 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.11 ± 0.01
Hb : v_0 0.16 ± 0.74
Hb : I_0^{Spec1} 51.36 ± 0.81
Hb : I_0^{Spec2} 54.68 ± 0.88
Hb : I_0^{Spec3} 54.42 ± 1.06
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.18
Ha : v_0 0.14 ± 0.56
Ha : I_0^{Spec1} 51.45 ± 0.75
Ha : I_0^{Spec2} 55.95 ± 0.92
Ha : I_0^{Spec3} 57.17 ± 1.38
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#23 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 42

g_1 = 0.051
g_2 = 0.055
θ_{int} = 2.1
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.48
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0052
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.1

χ^2_v=1.0
χ^2 = 3648
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1028
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1006
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_v=1.2
χ^2 = 1149
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 1010
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 26

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_v=1.1
χ^2 = 985
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 26

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_v=6.7
χ^2 = 6040
dof = 900

Wavelength (Å)


#23
g_1 0.04 ± 0.04
g_2 0.04 ± 0.07
θ_{int} 2.09 ± 0.00
v_{circ} 225.50 ± 15.53
cos (i) 0.53 ± 0.08
$r_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.10 ± 0.01
Hb : v_0 0.28 ± 0.71
Hb : I_0^{Spec1} 50.54 ± 0.77
Hb : I_0^{Spec2} 54.72 ± 0.89
Hb : I_0^{Spec3} 55.45 ± 1.04
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.48 ± 0.54
Ha : I_0^{Spec1} 50.36 ± 0.71
Ha : I_0^{Spec2} 54.21 ± 0.89
Ha : I_0^{Spec3} 55.57 ± 1.32
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#24 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.053
g_2 = 0.043
θ_{int} = 2.1
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.71
$r_{hl,\,disk}$ = 0.75
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.005
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.11

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3695
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.1
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1004
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.1
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 933
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

v_0 = -1.1
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1323
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1032
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 893
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=8.8
χ^2 = 7923
dof = 898

Wavelength (Å)

#24

g_1 0.05 ± 0.02
g_2 0.05 ± 0.03
$\theta_{\rm int}$ 2.09 ± 0.00
$v_{\rm circ}$ 229.16 ± 19.93
cos (*i*) 0.71 ± 0.06
$r_{\rm hl,\,disk}$ 0.76 ± 0.03
log ($F_{\rm disk}$) 4.39 ± 0.00
$\Delta x_{\rm disk}$ -0.00 ± 0.01
$\Delta y_{\rm disk}$ -0.00 ± 0.01
$r_{\rm vscale}$ 0.11 ± 0.01
Hb : v_0 -0.84 ± 0.72
Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ 51.42 ± 0.76
Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ 53.47 ± 0.88
Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ 56.43 ± 1.05
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.45 ± 0.51
Ha : $I_0^{\rm Spec1}$ 51.77 ± 0.72
Ha : $I_0^{\rm Spec2}$ 55.98 ± 0.87
Ha : $I_0^{\rm Spec3}$ 56.01 ± 1.33
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#25 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 38

g_1 = 0.045
g_2 = 0.059
θ_{int} = 2.1
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.9
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0048
Δy_{disk} = -0.0051
r_{vscale} = 0.09

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3852
dof = 3819

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = 1.4
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1010
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = 1.4
f_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1068
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = 1.4
f_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1232
dof = 936

Spec set A slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 26

v_0 = -1.0
f_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 966
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
f_0^{Spec2} = 55.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 920
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
f_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=4.0
χ^2 = 3513
dof = 889

Wavelength (Å)

#25

g_1 0.04 ± 0.01
g_2 0.06 ± 0.01
θ_{int} 2.10 ± 0.01
v_{circ} 223.99 ± 21.05
cos (*i*) 0.90 ± 0.02
$r_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.01
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.09 ± 0.01
Hb : v_0 0.38 ± 0.68
Hb : I_0^{Spec1} 50.31 ± 0.81
Hb : I_0^{Spec2} 54.29 ± 0.85
Hb : I_0^{Spec3} 54.64 ± 1.04
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.09 ± 0.50
Ha : I_0^{Spec1} 51.83 ± 0.73
Ha : I_0^{Spec2} 56.11 ± 0.85
Ha : I_0^{Spec3} 55.90 ± 1.35
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18

#26 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.049
g_2 = 0.039
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 2.4e+02
cos (i) = 0.09
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.29

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3902
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = 1.5
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.0
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 917
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = 1.5
l_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 989
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = 1.5
l_0^{Spec3} = 55.2

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1191
dof = 936

Spec set A
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.1
l_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 978
dof = 936

Spec set C
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.1
l_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 1125
dof = 936

Spec set B
slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.1
l_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=2.0
χ^2 = 1846
dof = 908

Wavelength (Å)


#26
g_1 0.05 ± 0.03
g_2 0.04 ± 0.04
θ_{int} 2.62 ± 0.01
v_{circ} 245.84 ± 14.98
cos (i) 0.10 ± 0.01
$r_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.29 ± 0.09
Hb : v_0 0.46 ± 0.65
Hb : I_0^{Spec1} 51.61 ± 0.80
Hb : I_0^{Spec2} 54.21 ± 0.81
Hb : I_0^{Spec3} 55.50 ± 1.04
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 -0.12 ± 0.50
Ha : I_0^{Spec1} 51.97 ± 0.74
Ha : I_0^{Spec2} 54.27 ± 0.79
Ha : I_0^{Spec3} 53.90 ± 1.32
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#27 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.015
g_2 = 0.11
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 2.3e+02
cos (i) = 0.25
$r_{hl,\,disk}$ = 0.82
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.0051
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.18

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3953
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.0

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 921
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 961
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 983
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = 1.5
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 964
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 34

v_0 = 1.5
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 896
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα

N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = 1.5
I_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=1.7
χ^2 = 1539
dof = 915

Wavelength (Å)

#27

g_1 0.03 ± 0.03
g_2 0.09 ± 0.06
θ_{int} 2.61 ± 0.01
v_{circ} 229.58 ± 3.76
cos (i) 0.27 ± 0.04
$r_{hl,disk}$ 0.81 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.00
Δx_{disk} -0.00 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.00
r_{vscale} 0.18 ± 0.03
Hb : v_0 0.02 ± 0.69
Hb : I_0^{Spec1} 52.55 ± 0.80
Hb : I_0^{Spec2} 55.16 ± 0.86
Hb : I_0^{Spec3} 57.57 ± 1.10
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.42 ± 0.57
Ha : I_0^{Spec1} 51.10 ± 0.76
Ha : I_0^{Spec2} 55.12 ± 0.90
Ha : I_0^{Spec3} 58.13 ± 1.40
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17

#28 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 40

g_1 = 0.043
g_2 = 0.059
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.47
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.16

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3856
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 887
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 925
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 1031
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = 1.5
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 922
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = 1.5
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 970
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = 1.5
I_0^{Spec3} = 60.3

χ^2_ν=7.6
χ^2 = 6918
dof = 910

Wavelength (Å)

#28

g_1 0.05 ± 0.04
g_2 0.06 ± 0.07
θ_{int} 2.62 ± 0.01
v_{circ} 228.38 ± 12.01
cos (*i*) 0.49 ± 0.08
$r_{hl,disk}$ 0.78 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} 0.00 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.16 ± 0.02
Hb : v_0 -0.54 ± 0.73
Hb : I_0^{Spec1} 51.72 ± 0.78
Hb : I_0^{Spec2} 54.28 ± 0.85
Hb : I_0^{Spec3} 56.50 ± 1.06
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : v_0 0.37 ± 0.56
Ha : I_0^{Spec1} 51.88 ± 0.75
Ha : I_0^{Spec2} 54.63 ± 0.90
Ha : I_0^{Spec3} 58.49 ± 1.37
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17

#29 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 43

g_1 = 0.061
g_2 = 0.055
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.71
$r_{hl,\,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.0051
Δy_{disk} = 0.005
r_{vscale} = 0.12

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 3602
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 931
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 32

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.2

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 867
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1228
dof = 936

Spec set A slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 958
dof = 936

Spec set C slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 972
dof = 936

Spec set B slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 54.9

χ^2_ν=7.1
χ^2 = 6493
dof = 912

Wavelength (Å)


#29
g_1 0.06 ± 0.02
g_2 0.06 ± 0.03
θ_{int} 2.61 ± 0.01
v_{circ} 230.01 ± 19.79
cos (i) 0.71 ± 0.06
$r_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.39 ± 0.00
Δx_{disk} 0.01 ± 0.01
Δy_{disk} 0.00 ± 0.01
r_{vscale} 0.12 ± 0.01
Hb : v_0 -1.59 ± 0.73
Hb : I_0^{Spec1} 51.51 ± 0.78
Hb : I_0^{Spec2} 53.81 ± 0.86
Hb : I_0^{Spec3} 56.64 ± 1.07
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ -0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Hb : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.01 ± 0.17
Ha : v_0 -1.47 ± 0.51
Ha : I_0^{Spec1} 51.31 ± 0.72
Ha : I_0^{Spec2} 55.19 ± 0.89
Ha : I_0^{Spec3} 55.01 ± 1.30
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{vel,Spec1}$ 0.00 ± 0.18

#30 Observation

Best fit model

Residual (= obs - model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 63 px
N_DEC = 61 px
SNR = 41

g_1 = 0.041
g_2 = 0.051
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 2.1e+02
cos (i) = 0.9
$r_{hl,\,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.005
Δy_{disk} = -0.005
r_{vscale} = 0.11

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 3690
dof = 3819

Δ RA (arcsec)

Spec set A

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 33

v_0 = -1.0
I_0^{Spec1} = 50.3
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.1
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 854
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 28

v_0 = -1.0
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 948
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hβ
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = -1.0
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1274
dof = 936

Spec set A

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 30

v_0 = 1.4
I_0^{Spec1} = 50.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = 0.2
$\Delta x_{vel,\,Spec1}$ = -0.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 961
dof = 936

Spec set C

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

v_0 = 1.4
I_0^{Spec2} = 55.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 955
dof = 936

Spec set B

slit position (arcsec)

Hα
N_λ = 48 px
N_slit = 20 px
SNR = 29

v_0 = 1.4
I_0^{Spec3} = 55.3

χ^2_ν=2.0
χ^2 = 1830
dof = 907

Wavelength (Å)

#30

g_1 0.04 ± 0.01
g_2 0.05 ± 0.01
$\theta_{\rm int}$ 2.62 ± 0.01
$v_{\rm circ}$ 223.30 ± 22.97
cos (*i*) 0.90 ± 0.02
$r_{\rm hl,\,disk}$ 0.77 ± 0.01
log ($F_{\rm disk}$) 4.40 ± 0.00
$\Delta x_{\rm disk}$ 0.00 ± 0.01
$\Delta y_{\rm disk}$ -0.01 ± 0.01
$r_{\rm vscale}$ 0.11 ± 0.01
Hb : v_0 -0.53 ± 0.68
Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ 51.53 ± 0.79
Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ 53.58 ± 0.85
Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ 56.86 ± 1.06
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Hb : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.01 ± 0.17
Ha : v_0 0.44 ± 0.50
Ha : $I_0^{\rm Spec1}$ 52.31 ± 0.74
Ha : $I_0^{\rm Spec2}$ 55.08 ± 0.86
Ha : $I_0^{\rm Spec3}$ 55.55 ± 1.34
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ 0.00 ± 0.17
Ha : $\Delta x_{\rm vel,\,Spec1}$ -0.00 ± 0.17