#3 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 54

g_1 = -0.14
g_2 = -0.015
θ_{int} = 2.3
v_{circ} = 1.5e+02
cos (i) = 0.44
$r_{hl,\,disk}$ = 0.56
log (F_{disk}) = 4.5
Δx_{disk} = 0.26
Δy_{disk} = -0.058
r_{vscale} = 1.6

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 552
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

[O III] λ5007

v_0 = 4.6
I_0^{Spec1} = 3.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 434
dof = 377

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

[O III] λ5007

v_0 = 4.6
I_0^{Spec2} = 19.3

χ^2_ν=2.3
χ^2 = 847
dof = 376

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

[O III] λ5007

v_0 = 4.6
I_0^{Spec3} = 23.5

χ^2_ν=2.7
χ^2 = 1051
dof = 390

Wavelength (Å)

#3

g_1 -0.14 ± 0.01
g_2 -0.01 ± 0.07
θ_{int} 2.33 ± 0.02
v_{circ} 145.29 ± 18.54
cos (i) 0.44 ± 0.07
$r_{hl,\,disk}$ 0.56 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.50 ± 0.01
Δx_{disk} 0.26 ± 0.01
Δy_{disk} -0.06 ± 0.01
r_{vscale} 1.59 ± 0.40
O3b : v_0 4.63 ± 2.40
O3b : I_0^{Spec1} 3.28 ± 0.86
O3b : I_0^{Spec2} 19.34 ± 0.75
O3b : I_0^{Spec3} 23.50 ± 1.87

#5 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 85

g_1 = -0.14
g_2 = -0.14
θ_{int} = -2.2
v_{circ} = 1.9e+02
cos (i) = 0.75
$r_{hl\ disk}$ = 0.5
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = -0.3
Δy_{disk} = 0.2
r_{vscale} = 0.64

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 458
dof = 423

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set *A*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -2.5
I_0^{Spec1} = 4.8

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 548
dof = 480

Hβ

Spec set *C*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

v_0 = -2.5
I_0^{Spec2} = 22.4

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 725
dof = 518

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 9

v_0 = -2.5
I_0^{Spec3} = 30.8

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 594
dof = 520

Hβ

Spec set *A*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

v_0 = 19.7
I_0^{Spec1} = 7.2

χ^2_ν=1.6
χ^2 = 950
dof = 579

[O III] λ5007

Spec set *C*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 16

v_0 = 19.7
I_0^{Spec2} = 25.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 702
dof = 578

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 19.7
I_0^{Spec3} = 40.5

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 685
dof = 578

[O III] λ5007

Wavelength (Å)


#5
g_1
-0.13 ± 0.01
g_2
-0.14 ± 0.01
θ_{int}
-2.17 ± 0.04
v_{circ}
192.31 ± 16.00
cos (i)
0.75 ± 0.02
$r_{hl,disk}$
0.50 ± 0.01
log (F_{disk})
4.78 ± 0.00
Δx_{disk}
-0.30 ± 0.01
Δy_{disk}
0.20 ± 0.01
r_{vscale}
0.64 ± 0.11
Hb : v_0
-2.45 ± 2.47
Hb : I_0^{Spec1}
4.83 ± 0.42
Hb : I_0^{Spec2}
22.41 ± 0.77
Hb : I_0^{Spec3}
30.78 ± 1.57
O3b : v_0
19.67 ± 2.64
O3b : I_0^{Spec1}
7.21 ± 1.31
O3b : I_0^{Spec2}
25.26 ± 0.78
O3b : I_0^{Spec3}
40.45 ± 3.15


#7 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 75
g_1 = -0.0032
g_2 = 0.023
θ_{int} = -0.08
v_{circ} = 1.6e+02
cos (i) = 0.93
$r_{ht,disk}$ = 0.82
log (F_{disk}) = 5.6
Δx_{disk} = -0.27
Δy_{disk} = -0.24
r_{vscale} = 0.19
χ^2_v=0.2
χ^2 = 90
dof = 419
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Slit Position (arcsec)
N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 13
v_0 = -12.5
f_0^{spec1} = 20.0
χ^2_v=1.2
χ^2 = 697
dof = 578
[N II] λ6549
Spec set C
N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 2
v_0 = -12.5
f_0^{spec2} = 13.9
χ^2_v=1.6
χ^2 = 904
dof = 578
[N II] λ6549
Spec set B
N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 9
v_0 = -12.5
f_0^{spec3} = 38.8
χ^2_v=1.3
χ^2 = 766
dof = 578
[N II] λ6549
Spec set A
N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 38
v_0 = -11.3
f_0^{spec1} = 172.6
χ^2_v=0.3
χ^2 = 166
dof = 572
Hα
Spec set C
N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 43
v_0 = -11.3
f_0^{spec2} = 107.2
χ^2_v=1.0
χ^2 = 594
dof = 574
Hα
Spec set B
N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 36
v_0 = -11.3
f_0^{spec3} = 513.2
χ^2_v=0.5
χ^2 = 277
dof = 576
Hα
Spec set A
N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 26
v_0 = -15.8
f_0^{spec1} = 52.3
χ^2_v=1.0
χ^2 = 587
dof = 564
[N II] λ6583
Spec set C
N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 26
v_0 = -15.8
f_0^{spec2} = 31.4
χ^2_v=1.6
χ^2 = 849
dof = 540
[N II] λ6583
Spec set B
N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 16
v_0 = -15.8
f_0^{spec3} = 77.6
χ^2_v=1.5
χ^2 = 737
dof = 503
[N II] λ6583
Wavelength (Å)

#7

g_1 -0.00 ± 0.01
g_2 0.02 ± 0.01
θ_{int} -0.08 ± 0.02
v_{circ} 157.85 ± 13.83
cos (i) 0.93 ± 0.01
$r_{hl,disk}$ 0.82 ± 0.01
log (F_{disk}) 5.65 ± 0.01
Δx_{disk} -0.27 ± 0.01
Δy_{disk} -0.24 ± 0.01
r_{vscale} 0.19 ± 0.05
N2a : v_0 -12.51 ± 1.56
N2a : I_0^{Spec1} 19.98 ± 0.75
N2a : I_0^{Spec2} 13.86 ± 0.54
N2a : I_0^{Spec3} 38.75 ± 1.51
Ha : v_0 -11.29 ± 0.56
Ha : I_0^{Spec1} 172.61 ± 2.23
Ha : I_0^{Spec2} 107.27 ± 1.31
Ha : I_0^{Spec3} 513.10 ± 6.55
N2b : v_0 -15.82 ± 1.05
N2b : I_0^{Spec1} 52.29 ± 1.04
N2b : I_0^{Spec2} 31.36 ± 0.65
N2b : I_0^{Spec3} 77.58 ± 2.02

#8 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 107

g_1 = 0.04
g_2 = 0.076
θ_{int} = -1.8
v_{circ} = 1.3e+02
cos (*i*) = 0.98
$r_{hl,\,disk}$ = 0.46
log (F_{disk}) = 5.3
Δx_{disk} = -0.23
Δy_{disk} = 0.22
r_{vscale} = 0.3

χ^2_ν=0.8
χ^2 = 298
dof = 395

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 16

v_0 = 4.8
I_0^{Spec1} = 19.2

χ^2_ν=0.6
χ^2 = 270
dof = 474

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 13

v_0 = 4.8
I_0^{Spec2} = 40.3

χ^2_ν=1.6
χ^2 = 770
dof = 474

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 9

v_0 = 4.8
I_0^{Spec3} = 99.1

χ^2_ν=1.6
χ^2 = 741
dof = 473

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 25

v_0 = -12.9
I_0^{Spec1} = 263.5

χ^2_ν=0.6
χ^2 = 368
dof = 582

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

v_0 = -12.9
I_0^{Spec2} = 116.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 698
dof = 581

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

v_0 = -12.9
I_0^{Spec3} = 161.0

χ^2_ν=1.9
χ^2 = 1099
dof = 582

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#8

g_1 0.04 ± 0.01
g_2 0.08 ± 0.01
θ_{int} -1.78 ± 0.07
v_{circ} 135.34 ± 18.48
cos (i) 0.98 ± 0.01
$r_{hl,\,disk}$ 0.46 ± 0.00
log (F_{disk}) 5.28 ± 0.00
Δx_{disk} -0.23 ± 0.02
Δy_{disk} 0.22 ± 0.02
r_{vscale} 0.33 ± 0.17
Hb : v_0 4.78 ± 1.44
Hb : I_0^{Spec1} 19.20 ± 0.53
Hb : I_0^{Spec2} 40.30 ± 0.86
Hb : I_0^{Spec3} 99.12 ± 3.23
O3b : v_0 -12.89 ± 1.04
O3b : I_0^{Spec1} 263.43 ± 3.90
O3b : I_0^{Spec2} 116.30 ± 1.74
O3b : I_0^{Spec3} 161.08 ± 6.98

#10 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 59

g_1 = 0.083
g_2 = 0.04
θ_{int} = -1.2
v_{circ} = 1.5e+02
cos (i) = 0.35
$r_{hl,disk}$ = 0.74
log (F_{disk}) = 4.6
Δx_{disk} = -0.14
Δy_{disk} = 0.044
r_{vscale} = 0.51

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 524
dof = 423

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = 16.2
I_0^{Spec1} = 4.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 661
dof = 582

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = 16.2
I_0^{Spec2} = 9.8

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 819
dof = 581

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 16.2
I_0^{Spec3} = 32.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 630
dof = 582

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 3.4
I_0^{Spec1} = 9.7

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 558
dof = 488

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 3.4
I_0^{Spec2} = 18.6

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 635
dof = 484

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 3.4
I_0^{Spec3} = 85.7

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 626
dof = 492

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#10

g_1 0.07 ± 0.05
g_2 0.04 ± 0.06
θ_{int} -1.19 ± 0.04
v_{circ} 148.77 ± 12.31
cos (*i*) 0.36 ± 0.06
$r_{hl,\,disk}$ 0.73 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.60 ± 0.01
Δx_{disk} -0.14 ± 0.01
Δy_{disk} 0.05 ± 0.01
r_{vscale} 0.52 ± 0.13
Hb : v_0 16.14 ± 4.63
Hb : I_0^{Spec1} 4.33 ± 0.76
Hb : I_0^{Spec2} 9.83 ± 0.65
Hb : I_0^{Spec3} 32.14 ± 1.78
O3b : v_0 3.43 ± 3.26
O3b : I_0^{Spec1} 9.65 ± 1.12
O3b : I_0^{Spec2} 18.61 ± 0.78
O3b : I_0^{Spec3} 85.67 ± 3.58

#13 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 50

g_1 = 0.06
g_2 = 0.14
θ_{int} = 1.8
v_{circ} = 1.6e+02
cos (i) = 0.69
$r_{hl,\,disk}$ = 0.81
log (F_{disk}) = 4.7
Δx_{disk} = 0.3
Δy_{disk} = -0.1
r_{vscale} = 0.64

χ^2_ν=0.8
χ^2 = 211
dof = 263

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 15

[O III] λ5007

v_0 = -7.5
I_0^{Spec1} = 5.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 588
dof = 586

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 15

[O III] λ5007

v_0 = -7.5
I_0^{Spec2} = 19.2

χ^2_ν=1.5
χ^2 = 862
dof = 586

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = -23

[O III] λ5007

v_0 = -7.5
I_0^{Spec3} = 188.0

χ^2_ν=3.3
χ^2 = 1955
dof = 586

Wavelength (Å)

#13

g_1 0.06 ± 0.04

g_2 0.14 ± 0.01

θ_{int} 1.80 ± 0.05

v_{circ} 149.67 ± 13.81

cos (i) 0.70 ± 0.05

$r_{hl,\,disk}$ 0.80 ± 0.04

log (F_{disk}) 4.70 ± 0.01

Δx_{disk} 0.30 ± 0.02

Δy_{disk} -0.10 ± 0.02

r_{vscale} 0.59 ± 0.14

O3b : v_0 -7.52 ± 1.58

O3b : I_0^{Spec1} 5.20 ± 0.39

O3b : I_0^{Spec2} 19.15 ± 0.49

O3b : I_0^{Spec3} 188.32 ± 10.95

#14 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 50

g_1 = 0.076
g_2 = 0.14
θ_{int} = 2.2
v_{circ} = 1.1e+02
cos (i) = 0.87
$r_{hl,\,disk}$ = 0.69
log (F_{disk}) = 4.6
Δx_{disk} = -0.037
Δy_{disk} = 0.041
r_{vscale} = 1.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 410
dof = 395

N, E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 0

v_0 = -2.7
I_0^{Spec1} = 0.7

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 593
dof = 481

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = -2.7
I_0^{Spec2} = 11.4

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 639
dof = 517

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = -5

v_0 = -2.7
I_0^{Spec3} = 68.5

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 652
dof = 537

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = -7.7
I_0^{Spec1} = 13.6

χ^2_ν=1.6
χ^2 = 951
dof = 582

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = -7.7
I_0^{Spec2} = 23.5

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 716
dof = 577

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -7.7
I_0^{Spec3} = 97.2

χ^2_ν=1.5
χ^2 = 825
dof = 558

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#14

g_1 0.08 ± 0.03
g_2 0.13 ± 0.01
$\theta_{\rm int}$ 2.23 ± 0.15
$v_{\rm circ}$ 105.57 ± 14.44
cos (i) 0.87 ± 0.04
$r_{\rm hl,\,disk}$ 0.69 ± 0.02
log ($F_{\rm disk}$) 4.57 ± 0.01
$\Delta x_{\rm disk}$ -0.04 ± 0.02
$\Delta y_{\rm disk}$ 0.04 ± 0.01
$r_{\rm vscale}$ 1.08 ± 0.33
Hb : v_0 -2.67 ± 4.03
Hb : $I_0^{\rm Spec1}$ 0.75 ± 0.36
Hb : $I_0^{\rm Spec2}$ 11.42 ± 1.07
Hb : $I_0^{\rm Spec3}$ 68.26 ± 7.89
O3b : v_0 -7.73 ± 1.99
O3b : $I_0^{\rm Spec1}$ 13.62 ± 1.49
O3b : $I_0^{\rm Spec2}$ 23.50 ± 1.16
O3b : $I_0^{\rm Spec3}$ 97.18 ± 4.23

#15 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 40

g_1 = -0.1
g_2 = -0.063
θ_{int} = -2.8
v_{circ} = 1.4e+02
cos (i) = 0.6
$r_{hl,\,disk}$ = 0.4
log (F_{disk}) = 4.3
Δx_{disk} = -0.17
Δy_{disk} = 0.23
r_{vscale} = 0.35

χ^2_ν=1.8
χ^2 = 782
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

[O II] $\lambda\lambda$3726,3729

v_0 = -33.5
v_0 = -48.7
I_0^{Spec1} = 6.6
I_0^{Spec1} = 12.3

χ^2_ν=1.5
χ^2 = 776
dof = 523

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

[O II] $\lambda\lambda$3726,3729

v_0 = -33.5
v_0 = -48.7
I_0^{Spec2} = 16.2
I_0^{Spec2} = 29.0

χ^2_ν=0.7
χ^2 = 380
dof = 507

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

[O II] $\lambda\lambda$3726,3729

v_0 = -33.5
v_0 = -48.7
I_0^{Spec3} = 25.3
I_0^{Spec3} = 97.0

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 739
dof = 511

Wavelength (Å)

#15

g_1 -0.09 ± 0.04
g_2 -0.06 ± 0.04
θ_{int} -2.79 ± 0.05
v_{circ} 146.89 ± 15.11
cos (i) 0.61 ± 0.07
$r_{hl,\,disk}$ 0.40 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.29 ± 0.01
Δx_{disk} -0.17 ± 0.03
Δy_{disk} 0.23 ± 0.03
r_{vscale} 0.36 ± 0.14
O2 : v_0 -33.38 ± 4.88
O2b : v_0 -48.52 ± 4.09
O2 : I_0^{Spec1} 6.65 ± 0.64
O2b : I_0^{Spec1} 12.46 ± 5.93
O2 : I_0^{Spec2} 16.27 ± 1.13
O2b : I_0^{Spec2} 28.99 ± 0.77
O2 : I_0^{Spec3} 25.25 ± 6.74
O2b : I_0^{Spec3} 96.99 ± 3.78

#17 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 48

$g_1 = 0.13$
$g_2 = 0.096$
$\theta_{int} = 2.8$
$v_{circ} = 98$
$\cos(i) = 0.68$
$r_{hl,\,disk} = 0.86$
$\log(F_{disk}) = 4.6$
$\Delta x_{disk} = 0.17$
$\Delta y_{disk} = 0.18$
$r_{vscale} = 3.5$

$\chi^2_v = 0.7$
$\chi^2 = 298$
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

[O III] λ5007

$v_0 = 60.4$
$I_0^{Spec1} = 0.6$

$\chi^2_v = 1.2$
$\chi^2 = 794$
dof = 669

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

[O III] λ5007

$v_0 = 60.4$
$I_0^{Spec2} = 12.2$

$\chi^2_v = 1.0$
$\chi^2 = 731$
dof = 723

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 24

[O III] λ5007

$v_0 = 60.4$
$I_0^{Spec3} = 489.1$

$\chi^2_v = 1.0$
$\chi^2 = 714$
dof = 704

Wavelength (Å)

#17

g_1 0.12 ± 0.03

g_2 0.08 ± 0.05

θ_{int} 2.19 ± 1.21

v_{circ} 96.74 ± 13.82

cos (i) 0.67 ± 0.05

$r_{hl,\,disk}$ 0.86 ± 0.04

log (F_{disk}) 4.61 ± 0.01

Δx_{disk} 0.11 ± 0.12

Δy_{disk} 0.09 ± 0.17

r_{vscale} 3.44 ± 0.44

O3b : v_0 57.10 ± 7.48

O3b : I_0^{Spec1} 0.62 ± 0.38

O3b : I_0^{Spec2} 12.19 ± 0.67

O3b : I_0^{Spec3} 488.98 ± 6.77

#18 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 63

g_1 = -0.13
g_2 = 0.049
θ_{int} = -0.67
v_{circ} = 1.6e+02
cos (*i*) = 0.64
$r_{hl,disk}$ = 0.64
log (F_{disk}) = 4.7
Δx_{disk} = -0.5
Δy_{disk} = -0.042
r_{vscale} = 1.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 442
dof = 423

N, E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 0

v_0 = -24.6
I_0^{Spec1} = 1.2

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 765
dof = 615

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -24.6
I_0^{Spec2} = 7.9

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 711
dof = 616

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -24.6
I_0^{Spec3} = 18.1

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 709
dof = 614

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -1.6
I_0^{Spec1} = 2.8

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 883
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -3

v_0 = -1.6
I_0^{Spec2} = 4.2

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1092
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 9

v_0 = -1.6
I_0^{Spec3} = 38.8

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 878
dof = 782

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#18

g_1 -0.12 ± 0.02
g_2 0.05 ± 0.06
θ_{int} -0.68 ± 0.05
v_{circ} 166.67 ± 20.35
cos (i) 0.64 ± 0.08
$r_{hl,disk}$ 0.64 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.66 ± 0.00
Δx_{disk} -0.50 ± 0.01
Δy_{disk} -0.04 ± 0.02
r_{vscale} 1.21 ± 0.32
Hb : v_0 -24.70 ± 3.86
Hb : I_0^{Spec1} 1.23 ± 0.30
Hb : I_0^{Spec2} 7.85 ± 0.53
Hb : I_0^{Spec3} 18.10 ± 1.68
O3b : v_0 -1.69 ± 4.70
O3b : I_0^{Spec1} 2.79 ± 0.60
O3b : I_0^{Spec2} 4.23 ± 0.44
O3b : I_0^{Spec3} 38.87 ± 2.07

#19 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 52

g_1 = -0.029
g_2 = 0.11
θ_{int} = 2.1
v_{circ} = 1.3e+02
cos (i) = 0.56
$r_{hl,\,disk}$ = 0.62
log (F_{disk}) = 4.5
Δx_{disk} = 0.14
Δy_{disk} = -0.14
r_{vscale} = 0.79

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 495
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -5.5
I_0^{Spec1} = 25.0

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 675
dof = 586

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 15

v_0 = -5.5
I_0^{Spec2} = 36.7

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 595
dof = 585

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -5.5
I_0^{Spec3} = 10.6

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 569
dof = 586

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#19

g_1 -0.03 ± 0.04

g_2 0.10 ± 0.03

θ_{int} 2.09 ± 0.05

v_{circ} 125.66 ± 11.54

cos (i) 0.57 ± 0.05

$r_{hl,\,disk}$ 0.62 ± 0.03

log (F_{disk}) 4.46 ± 0.01

Δx_{disk} 0.14 ± 0.02

Δy_{disk} -0.14 ± 0.02

r_{vscale} 0.79 ± 0.15

O3b : v_0 -5.47 ± 1.72

O3b : I_0^{Spec1} 25.00 ± 1.39

O3b : I_0^{Spec2} 36.75 ± 1.14

O3b : I_0^{Spec3} 10.62 ± 1.38

#20 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 41

g_1 = -0.016
g_2 = 0.094
θ_{int} = 1.3
v_{circ} = 61
cos (i) = 0.43
$r_{hl,\,disk}$ = 0.26
log (F_{disk}) = 4.3
Δx_{disk} = 0.21
Δy_{disk} = -0.66
r_{vscale} = 0.23

χ^2_v=1.7
χ^2 = 699
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -6

v_0 = -40.4
I_0^{Spec1} = 0.2

χ^2_v=1.4
χ^2 = 1085
dof = 781

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 10

v_0 = -40.4
I_0^{Spec2} = 17.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 874
dof = 781

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -40.4
I_0^{Spec3} = 19.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 812
dof = 781

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -3

v_0 = -27.5
I_0^{Spec1} = 1.8

χ^2_v=1.1
χ^2 = 849
dof = 778

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -27.5
I_0^{Spec2} = 23.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 786
dof = 714

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -27.5
I_0^{Spec3} = 23.1

χ^2_v=1.1
χ^2 = 733
dof = 691

[O III] λ5007

Wavelength (Å)


#20
g_1 -0.01 ± 0.08
g_2 0.07 ± 0.06
θ_{int} 1.31 ± 0.10
v_{circ} 61.97 ± 7.99
cos (*i*) 0.43 ± 0.10
$r_{hl,\,disk}$ 0.26 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.32 ± 0.01
Δx_{disk} 0.19 ± 0.11
Δy_{disk} -0.66 ± 0.12
r_{vscale} 0.26 ± 0.16
Hb : v_0 -40.33 ± 3.70
Hb : I_0^{Spec1} 0.22 ± 0.20
Hb : I_0^{Spec2} 17.25 ± 0.88
Hb : I_0^{Spec3} 19.29 ± 2.40
O3b : v_0 -27.46 ± 3.29
O3b : I_0^{Spec1} 2.19 ± 1.81
O3b : I_0^{Spec2} 23.23 ± 0.93
O3b : I_0^{Spec3} 23.11 ± 2.50

#21 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 51

g_1 = -0.096
g_2 = 0.036
θ_{int} = 1.7
v_{circ} = 93
cos (i) = 0.64
$r_{hl,\,disk}$ = 0.53
log (F_{disk}) = 4.5
Δx_{disk} = -0.066
Δy_{disk} = -0.27
r_{vscale} = 3

χ^2_ν=1.8
χ^2 = 759
dof = 419

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -4

[O II] λλ3726,3729

v_0 = -56.0
v_0 = -53.9
I_0^{Spec1} = 0.1
I_0^{Spec1} = 3.6

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1120
dof = 778

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 17

[O II] λλ3726,3729

v_0 = -56.0
v_0 = -53.9
I_0^{Spec2} = 21.8
I_0^{Spec2} = 32.8

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 826
dof = 778

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 15

[O II] λλ3726,3729

v_0 = -56.0
v_0 = -53.9
I_0^{Spec3} = 175.2
I_0^{Spec3} = 73.0

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 889
dof = 778

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

Hβ

v_0 = -38.1
I_0^{Spec1} = 0.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 918
dof = 777

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

Hβ

v_0 = -38.1
I_0^{Spec2} = 12.2

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1025
dof = 778

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

Hβ

v_0 = -38.1
I_0^{Spec3} = 23.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 888
dof = 778

Wavelength (Å)

#21

g_1 -0.08 ± 0.06
g_2 0.04 ± 0.06
θ_{int} 1.64 ± 0.14
v_{circ} 93.55 ± 11.98
cos (i) 0.62 ± 0.08
$r_{hl,disk}$ 0.54 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.50 ± 0.01
Δx_{disk} -0.07 ± 0.05
Δy_{disk} -0.26 ± 0.03
r_{vscale} 2.99 ± 0.63
O2 : v_0 -56.01 ± 2.90
O2b : v_0 -53.97 ± 2.43
O2 : I_0^{Spec1} 0.20 ± 0.18
O2b : I_0^{Spec1} 3.59 ± 0.61
O2 : I_0^{Spec2} 21.77 ± 1.06
O2b : I_0^{Spec2} 32.81 ± 0.85
O2 : I_0^{Spec3} 175.21 ± 8.69
O2b : I_0^{Spec3} 73.06 ± 2.55
Hb : v_0 -38.12 ± 3.74
Hb : I_0^{Spec1} 0.33 ± 0.27
Hb : I_0^{Spec2} 12.23 ± 0.81
Hb : I_0^{Spec3} 23.29 ± 2.31

#23 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 20 px
N_DEC = 21 px
SNR = 108

g_1 = 0.005
g_2 = 0.13
θ_{int} = 2.2
v_{circ} = 1.5e+02
cos (i) = 0.63
$r_{hl,disk}$ = 0.58
log (F_{disk}) = 5
Δx_{disk} = 0.42
Δy_{disk} = 0.041
r_{vscale} = 0.78

χ^2_v=1.1
χ^2 = 461
dof = 402

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = -3.5
I_0^{Spec1} = 3.9

χ^2_v=1.2
χ^2 = 829
dof = 670

[O III] λ4959

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -3.5
I_0^{Spec2} = 39.7

χ^2_v=1.1
χ^2 = 683
dof = 622

[O III] λ4959

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -3.5
I_0^{Spec3} = 151.6

χ^2_v=1.1
χ^2 = 629
dof = 585

[O III] λ4959

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = -16.8
I_0^{Spec1} = 12.1

χ^2_v=1.3
χ^2 = 718
dof = 546

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 17

v_0 = -16.8
I_0^{Spec2} = 120.5

χ^2_v=1.1
χ^2 = 724
dof = 655

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

v_0 = -16.8
I_0^{Spec3} = 447.1

χ^2_v=1.0
χ^2 = 654
dof = 652

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#23

g_1 0.00 ± 0.02
g_2 0.13 ± 0.02
θ_{int} 2.16 ± 0.03
v_{circ} 156.94 ± 10.37
cos (i) 0.64 ± 0.03
$r_{hl,\,disk}$ 0.58 ± 0.01
log (F_{disk}) 5.02 ± 0.00
Δx_{disk} 0.42 ± 0.01
Δy_{disk} 0.04 ± 0.01
r_{vscale} 0.79 ± 0.10
O3a : v_0 -3.47 ± 2.32
O3a : I_0^{Spec1} 3.92 ± 0.55
O3a : I_0^{Spec2} 39.73 ± 1.20
O3a : I_0^{Spec3} 152.01 ± 8.27
O3b : v_0 -16.70 ± 1.90
O3b : I_0^{Spec1} 12.24 ± 2.27
O3b : I_0^{Spec2} 120.69 ± 3.86
O3b : I_0^{Spec3} 447.01 ± 6.95

#24 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 61

g_1 = -0.13
g_2 = 0.13
θ_{int} = 2.1
v_{circ} = 2.7e+02
cos (i) = 0.42
$r_{hl,\,disk}$ = 0.69
log (F_{disk}) = 4.6
Δx_{disk} = 0.27
Δy_{disk} = -0.17
r_{vscale} = 1.3

χ^2_ν=1.6
χ^2 = 675
dof = 423

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -10.5
I_0^{Spec1} = 0.7

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 865
dof = 782

[O III] λ4959

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

v_0 = -10.5
I_0^{Spec2} = 8.0

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1015
dof = 782

[O III] λ4959

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -10.5
I_0^{Spec3} = 35.2

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1094
dof = 782

[O III] λ4959

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -6.7
I_0^{Spec1} = 6.9

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 868
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

v_0 = -6.7
I_0^{Spec2} = 31.5

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1112
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -3

v_0 = -6.7
I_0^{Spec3} = 229.4

χ^2_ν=2.1
χ^2 = 1637
dof = 781

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#24

g_1 -0.13 ± 0.01

g_2 0.13 ± 0.02

θ_{int} 2.10 ± 0.02

v_{circ} 268.81 ± 13.44

cos (i) 0.43 ± 0.02

$r_{hl,\,disk}$ 0.69 ± 0.02

log (F_{disk}) 4.56 ± 0.00

Δx_{disk} 0.28 ± 0.01

Δy_{disk} -0.17 ± 0.01

r_{vscale} 1.29 ± 0.10

O3a : v_0 -10.65 ± 3.65

O3a : I_0^{Spec1} 0.71 ± 0.37

O3a : I_0^{Spec2} 7.98 ± 0.37

O3a : I_0^{Spec3} 35.18 ± 2.09

O3b : v_0 -6.78 ± 1.34

O3b : I_0^{Spec1} 6.92 ± 0.41

O3b : I_0^{Spec2} 31.46 ± 0.58

O3b : I_0^{Spec3} 229.37 ± 5.03

#25 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 46

g_1 = -0.12
g_2 = 0.045
θ_{int} = 2.2
v_{circ} = 1.1e+02
cos (i) = 0.57
$r_{hl,disk}$ = 0.53
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.35
Δy_{disk} = 0.15
r_{vscale} = 1.1

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 573
dof = 423

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -4

v_0 = -24.0
I_0^{Spec1} = 0.3

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 734
dof = 782

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -24.0
I_0^{Spec2} = 15.1

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 743
dof = 782

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -24.0
I_0^{Spec3} = 10.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 759
dof = 781

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -9.8
I_0^{Spec1} = 3.6

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 832
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -3

v_0 = -9.8
I_0^{Spec2} = 15.9

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 927
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -9.8
I_0^{Spec3} = 25.1

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 916
dof = 782

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#25

g_1 -0.11 ± 0.04
g_2 0.04 ± 0.06
θ_{int} 2.17 ± 0.08
v_{circ} 107.44 ± 14.28
cos (i) 0.58 ± 0.08
$r_{hl,\,disk}$ 0.53 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.40 ± 0.01
Δx_{disk} 0.35 ± 0.02
Δy_{disk} 0.15 ± 0.03
r_{vscale} 1.16 ± 0.40
Hb : v_0 -23.98 ± 6.06
Hb : I_0^{Spec1} 0.38 ± 0.33
Hb : I_0^{Spec2} 15.09 ± 1.29
Hb : I_0^{Spec3} 10.29 ± 1.90
O3b : v_0 -9.84 ± 3.63
O3b : I_0^{Spec1} 3.61 ± 0.51
O3b : I_0^{Spec2} 15.87 ± 1.02
O3b : I_0^{Spec3} 25.09 ± 2.21

#26 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 79

g_1 = -0.14
g_2 = -0.072
θ_{int} = -2.6
v_{circ} = 2.4e+02
cos (i) = 0.5
$r_{hl,disk}$ = 0.84
log (F_{disk}) = 4.9
Δx_{disk} = -0.16
Δy_{disk} = 0.26
r_{vscale} = 0.81

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 536
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -21.2
I_0^{Spec1} = 3.1

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 795
dof = 641

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 0

v_0 = -21.2
I_0^{Spec2} = 8.8

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 765
dof = 618

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -21.2
I_0^{Spec3} = 34.6

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 792
dof = 617

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = 59.7
I_0^{Spec1} = 1.0

χ^2_ν=1.6
χ^2 = 839
dof = 532

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 59.7
I_0^{Spec2} = 14.8

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 745
dof = 582

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 59.7
I_0^{Spec3} = 43.5

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 691
dof = 632

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#26

g_1 -0.14 ± 0.01
g_2 -0.07 ± 0.05
θ_{int} -2.56 ± 0.03
v_{circ} 231.82 ± 17.82
cos (i) 0.50 ± 0.05
$r_{hl,\,disk}$ 0.84 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.92 ± 0.00
Δx_{disk} -0.16 ± 0.02
Δy_{disk} 0.26 ± 0.02
r_{vscale} 0.78 ± 0.14
Hb : v_0 -20.86 ± 4.68
Hb : I_0^{Spec1} 3.13 ± 0.36
Hb : I_0^{Spec2} 8.82 ± 0.61
Hb : I_0^{Spec3} 34.57 ± 2.63
O3b : v_0 58.92 ± 5.13
O3b : I_0^{Spec1} 0.98 ± 0.47
O3b : I_0^{Spec2} 14.78 ± 1.07
O3b : I_0^{Spec3} 43.20 ± 6.96

#27 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 49

g_1 = -0.12
g_2 = 0.004
θ_{int} = -3.1
v_{circ} = 1.4e+02
cos (i) = 0.62
$r_{hl,\,disk}$ = 1.3
log (F_{disk}) = 5
Δx_{disk} = -0.036
Δy_{disk} = 0.08
r_{vscale} = 0.46

χ^2_ν=0.3
χ^2 = 105
dof = 408

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 14.1
I_0^{Spec1} = 11.0

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 702
dof = 619

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12

v_0 = 14.1
I_0^{Spec2} = 7.8

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 647
dof = 545

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 9

v_0 = 14.1
I_0^{Spec3} = 40.0

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 551
dof = 499

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 10

v_0 = 25.1
I_0^{Spec1} = 15.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 850
dof = 781

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 25.1
I_0^{Spec2} = 9.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 759
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 13

v_0 = 25.1
I_0^{Spec3} = 23.3

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 724
dof = 781

[O III] λ5007

Wavelength (Å)


#27
g_1 -0.11 ± 0.03
g_2 0.00 ± 0.02
θ_{int} -3.08 ± 0.41
v_{circ} 145.73 ± 10.97
cos (i) 0.63 ± 0.05
$r_{hl,disk}$ 1.33 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.97 ± 0.01
Δx_{disk} -0.04 ± 0.01
Δy_{disk} 0.08 ± 0.01
r_{vscale} 0.47 ± 0.11
Hb : v_0 14.09 ± 2.14
Hb : I_0^{Spec1} 10.96 ± 0.70
Hb : I_0^{Spec2} 7.80 ± 0.45
Hb : I_0^{Spec3} 40.00 ± 2.03
O3b : v_0 25.14 ± 1.80
O3b : I_0^{Spec1} 15.17 ± 1.00
O3b : I_0^{Spec2} 9.15 ± 0.74
O3b : I_0^{Spec3} 23.25 ± 1.04

#28 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 46

g_1 = 0.091
g_2 = -0.14
θ_{int} = 0.91
v_{circ} = 1.3e+02
cos (i) = 0.76
$r_{hl,\,disk}$ = 0.44
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.37
Δy_{disk} = -0.32
r_{vscale} = 1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 456
dof = 397

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

[O III] λ5007

v_0 = 4.1
I_0^{Spec1} = 5.4

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 618
dof = 639

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

[O III] λ5007

v_0 = 4.1
I_0^{Spec2} = 14.7

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 762
dof = 641

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

[O III] λ5007

v_0 = 4.1
I_0^{Spec3} = 28.6

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 703
dof = 642

Wavelength (Å)

#28

g_1 0.09 ± 0.03

g_2 -0.14 ± 0.01

θ_{int} 0.91 ± 0.11

v_{circ} 126.56 ± 11.31

cos (i) 0.76 ± 0.03

$r_{hl,\,disk}$ 0.44 ± 0.01

log (F_{disk}) 4.43 ± 0.01

Δx_{disk} 0.38 ± 0.05

Δy_{disk} -0.32 ± 0.04

r_{vscale} 1.02 ± 0.22

O3b : v_0 4.44 ± 4.07

O3b : I_0^{Spec1} 5.33 ± 1.02

O3b : I_0^{Spec2} 14.71 ± 1.31

O3b : I_0^{Spec3} 28.65 ± 2.91

#29 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 92

g_1 = -0.056
g_2 = 0.005
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 3.6e+02
cos (i) = 0.52
$r_{hl,disk}$ = 0.68
log (F_{disk}) = 5.1
Δx_{disk} = 0.31
Δy_{disk} = -0.025
r_{vscale} = 1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 430
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

[O III] λ5007

v_0 = -33.0
I_0^{Spec1} = 6.1

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 677
dof = 658

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12

[O III] λ5007

v_0 = -33.0
I_0^{Spec2} = 8.9

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 762
dof = 545

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

[O III] λ5007

v_0 = -33.0
I_0^{Spec3} = 276.1

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 742
dof = 530

Wavelength (Å)

#29

g_1 -0.06 ± 0.02
g_2 0.01 ± 0.04
θ_{int} 2.62 ± 0.02
v_{circ} 355.41 ± 17.52
cos (i) 0.52 ± 0.05
$r_{hl,\,disk}$ 0.68 ± 0.03
log (F_{disk}) 5.08 ± 0.00
Δx_{disk} 0.31 ± 0.01
Δy_{disk} -0.03 ± 0.01
r_{vscale} 1.03 ± 0.11
O3b : v_0 -32.95 ± 3.50
O3b : I_0^{Spec1} 6.06 ± 0.47
O3b : I_0^{Spec2} 8.86 ± 0.41
O3b : I_0^{Spec3} 276.09 ± 6.20

#30 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 48

g_1 = 0.072
g_2 = -0.15
θ_{int} = -1.9
v_{circ} = 1.5e+02
cos (i) = 0.87
$r_{hl,disk}$ = 0.84
log (F_{disk}) = 4.7
Δx_{disk} = -0.12
Δy_{disk} = 0.13
r_{vscale} = 0.96

χ^2_ν=0.6
χ^2 = 254
dof = 423

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 0

v_0 = 1.5
I_0^{Spec1} = 4.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 815
dof = 718

[O III] λ4959

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -5

v_0 = 1.5
I_0^{Spec2} = 12.2

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 937
dof = 678

[O III] λ4959

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 1.5
I_0^{Spec3} = 43.0

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 784
dof = 693

[O III] λ4959

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 10

v_0 = 1.5
I_0^{Spec1} = 16.7

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 835
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 15

v_0 = 1.5
I_0^{Spec2} = 38.6

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 715
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 20

v_0 = 1.5
I_0^{Spec3} = 206.0

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 758
dof = 782

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#30

g_1 0.07 ± 0.02
g_2 -0.15 ± 0.00
θ_{int} -1.89 ± 0.04
v_{circ} 149.67 ± 13.89
cos (i) 0.87 ± 0.03
$r_{hl,\,disk}$ 0.84 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.70 ± 0.01
Δx_{disk} -0.12 ± 0.02
Δy_{disk} 0.13 ± 0.01
r_{vscale} 0.96 ± 0.17
O3a : v_0 1.53 ± 2.21
O3a : I_0^{Spec1} 4.07 ± 1.08
O3a : I_0^{Spec2} 12.16 ± 0.86
O3a : I_0^{Spec3} 43.01 ± 1.80
O3b : v_0 1.55 ± 1.06
O3b : I_0^{Spec1} 16.73 ± 0.81
O3b : I_0^{Spec2} 38.62 ± 0.98
O3b : I_0^{Spec3} 205.97 ± 3.38

#32 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 46

g_1 = 0.011
g_2 = 0.09
θ_{int} = 2.8
v_{circ} = 1.4e+02
cos (i) = 0.6
$r_{hl,\,disk}$ = 0.44
log (F_{disk}) = 4.1
Δx_{disk} = 0.2
Δy_{disk} = 0.43
r_{vscale} = 0.44

χ^2_ν=2.7
χ^2 = 1141
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

[O II] λλ3726,3729

v_0 = -59.2
v_0 = -39.6
I_0^{Spec1} = 3.5
I_0^{Spec1} = 13.7

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 637
dof = 548

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 9

[O II] λλ3726,3729

v_0 = -59.2
v_0 = -39.6
I_0^{Spec2} = 14.8
I_0^{Spec2} = 13.2

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 752
dof = 587

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

[O II] λλ3726,3729

v_0 = -59.2
v_0 = -39.6
I_0^{Spec3} = 66.4
I_0^{Spec3} = 41.7

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 657
dof = 636

Wavelength (Å)

#32

g_1 0.01 ± 0.07

g_2 0.09 ± 0.04

θ_{int} 2.85 ± 0.07

v_{circ} 145.36 ± 22.01

cos (i) 0.61 ± 0.09

$r_{hl,\,disk}$ 0.44 ± 0.04

log (F_{disk}) 4.15 ± 0.01

Δx_{disk} 0.20 ± 0.05

Δy_{disk} 0.44 ± 0.06

r_{vscale} 0.46 ± 0.18

O2 : v_0 -58.89 ± 7.15

O2b : v_0 -39.59 ± 5.31

O2 : I_0^{Spec1} 3.89 ± 2.43

O2b : I_0^{Spec1} 13.74 ± 3.73

O2 : I_0^{Spec2} 14.80 ± 1.42

O2b : I_0^{Spec2} 13.23 ± 0.63

O2 : I_0^{Spec3} 71.68 ± 44.18

O2b : I_0^{Spec3} 41.78 ± 2.51

#33 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 70

g_1 = -0.13
g_2 = -0.09
θ_{int} = -1.9
v_{circ} = 1.3e+02
cos (i) = 0.95
$r_{hl,\,disk}$ = 0.6
log (F_{disk}) = 4.7
Δx_{disk} = -0.16
Δy_{disk} = 0.011
r_{vscale} = 0.2

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 526
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

v_0 = -0.3
I_0^{Spec1} = 2.4

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 911
dof = 786

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -0.3
I_0^{Spec2} = 8.8

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 868
dof = 785

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -0.3
I_0^{Spec3} = 31.6

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 810
dof = 786

Hβ

Wavelength (Å)

#33

g_1 -0.12 ± 0.02

g_2 -0.09 ± 0.02

θ_{int} -1.95 ± 0.23

v_{circ} 127.23 ± 16.74

cos (i) 0.94 ± 0.03

$r_{hl,\,disk}$ 0.60 ± 0.01

log (F_{disk}) 4.71 ± 0.01

Δx_{disk} -0.15 ± 0.01

Δy_{disk} 0.01 ± 0.04

r_{vscale} 0.29 ± 0.24

Hb : v_0 -0.29 ± 3.66

Hb : I_0^{Spec1} 2.40 ± 0.78

Hb : I_0^{Spec2} 8.84 ± 0.45

Hb : I_0^{Spec3} 31.72 ± 3.04

#35 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 77

g_1 = -0.12
g_2 = -0.072
θ_{int} = -0.54
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.41
$r_{hl,\,disk}$ = 0.88
log (F_{disk}) = 4.9
Δx_{disk} = -0.16
Δy_{disk} = -0.21
r_{vscale} = 0.62

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 497
dof = 413

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -0.6
I_0^{Spec1} = 13.4

χ^2_ν=1.5
χ^2 = 1043
dof = 681

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 9

v_0 = -0.6
I_0^{Spec2} = 8.0

χ^2_ν=1.5
χ^2 = 1005
dof = 671

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12

v_0 = -0.6
I_0^{Spec3} = 45.8

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 753
dof = 666

Hβ

Wavelength (Å)

#35

g_1 -0.11 ± 0.02
g_2 -0.07 ± 0.05
θ_{int} -0.54 ± 0.04
v_{circ} 217.84 ± 14.81
cos (i) 0.41 ± 0.04
$r_{hl,\,disk}$ 0.88 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.92 ± 0.00
Δx_{disk} -0.16 ± 0.02
Δy_{disk} -0.21 ± 0.02
r_{vscale} 0.60 ± 0.11
Hb : v_0 -0.61 ± 4.15
Hb : I_0^{Spec1} 13.40 ± 0.81
Hb : I_0^{Spec2} 7.98 ± 0.47
Hb : I_0^{Spec3} 45.66 ± 2.39

#36 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 80

g_1 = -0.1
g_2 = -0.12
θ_{int} = -2.9
v_{circ} = 1.5e+02
cos (i) = 0.67
$r_{hl,disk}$ = 0.44
log (F_{disk}) = 4.7
Δx_{disk} = 0.044
Δy_{disk} = 0.41
r_{vscale} = 0.65

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 601
dof = 423

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 14 px
SNR = 0

v_0 = -10.0
I_0^{Spec1} = 0.6

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 668
dof = 465

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 14 px
SNR = 6

v_0 = -10.0
I_0^{Spec2} = 9.9

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 566
dof = 463

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 14 px
SNR = 7

v_0 = -10.0
I_0^{Spec3} = 29.5

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 507
dof = 462

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 14 px
SNR = -0

v_0 = -2.9
I_0^{Spec1} = 1.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 619
dof = 542

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 14 px
SNR = 4

v_0 = -2.9
I_0^{Spec2} = 7.4

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 526
dof = 542

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 14 px
SNR = 9

v_0 = -2.9
I_0^{Spec3} = 13.9

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 572
dof = 542

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#36

g_1 -0.10 ± 0.03
g_2 -0.11 ± 0.03
θ_{int} -2.89 ± 0.08
v_{circ} 153.42 ± 15.45
cos (i) 0.68 ± 0.05
$r_{hl,\,disk}$ 0.43 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.67 ± 0.00
Δx_{disk} 0.05 ± 0.05
Δy_{disk} 0.41 ± 0.03
r_{vscale} 0.66 ± 0.16
Hb : v_0 -10.08 ± 5.53
Hb : I_0^{Spec1} 0.74 ± 0.63
Hb : I_0^{Spec2} 9.90 ± 0.70
Hb : I_0^{Spec3} 29.47 ± 3.21
O3b : v_0 -2.81 ± 5.85
O3b : I_0^{Spec1} 1.38 ± 1.14
O3b : I_0^{Spec2} 7.39 ± 0.64
O3b : I_0^{Spec3} 13.85 ± 0.99

#39 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 20 px
N_DEC = 21 px
SNR = 60

g_1 = -0.097
g_2 = 0.027
θ_{int} = 0.86
v_{circ} = 93
cos (i) = 0.72
$r_{hl,\,disk}$ = 0.62
log (F_{disk}) = 4.6
Δx_{disk} = 0.15
Δy_{disk} = -0.33
r_{vscale} = 0.083

χ^2_ν=0.8
χ^2 = 341
dof = 406

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

[O III] λ5007

v_0 = 2.1
I_0^{Spec1} = 4.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 595
dof = 564

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

[O III] λ5007

v_0 = 2.1
I_0^{Spec2} = 15.9

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 691
dof = 503

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

[O III] λ5007

v_0 = 2.1
I_0^{Spec3} = 51.6

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 576
dof = 507

Wavelength (Å)

#39

g_1 -0.09 ± 0.03

g_2 0.02 ± 0.06

θ_{int} 0.87 ± 0.09

v_{circ} 93.78 ± 11.49

cos (i) 0.70 ± 0.09

$r_{hl,\,disk}$ 0.63 ± 0.04

log (F_{disk}) 4.65 ± 0.01

Δx_{disk} 0.15 ± 0.04

Δy_{disk} -0.32 ± 0.04

r_{vscale} 0.10 ± 0.07

O3b : v_0 2.21 ± 3.66

O3b : I_0^{Spec1} 4.05 ± 0.65

O3b : I_0^{Spec2} 15.85 ± 0.82

O3b : I_0^{Spec3} 51.67 ± 2.68

#40 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 48

g_1 = -0.099
g_2 = 0.15
θ_{int} = 1.9
v_{circ} = 1.8e+02
cos (i) = 0.92
$r_{hl,disk}$ = 1.1
log (F_{disk}) = 4.7
Δx_{disk} = 0.065
Δy_{disk} = 0.025
r_{vscale} = 0.45

χ^2_v=1.4
χ^2 = 580
dof = 423

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -5.3
I_0^{Spec1} = 6.0

χ^2_v=0.9
χ^2 = 468
dof = 508

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -5.3
I_0^{Spec2} = 18.4

χ^2_v=0.8
χ^2 = 384
dof = 502

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

v_0 = -5.3
I_0^{Spec3} = 21.3

χ^2_v=1.0
χ^2 = 513
dof = 499

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 10.0
I_0^{Spec1} = 20.8

χ^2_v=1.2
χ^2 = 907
dof = 778

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 10.0
I_0^{Spec2} = 27.7

χ^2_v=0.5
χ^2 = 391
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 20

v_0 = 10.0
I_0^{Spec3} = 167.5

χ^2_v=0.7
χ^2 = 550
dof = 782

[O III] λ5007

Wavelength (Å)


#40
g_1
-0.10 ± 0.02
g_2
0.15 ± 0.00
θ_{int}
1.89 ± 0.03
v_{circ}
174.64 ± 13.03
cos (i)
0.91 ± 0.01
$r_{hl,\,disk}$
1.13 ± 0.03
log (F_{disk})
4.74 ± 0.01
Δx_{disk}
0.06 ± 0.01
Δy_{disk}
0.03 ± 0.02
r_{vscale}
0.45 ± 0.11
Hb : v_0
-5.30 ± 2.71
Hb : I_0^{Spec1}
5.97 ± 0.82
Hb : I_0^{Spec2}
18.44 ± 1.44
Hb : I_0^{Spec3}
21.29 ± 1.06
O3b : v_0
9.99 ± 1.30
O3b : I_0^{Spec1}
20.86 ± 1.26
O3b : I_0^{Spec2}
27.67 ± 1.11
O3b : I_0^{Spec3}
167.59 ± 3.07

#42 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 39

g_1 = -0.13
g_2 = 0.088
θ_{int} = 2.1
v_{circ} = 1.1e+02
cos (i) = 0.33
$r_{hl,\,disk}$ = 0.56
log (F_{disk}) = 4.3
Δx_{disk} = 0.31
Δy_{disk} = -0.015
r_{vscale} = 0.63

χ^2_ν=1.5
χ^2 = 481
dof = 331

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -5

v_0 = -13.0
I_0^{Spec1} = 0.2

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 723
dof = 506

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = -13.0
I_0^{Spec2} = 7.0

χ^2_ν=1.6
χ^2 = 860
dof = 554

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = -13.0
I_0^{Spec3} = 7.0

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 702
dof = 633

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

v_0 = 3.1
I_0^{Spec1} = 2.2

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 827
dof = 668

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 3.1
I_0^{Spec2} = 15.6

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 912
dof = 666

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 3.1
I_0^{Spec3} = 23.5

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 676
dof = 660

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#42

g_1 -0.12 ± 0.03
g_2 0.08 ± 0.05
θ_{int} 2.13 ± 0.04
v_{circ} 115.95 ± 14.02
cos (*i*) 0.33 ± 0.05
$r_{hl,\,disk}$ 0.56 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.27 ± 0.01
Δx_{disk} 0.31 ± 0.02
Δy_{disk} -0.01 ± 0.01
r_{vscale} 0.66 ± 0.18
Hb : v_0 -12.72 ± 5.67
Hb : I_0^{Spec1} 0.24 ± 0.21
Hb : I_0^{Spec2} 6.99 ± 0.51
Hb : I_0^{Spec3} 7.01 ± 2.26
O3b : v_0 3.35 ± 3.48
O3b : I_0^{Spec1} 2.21 ± 0.54
O3b : I_0^{Spec2} 15.52 ± 0.87
O3b : I_0^{Spec3} 23.49 ± 2.21

#43 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 50

g_1 = 0.1
g_2 = 0.021
θ_{int} = 1.5
v_{circ} = 90
cos (i) = 0.75
$r_{hl,disk}$ = 0.42
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.41
Δy_{disk} = -0.21
r_{vscale} = 0.87

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 559
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -7

v_0 = 19.9
I_0^{Spec1} = 0.0

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1116
dof = 782

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 19.9
I_0^{Spec2} = 7.9

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 896
dof = 782

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 19.9
I_0^{Spec3} = 28.9

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 883
dof = 782

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -4

v_0 = 21.2
I_0^{Spec1} = 0.9

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 604
dof = 475

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = 21.2
I_0^{Spec2} = 9.1

χ^2_ν=2.0
χ^2 = 917
dof = 460

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 21.2
I_0^{Spec3} = 70.8

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 559
dof = 461

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#43

g_1 0.10 ± 0.04

g_2 0.02 ± 0.03

θ_{int} 1.50 ± 0.11

v_{circ} 90.17 ± 11.57

cos (i) 0.76 ± 0.06

$r_{hl,\,disk}$ 0.42 ± 0.02

log (F_{disk}) 4.43 ± 0.01

Δx_{disk} 0.41 ± 0.03

Δy_{disk} -0.21 ± 0.04

r_{vscale} 0.88 ± 0.28

Hb : v_0 19.91 ± 3.87

Hb : I_0^{Spec1} 0.06 ± 0.06

Hb : I_0^{Spec2} 7.89 ± 0.75

Hb : I_0^{Spec3} 28.94 ± 2.76

O3b : v_0 21.12 ± 3.03

O3b : I_0^{Spec1} 1.15 ± 0.93

O3b : I_0^{Spec2} 9.11 ± 0.63

O3b : I_0^{Spec3} 70.79 ± 3.08

#47 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 56

g_1 = -0.12
g_2 = 0.022
θ_{int} = 3.1
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.51
$r_{hl,\,disk}$ = 1
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = 0.21
Δy_{disk} = 0.1
r_{vscale} = 0.61

χ^2_ν=0.6
χ^2 = 241
dof = 423

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 14.4
I_0^{Spec1} = 0.9

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 695
dof = 554

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 14.4
I_0^{Spec2} = 3.9

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 573
dof = 537

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 12

v_0 = 14.4
I_0^{Spec3} = 72.8

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 619
dof = 457

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = 29.0
I_0^{Spec1} = 3.6

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 624
dof = 497

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 29.0
I_0^{Spec2} = 5.5

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 594
dof = 520

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 14

v_0 = 29.0
I_0^{Spec3} = 86.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 571
dof = 576

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#47

g_1 -0.12 ± 0.03
g_2 0.02 ± 0.02
θ_{int} 3.07 ± 0.46
v_{circ} 216.24 ± 12.26
cos (*i*) 0.52 ± 0.03
$r_{hl,\,disk}$ 1.03 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.78 ± 0.01
Δx_{disk} 0.21 ± 0.01
Δy_{disk} 0.11 ± 0.01
r_{vscale} 0.61 ± 0.10
Hb : v_0 14.53 ± 4.87
Hb : I_0^{Spec1} 1.06 ± 0.79
Hb : I_0^{Spec2} 3.90 ± 0.66
Hb : I_0^{Spec3} 72.84 ± 3.36
O3b : v_0 28.93 ± 2.96
O3b : I_0^{Spec1} 3.55 ± 0.34
O3b : I_0^{Spec2} 5.54 ± 0.32
O3b : I_0^{Spec3} 86.20 ± 2.44

#49 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 55

g_1 = 0.073
g_2 = 0.023
θ_{int} = 1.7
v_{circ} = 1e+02
cos (i) = 0.88
$r_{hl,\,disk}$ = 0.32
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.52
Δy_{disk} = -0.27
r_{vscale} = 2.2

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 596
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

Hβ

v_0 = -16.9
I_0^{Spec1} = 0.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 876
dof = 786

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -5

Hβ

v_0 = -16.9
I_0^{Spec2} = 10.8

χ^2_ν=1.8
χ^2 = 1407
dof = 786

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 0

Hβ

v_0 = -16.9
I_0^{Spec3} = 31.6

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1040
dof = 785

Wavelength (Å)

#49

g_1 0.07 ± 0.04

g_2 0.02 ± 0.06

θ_{int} 1.60 ± 0.48

v_{circ} 103.01 ± 14.13

cos (i) 0.88 ± 0.07

$r_{hl,\,disk}$ 0.33 ± 0.01

log (F_{disk}) 4.43 ± 0.00

Δx_{disk} 0.45 ± 0.16

Δy_{disk} -0.27 ± 0.21

r_{vscale} 2.20 ± 0.96

Hb : v_0 -17.02 ± 3.32

Hb : I_0^{Spec1} 0.32 ± 0.23

Hb : I_0^{Spec2} 10.79 ± 0.75

Hb : I_0^{Spec3} 31.60 ± 2.79


#50 Observation
Best fit model
Residual (= obs – model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 60
g_1 = 0.021
g_2 = 0.034
θ_{int} = 1.6
v_{circ} = 1.6e+02
cos (i) = 0.9
$r_{hl,disk}$ = 0.76
log (F_{disk}) = 4.9
Δx_{disk} = 0.31
Δy_{disk} = 0.042
r_{vscale} = 0.3
χ^2_v=0.4
χ^2 = 182
dof = 419
N
E
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1
[O II] λλ3726,3729
v_0 = -12.7
v_0 = -16.6
I_0^{Spec1} = 0.4
I_0^{Spec1} = 8.2
χ^2_v=1.2
χ^2 = 929
dof = 775
Spec set C
SNR = 7
I_0^{Spec2} = 4.4
I_0^{Spec2} = 9.7
χ^2_v=1.1
χ^2 = 824
dof = 752
Spec set B
SNR = 11
I_0^{Spec3} = 14.3
I_0^{Spec3} = 36.4
χ^2_v=1.0
χ^2 = 744
dof = 746
SNR = 10
I_0^{Spec1} = 14.4
χ^2_v=1.2
χ^2 = 841
dof = 693
SNR = 3
I_0^{Spec2} = 6.5
χ^2_v=1.3
χ^2 = 842
dof = 670
Hβ
I_0^{Spec3} = 32.7
χ^2_v=1.2
χ^2 = 756
dof = 650
Wavelength (Å)

#50

g_1 0.02 ± 0.02
g_2 0.03 ± 0.01
θ_{int} 1.56 ± 0.04
v_{circ} 163.63 ± 20.80
cos (*i*) 0.90 ± 0.04
$f_{hl,disk}$ 0.76 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.90 ± 0.01
Δx_{disk} 0.31 ± 0.01
Δy_{disk} 0.04 ± 0.02
r_{vscale} 0.34 ± 0.20
O2 : v_0 -12.74 ± 6.45
O2b : v_0 -16.65 ± 2.64
O2 : I_0^{Spec1} 0.50 ± 0.37
O2b : I_0^{Spec1} 8.16 ± 1.00
O2 : I_0^{Spec2} 4.44 ± 0.87
O2b : I_0^{Spec2} 9.74 ± 0.68
O2 : I_0^{Spec3} 14.31 ± 1.51
O2b : I_0^{Spec3} 36.44 ± 1.96
Hb : v_0 -10.82 ± 2.62
Hb : I_0^{Spec1} 14.38 ± 1.31
Hb : I_0^{Spec2} 6.52 ± 0.98
Hb : I_0^{Spec3} 32.65 ± 1.68

#52 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 59

g_1 = -0.15
g_2 = -0.14
θ_{int} = 2.6
v_{circ} = 1.3e+02
cos (i) = 0.55
$r_{hl,disk}$ = 0.38
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.37
Δy_{disk} = 0.32
r_{vscale} = 0.65

χ^2_ν=1.8
χ^2 = 749
dof = 423

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -3

v_0 = -16.5
I_0^{Spec1} = 0.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 935
dof = 782

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = -16.5
I_0^{Spec2} = 10.2

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1080
dof = 774

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = -16.5
I_0^{Spec3} = 49.2

χ^2_ν=1.7
χ^2 = 1189
dof = 717

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = -38.9
I_0^{Spec1} = 0.8

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 951
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

v_0 = -38.9
I_0^{Spec2} = 22.2

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 920
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -38.9
I_0^{Spec3} = 144.0

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 932
dof = 782

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#52

g_1 -0.14 ± 0.01
g_2 -0.13 ± 0.02
θ_{int} 2.56 ± 0.03
v_{circ} 134.14 ± 12.96
cos (*i*) 0.55 ± 0.03
$r_{hl,\,disk}$ 0.38 ± 0.01
log (F_{disk}) 4.45 ± 0.00
Δx_{disk} 0.37 ± 0.02
Δy_{disk} 0.32 ± 0.02
r_{vscale} 0.67 ± 0.15
Hb : v_0 -15.23 ± 9.32
Hb : I_0^{Spec1} 0.47 ± 0.42
Hb : I_0^{Spec2} 10.25 ± 0.93
Hb : I_0^{Spec3} 49.34 ± 3.57
O3b : v_0 -38.36 ± 3.59
O3b : I_0^{Spec1} 0.82 ± 0.41
O3b : I_0^{Spec2} 22.23 ± 0.76
O3b : I_0^{Spec3} 144.05 ± 4.23


#54 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 75
g_1 = 0.063
g_2 = -0.095
θ_{int} = -0.54
v_{circ} = 90
cos (i) = 0.8
$r_{hl,disk}$ = 0.48
log (F_{disk}) = 4.7
Δx_{disk} = -0.14
Δy_{disk} = -0.1
r_{vscale} = 0.25
χ^2_v=1.6
χ^2 = 669
dof = 419
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Spec set C
Spec set B
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0
SNR = 7
SNR = 5
SNR = 1
SNR = -1
SNR = -6
Hβ
[O III] λ4959
[O III] λ5007
v_0 = -26.9
f_0^{spec1} = 1.1
f_0^{spec2} = 9.6
f_0^{spec3} = 65.1
v_0 = -2.0
f_0^{spec1} = 0.7
f_0^{spec2} = 4.9
f_0^{spec3} = 10.5
v_0 = -21.3
f_0^{spec1} = 4.3
f_0^{spec2} = 15.6
f_0^{spec3} = 153.4
χ^2_v=1.6
χ^2 = 975
dof = 626
χ^2_v=1.3
χ^2 = 809
dof = 621
χ^2_v=1.2
χ^2 = 778
dof = 625
χ^2_v=1.1
χ^2 = 859
dof = 778
χ^2_v=1.1
χ^2 = 839
dof = 778
χ^2_v=1.1
χ^2 = 858
dof = 778
χ^2_v=1.5
χ^2 = 1184
dof = 778
χ^2_v=1.2
χ^2 = 899
dof = 777
χ^2_v=1.0
χ^2 = 795
dof = 777
Wavelength (Å)

#54

g_1 0.06 ± 0.03
g_2 -0.08 ± 0.05
θ_{int} -0.55 ± 0.09
v_{circ} 90.45 ± 11.85
cos (i) 0.78 ± 0.09
$r_{hl,disk}$ 0.48 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.68 ± 0.00
Δx_{disk} -0.14 ± 0.01
Δy_{disk} -0.10 ± 0.02
r_{vscale} 0.30 ± 0.21
Hb : v_0 -26.78 ± 6.55
Hb : I_0^{Spec} 1.22 ± 0.79
Hb : I_0^{Spec2} 9.62 ± 0.76
Hb : I_0^{Spec3} 65.09 ± 3.55
O3a : v_0 -1.66 ± 11.58
O3a : I_0^{Spec1} 0.76 ± 0.46
O3a : I_0^{Spec2} 4.94 ± 0.71
O3a : I_0^{Spec3} 10.47 ± 2.66
O3b : v_0 -21.41 ± 3.28
O3b : I_0^{Spec1} 4.33 ± 0.77
O3b : I_0^{Spec2} 15.57 ± 0.72
O3b : I_0^{Spec3} 153.48 ± 5.25

#55 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 56

g_1 = -0.13
g_2 = -0.021
θ_{int} = -2.4
v_{circ} = 1.7e+02
cos (i) = 0.5
$r_{hl,disk}$ = 0.88
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = -0.11
Δy_{disk} = 0.14
r_{vscale} = 0.58

χ^2_ν=0.7
χ^2 = 237
dof = 353

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -25.6
I_0^{Spec1} = 3.9

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 743
dof = 634

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

v_0 = -25.6
I_0^{Spec2} = 17.8

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 753
dof = 636

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12

v_0 = -25.6
I_0^{Spec3} = 17.8

χ^2_ν=1.5
χ^2 = 929
dof = 632

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -9

v_0 = -13.4
I_0^{Spec1} = 0.9

χ^2_ν=1.8
χ^2 = 1370
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12

v_0 = -13.4
I_0^{Spec2} = 8.7

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 734
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -13.4
I_0^{Spec3} = 40.4

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 817
dof = 782

[O III] λ5007

Wavelength (Å)


#55
g_1
-0.13 ± 0.02
g_2
-0.02 ± 0.06
θ_{int}
-2.41 ± 0.03
v_{circ}
169.80 ± 12.26
cos (i)
0.50 ± 0.07
$r_{hl,disk}$
0.89 ± 0.05
log (F_{disk})
4.78 ± 0.01
Δx_{disk}
-0.11 ± 0.01
Δy_{disk}
0.14 ± 0.02
r_{vscale}
0.59 ± 0.14
Hb : v_0
-25.82 ± 4.32
Hb : I_0^{Spec1}
4.43 ± 2.90
Hb : I_0^{Spec2}
17.79 ± 1.46
Hb : I_0^{Spec3}
17.79 ± 1.24
O3b : v_0
-13.41 ± 3.34
O3b : I_0^{Spec1}
0.99 ± 0.61
O3b : I_0^{Spec2}
8.67 ± 0.48
O3b : I_0^{Spec3}
40.40 ± 2.52

#56 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 75

g_1 = 0.069
g_2 = -0.096
θ_{int} = -0.55
v_{circ} = 1.4e+02
cos (i) = 0.75
$r_{hl,\,disk}$ = 0.68
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = -0.073
Δy_{disk} = -0.2
r_{vscale} = 0.21

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 460
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

[O III] λ5007

v_0 = -13.4
I_0^{Spec1} = 8.3

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 921
dof = 718

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 14

[O III] λ5007

v_0 = -13.4
I_0^{Spec2} = 14.1

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 978
dof = 723

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

[O III] λ5007

v_0 = -13.4
I_0^{Spec3} = 36.1

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 763
dof = 643

Wavelength (Å)

#56

g_1 0.04 ± 0.07

g_2 -0.05 ± 0.09

θ_{int} -0.54 ± 0.07

v_{circ} 139.70 ± 19.47

cos (i) 0.69 ± 0.15

$r_{hl,\,disk}$ 0.73 ± 0.08

log (F_{disk}) 4.83 ± 0.00

Δx_{disk} -0.07 ± 0.02

Δy_{disk} -0.18 ± 0.04

r_{vscale} 0.36 ± 0.34

O3b : v_0 -13.64 ± 3.26

O3b : I_0^{Spec1} 8.25 ± 0.77

O3b : I_0^{Spec2} 14.08 ± 0.54

O3b : I_0^{Spec3} 36.06 ± 1.52

#57 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 91

g_1 = -0.02
g_2 = -0.083
θ_{int} = -0.53
v_{circ} = 1.5e+02
cos (i) = 0.69
$r_{hl,disk}$ = 0.5
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = -0.36
Δy_{disk} = -0.19
r_{vscale} = 0.044

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 482
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 32.0
I_0^{Spec1} = 2.6

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 649
dof = 574

[O III] λ5007

Spec set C

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 32.0
I_0^{Spec2} = 33.6

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 593
dof = 586

[O III] λ5007

Spec set B

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

v_0 = 32.0
I_0^{Spec3} = 204.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 705
dof = 637

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#57

g_1 -0.03 ± 0.03

g_2 -0.07 ± 0.05

θ_{int} -0.53 ± 0.04

v_{circ} 146.78 ± 15.99

cos (i) 0.68 ± 0.08

$r_{hl,\,disk}$ 0.50 ± 0.03

log (F_{disk}) 4.82 ± 0.00

Δx_{disk} -0.36 ± 0.01

Δy_{disk} -0.19 ± 0.02

r_{vscale} 0.06 ± 0.04

O3b : v_0 32.10 ± 3.35

O3b : I_0^{Spec1} 2.57 ± 0.66

O3b : I_0^{Spec2} 33.69 ± 2.05

O3b : I_0^{Spec3} 203.57 ± 36.51


#59 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 95
g_1 = -0.15
g_2 = -0.07
θ_{int} = 3.1
v_{circ} = 1.3e+02
cos (i) = 0.91
$r_{ht,disk}$ = 0.25
log (F_{disk}) = 4.7
Δx_{disk} = 0.8
Δy_{disk} = 0.28
r_{vscale} = 0.38
χ^2_ν = 2.2
χ^2 = 930
dof = 419
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Spec set C
Spec set B
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -5
v_0 = -6.5
f_0^{spec1} = 0.5
χ^2_ν = 1.1
χ^2 = 645
dof = 563
Hγ
SNR = 12
f_0^{spec2} = 14.4
χ^2_ν = 1.7
χ^2 = 975
dof = 576
SNR = 7
f_0^{spec3} = 103.5
χ^2_ν = 1.2
χ^2 = 697
dof = 586
v_0 = 4.3
SNR = 3
f_0^{spec1} = 3.4
χ^2_ν = 1.3
χ^2 = 827
dof = 629
[O III] λ4959
SNR = 20
f_0^{spec2} = 26.9
χ^2_ν = 1.3
χ^2 = 834
dof = 634
SNR = 15
f_0^{spec3} = 81.2
χ^2_ν = 1.3
χ^2 = 790
dof = 619
v_0 = -2.3
SNR = 6
f_0^{spec1} = 4.6
χ^2_ν = 1.2
χ^2 = 926
dof = 778
[O III] λ5007
SNR = 46
f_0^{spec2} = 77.1
χ^2_ν = 0.8
χ^2 = 611
dof = 777
SNR = 38
f_0^{spec3} = 265.7
χ^2_ν = 1.0
χ^2 = 765
dof = 777
Wavelength (Å)

#59

g_1 -0.14 ± 0.01
g_2 -0.07 ± 0.01
θ_{int} 3.12 ± 0.02
v_{circ} 133.13 ± 15.25
cos (*i*) 0.91 ± 0.02
$r_{hl,disk}$ 0.25 ± 0.00
log (F_{disk}) 4.73 ± 0.00
Δx_{disk} 0.80 ± 0.02
Δy_{disk} 0.28 ± 0.02
r_{vscale} 0.40 ± 0.16
Hg : v_0 -6.16 ± 4.61
Hg : I_0^{Spec1} 0.74 ± 0.67
Hg : I_0^{Spec2} 14.44 ± 0.57
Hg : I_0^{Spec3} 103.50 ± 6.23
O3a : v_0 4.52 ± 3.45
O3a : I_0^{Spec1} 3.63 ± 2.05
O3a : I_0^{Spec2} 26.96 ± 0.64
O3a : I_0^{Spec3} 81.24 ± 2.39
O3b : v_0 -2.22 ± 1.53
O3b : I_0^{Spec1} 4.65 ± 0.31
O3b : I_0^{Spec2} 77.10 ± 0.91
O3b : I_0^{Spec3} 265.76 ± 3.53


#60 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 65
g_1 = 0.05
g_2 = 0.11
θ_{int} = 2.2
v_{circ} = 1.3e+02
cos (i) = 0.75
$r_{hl,disk}$ = 0.53
log (F_{disk}) = 4.6
Δx_{disk} = 0.35
Δy_{disk} = -0.0028
r_{vscale} = 2
χ^2_ν = 1.9
χ^2 = 803
dof = 419
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4
Hβ
v_0 = -4.6
f_0^{spec1} = 2.7
χ^2_ν = 1.1
χ^2 = 717
dof = 675
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 14
Hβ
v_0 = -4.6
f_0^{spec2} = 27.3
χ^2_ν = 1.0
χ^2 = 677
dof = 674
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3
Hβ
v_0 = -4.6
f_0^{spec3} = 53.5
χ^2_ν = 1.2
χ^2 = 789
dof = 668
Spec set A
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3
[O III] λ4959
v_0 = -10.2
f_0^{spec1} = 2.2
χ^2_ν = 1.2
χ^2 = 904
dof = 778
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3
[O III] λ4959
v_0 = -10.2
f_0^{spec2} = 7.5
χ^2_ν = 1.2
χ^2 = 901
dof = 778
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1
[O III] λ4959
v_0 = -10.2
f_0^{spec3} = 34.9
χ^2_ν = 1.1
χ^2 = 853
dof = 777
Spec set A
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1
[O III] λ5007
v_0 = -4.2
f_0^{spec1} = 0.4
χ^2_ν = 1.2
χ^2 = 657
dof = 547
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 15
[O III] λ5007
v_0 = -4.2
f_0^{spec2} = 78.7
χ^2_ν = 2.4
χ^2 = 1370
dof = 562
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 15
[O III] λ5007
v_0 = -4.2
f_0^{spec3} = 614.7
χ^2_ν = 1.9
χ^2 = 1052
dof = 567
Wavelength (Å)

#60

g_1 0.05 ± 0.02
g_2 0.10 ± 0.03
θ_{int} 2.24 ± 0.07
v_{circ} 126.60 ± 16.14
cos (i) 0.76 ± 0.06
$r_{hl,\,disk}$ 0.52 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.63 ± 0.00
Δx_{disk} 0.35 ± 0.01
Δy_{disk} -0.00 ± 0.02
r_{vscale} 2.02 ± 0.43
Hb : v_0 -4.54 ± 1.61
Hb : I_0^{Spect} 2.73 ± 0.53
Hb : I_0^{Spec2} 27.31 ± 1.04
Hb : I_0^{Spec3} 53.49 ± 2.45
O3a : v_0 -10.18 ± 3.65
O3a : I_0^{Spec1} 2.24 ± 0.46
O3a : I_0^{Spec2} 7.53 ± 0.73
O3a : I_0^{Spec3} 34.86 ± 2.75
O3b : v_0 -4.22 ± 1.22
O3b : I_0^{Spec1} 0.47 ± 0.26
O3b : I_0^{Spec2} 78.71 ± 2.23
O3b : I_0^{Spec3} 614.89 ± 18.40

#61 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 33

g_1 = -0.0059
g_2 = -0.086
θ_{int} = -0.4
v_{circ} = 85
cos (i) = 0.26
$r_{hl,disk}$ = 0.69
log (F_{disk}) = 4.3
Δx_{disk} = -0.13
Δy_{disk} = -0.23
r_{vscale} = 0.28

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 507
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

[O III] λ5007

v_0 = 43.2
I_0^{Spec1} = 3.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 847
dof = 785

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

[O III] λ5007

v_0 = 43.2
I_0^{Spec2} = 1.9

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 791
dof = 785

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

[O III] λ5007

v_0 = 43.2
I_0^{Spec3} = 148.5

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 978
dof = 786

Wavelength (Å)

#61

g_1 -0.00 ± 0.08

g_2 -0.07 ± 0.07

θ_{int} -0.41 ± 0.09

v_{circ} 85.88 ± 11.87

cos (i) 0.26 ± 0.06

$r_{hl,\,disk}$ 0.70 ± 0.06

log (F_{disk}) 4.29 ± 0.01

Δx_{disk} -0.13 ± 0.04

Δy_{disk} -0.23 ± 0.04

r_{vscale} 0.36 ± 0.32

O3b : v_0 43.85 ± 9.27

O3b : I_0^{Spec1} 3.23 ± 1.44

O3b : I_0^{Spec2} 1.97 ± 1.15

O3b : I_0^{Spec3} 148.22 ± 10.59

#63 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 83

g_1 = -0.12
g_2 = -0.033
θ_{int} = -1.8
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.35
$r_{hl,disk}$ = 0.72
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = -0.26
Δy_{disk} = 0.12
r_{vscale} = 0.82

χ^2_v=2.2
χ^2 = 911
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set *A*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -3

v_0 = 23.1
I_0^{Spec1} = 0.3

χ^2_v=1.2
χ^2 = 736
dof = 632

Hβ

Spec set *C*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 23.1
I_0^{Spec2} = 15.0

χ^2_v=1.3
χ^2 = 790
dof = 631

Hβ

Spec set *B*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

v_0 = 23.1
I_0^{Spec3} = 13.1

χ^2_v=1.1
χ^2 = 732
dof = 638

Hβ

Spec set *A*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -5

v_0 = -25.4
I_0^{Spec1} = 0.7

χ^2_v=1.2
χ^2 = 933
dof = 782

[O III] λ4959

Spec set *C*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -25.4
I_0^{Spec2} = 20.4

χ^2_v=1.3
χ^2 = 1004
dof = 782

[O III] λ4959

Spec set *B*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -25.4
I_0^{Spec3} = 12.5

χ^2_v=0.9
χ^2 = 743
dof = 782

[O III] λ4959

Wavelength (Å)

#63

g_1 -0.12 ± 0.03
g_2 -0.03 ± 0.03
θ_{int} -1.80 ± 0.04
v_{circ} 200.47 ± 14.01
cos (i) 0.34 ± 0.03
$r_{hl,\,disk}$ 0.73 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.76 ± 0.00
Δx_{disk} -0.26 ± 0.01
Δy_{disk} 0.12 ± 0.01
r_{vscale} 0.82 ± 0.11
Hb : v_0 23.16 ± 4.10
Hb : I_0^{Spec1} 0.44 ± 0.43
Hb : I_0^{Spec2} 15.07 ± 0.95
Hb : I_0^{Spec3} 13.12 ± 1.15
O3a : v_0 -25.32 ± 2.31
O3a : I_0^{Spec1} 0.80 ± 0.54
O3a : I_0^{Spec2} 20.40 ± 0.82
O3a : I_0^{Spec3} 12.49 ± 0.80

#64 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 29

g_1 = 0.11
g_2 = -0.015
θ_{int} = -0.99
v_{circ} = 81
cos (i) = 0.62
$r_{hl,disk}$ = 0.54
log (F_{disk}) = 4.1
Δx_{disk} = -0.44
Δy_{disk} = -0.17
r_{vscale} = 1.8

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 511
dof = 372

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = -45.2
I_0^{Spec1} = 2.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 820
dof = 667

[O III] λ4959

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = -45.2
I_0^{Spec2} = 3.1

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 842
dof = 674

[O III] λ4959

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -4

v_0 = -45.2
I_0^{Spec3} = 29.1

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 802
dof = 675

[O III] λ4959

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -15

v_0 = -45.2
I_0^{Spec1} = 0.4

χ^2_ν=2.0
χ^2 = 1540
dof = 758

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -45.2
I_0^{Spec2} = 13.6

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1047
dof = 777

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -45.2
I_0^{Spec3} = 263.4

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1041
dof = 755

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#64

g_1 0.10 ± 0.03
g_2 -0.01 ± 0.08
θ_{int} -1.00 ± 0.09
v_{circ} 82.01 ± 12.61
cos (i) 0.62 ± 0.10
$r_{hl,\,disk}$ 0.54 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.13 ± 0.01
Δx_{disk} -0.44 ± 0.04
Δy_{disk} -0.17 ± 0.04
r_{vscale} 1.80 ± 0.56
O3a : v_0 -45.22 ± 4.63
O3a : I_0^{Spec1} 2.92 ± 2.32
O3a : I_0^{Spec2} 3.06 ± 0.77
O3a : I_0^{Spec3} 29.07 ± 3.32
O3b : v_0 -45.30 ± 2.24
O3b : I_0^{Spec1} 0.56 ± 0.45
O3b : I_0^{Spec2} 13.61 ± 0.61
O3b : I_0^{Spec3} 263.19 ± 8.14

#65 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 55

g_1 = 0.1
g_2 = -0.13
θ_{int} = 1.1
v_{circ} = 1.7e+02
cos (i) = 0.7
$r_{hl,disk}$ = 0.53
log (F_{disk}) = 4.5
Δx_{disk} = 0.1
Δy_{disk} = -0.36
r_{vscale} = 0.58

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 435
dof = 419

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -45.8
v_0 = -43.4
I_0^{Spec1} = 0.9
I_0^{Spec1} = 6.4

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 882
dof = 683

[O II] λλ3726,3729

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 10

v_0 = -45.8
v_0 = -43.4
I_0^{Spec2} = 9.0
I_0^{Spec2} = 14.5

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 707
dof = 684

[O II] λλ3726,3729

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

v_0 = -45.8
v_0 = -43.4
I_0^{Spec3} = 84.7
I_0^{Spec3} = 83.5

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 728
dof = 685

[O II] λλ3726,3729

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -2.8
I_0^{Spec1} = 0.5

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 541
dof = 515

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -2.8
I_0^{Spec2} = 14.9

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 737
dof = 519

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -2.8
I_0^{Spec3} = 26.8

χ^2_ν=1.8
χ^2 = 906
dof = 507

Hβ

Wavelength (Å)

#65

g_1 0.10 ± 0.04
g_2 -0.13 ± 0.02
θ_{int} 1.08 ± 0.12
v_{circ} 168.61 ± 16.75
cos (i) 0.70 ± 0.04
$r_{hl,disk}$ 0.53 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.55 ± 0.01
Δx_{disk} 0.09 ± 0.06
Δy_{disk} -0.36 ± 0.02
r_{vscale} 0.60 ± 0.16
O2 : v_0 -46.11 ± 5.26
O2b : v_0 -43.77 ± 5.33
O2 : I_0^{Spec1} 1.07 ± 0.82
O2b : I_0^{Spec1} 6.32 ± 2.25
O2 : I_0^{Spec2} 9.05 ± 0.53
O2b : I_0^{Spec2} 14.46 ± 0.98
O2 : I_0^{Spec3} 84.83 ± 4.49
O2b : I_0^{Spec3} 83.46 ± 5.09
Hb : v_0 -3.73 ± 15.77
Hb : I_0^{Spec1} 0.55 ± 0.37
Hb : I_0^{Spec2} 16.88 ± 7.29
Hb : I_0^{Spec3} 26.80 ± 3.10

#67 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 39

g_1 = -0.07
g_2 = -0.029
θ_{int} = -1.8
v_{circ} = 78
cos (i) = 0.72
$r_{hl,\,disk}$ = 0.41
log (F_{disk}) = 4.2
Δx_{disk} = -0.34
Δy_{disk} = 0.23
r_{vscale} = 0.35

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 533
dof = 382

N, E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -11

v_0 = 42.9
I_0^{Spec1} = 0.8

χ^2_ν=1.7
χ^2 = 1015
dof = 597

[O III] λ4959

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 42.9
I_0^{Spec2} = 12.7

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 651
dof = 569

[O III] λ4959

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = 42.9
I_0^{Spec3} = 9.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 676
dof = 589

[O III] λ4959

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = 31.4
I_0^{Spec1} = 4.9

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 685
dof = 609

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = 31.4
I_0^{Spec2} = 13.4

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 705
dof = 607

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 31.4
I_0^{Spec3} = 194.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 689
dof = 641

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#67

g_1 -0.05 ± 0.07
g_2 -0.03 ± 0.06
θ_{int} -1.80 ± 0.19
v_{circ} 79.76 ± 11.29
cos (i) 0.70 ± 0.11
$r_{hl,\,disk}$ 0.41 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.24 ± 0.01
Δx_{disk} -0.34 ± 0.06
Δy_{disk} 0.23 ± 0.06
r_{vscale} 0.41 ± 0.26
O3a : v_0 42.96 ± 9.42
O3a : I_0^{Spec1} 1.12 ± 1.00
O3a : I_0^{Spec2} 12.71 ± 2.67
O3a : I_0^{Spec3} 9.27 ± 2.17
O3b : v_0 31.39 ± 7.18
O3b : I_0^{Spec1} 5.29 ± 3.09
O3b : I_0^{Spec2} 13.53 ± 1.64
O3b : I_0^{Spec3} 195.43 ± 30.03

#69 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 53

g_1 = 0.074
g_2 = -0.045
θ_{int} = 0.62
v_{circ} = 1.4e+02
cos (i) = 0.57
$r_{hl,disk}$ = 0.98
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = -0.014
Δy_{disk} = -0.15
r_{vscale} = 1.6

χ^2_v=0.6
χ^2 = 239
dof = 399

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -22.1
I_0^{Spec1} = 0.9

χ^2_v=1.2
χ^2 = 706
dof = 580

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -22.1
I_0^{Spec2} = 7.6

χ^2_v=1.7
χ^2 = 922
dof = 537

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -22.1
I_0^{Spec3} = 15.0

χ^2_v=1.6
χ^2 = 945
dof = 582

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -11

v_0 = -28.2
I_0^{Spec1} = 0.1

χ^2_v=1.7
χ^2 = 1300
dof = 782

[O III] λ4959

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -28.2
I_0^{Spec2} = 7.3

χ^2_v=1.1
χ^2 = 869
dof = 782

[O III] λ4959

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -28.2
I_0^{Spec3} = 2.3

χ^2_v=1.1
χ^2 = 859
dof = 782

[O III] λ4959

Wavelength (Å)

#69

g_1 0.06 ± 0.06
g_2 -0.04 ± 0.07
θ_{int} 0.60 ± 0.12
v_{circ} 145.86 ± 20.30
cos (*i*) 0.59 ± 0.10
$r_{hl,disk}$ 0.98 ± 0.08
log (F_{disk}) 4.77 ± 0.01
Δx_{disk} -0.02 ± 0.03
Δy_{disk} -0.16 ± 0.03
r_{vscale} 1.66 ± 0.51
Hb : v_0 -22.38 ± 4.20
Hb : I_0^{Spec1} 0.88 ± 0.34
Hb : I_0^{Spec2} 7.60 ± 0.40
Hb : I_0^{Spec3} 14.98 ± 1.11
O3a : v_0 -28.15 ± 4.39
O3a : I_0^{Spec1} 0.12 ± 0.11
O3a : I_0^{Spec2} 7.27 ± 0.52
O3a : I_0^{Spec3} 2.39 ± 1.18

#70 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 74

g_1 = 0.043
g_2 = 0.0075
θ_{int} = 0.43
v_{circ} = 1.2e+02
cos (i) = 0.93
$r_{hl,\,disk}$ = 0.34
log (F_{disk}) = 4.6
Δx_{disk} = 0.035
Δy_{disk} = -0.14
r_{vscale} = 0.45

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 457
dof = 380

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 14 px
SNR = 8

v_0 = -4.0
I_0^{Spec1} = 8.7

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 437
dof = 427

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 14 px
SNR = 7

v_0 = -4.0
I_0^{Spec2} = 9.0

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 488
dof = 421

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 14 px
SNR = 10

v_0 = -4.0
I_0^{Spec3} = 29.4

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 461
dof = 418

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 14 px
SNR = 10

v_0 = -20.3
I_0^{Spec1} = 5.5

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 539
dof = 451

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 14 px
SNR = 13

v_0 = -20.3
I_0^{Spec2} = 17.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 559
dof = 451

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 14 px
SNR = 8

v_0 = -20.3
I_0^{Spec3} = 56.2

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 534
dof = 449

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#70

g_1 0.04 ± 0.03
g_2 0.00 ± 0.03
θ_{int} 0.42 ± 0.13
v_{circ} 118.68 ± 16.05
cos (i) 0.91 ± 0.07
$r_{hl,\,disk}$ 0.34 ± 0.01
log (F_{disk}) 4.62 ± 0.00
Δx_{disk} 0.03 ± 0.02
Δy_{disk} -0.14 ± 0.01
r_{vscale} 0.58 ± 0.48
Hb : v_0 -3.92 ± 4.59
Hb : I_0^{Spec1} 8.72 ± 0.64
Hb : I_0^{Spec2} 8.97 ± 0.62
Hb : I_0^{Spec3} 29.47 ± 2.09
O3b : v_0 -20.38 ± 2.94
O3b : I_0^{Spec1} 5.51 ± 0.42
O3b : I_0^{Spec2} 17.29 ± 0.83
O3b : I_0^{Spec3} 56.27 ± 2.68

#72 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 72

g_1 = 0.13
g_2 = 0.083
θ_{int} = 1.7
v_{circ} = 2.2e+02
cos (i) = 0.61
$r_{hl,disk}$ = 0.8
log (F_{disk}) = 5
Δx_{disk} = 0.23
Δy_{disk} = -0.13
r_{vscale} = 0.79

χ^2_v=0.5
χ^2 = 234
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -15.5
I_0^{Spec1} = 7.5

χ^2_v=1.0
χ^2 = 817
dof = 786

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 9

v_0 = -15.5
I_0^{Spec2} = 21.1

χ^2_v=1.1
χ^2 = 857
dof = 786

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 9

v_0 = -15.5
I_0^{Spec3} = 37.6

χ^2_v=1.1
χ^2 = 855
dof = 786

Hβ

Wavelength (Å)

#72

g_1 0.13 ± 0.02
g_2 0.08 ± 0.02
θ_{int} 1.69 ± 0.04
v_{circ} 224.87 ± 16.43
cos (i) 0.61 ± 0.03
$r_{hl,\,disk}$ 0.80 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.99 ± 0.00
Δx_{disk} 0.23 ± 0.01
Δy_{disk} -0.13 ± 0.01
r_{vscale} 0.79 ± 0.13
Hb : v_0 -15.56 ± 2.69
Hb : I_0^{Spec1} 7.44 ± 1.29
Hb : I_0^{Spec2} 21.09 ± 0.82
Hb : I_0^{Spec3} 37.58 ± 1.42

#75 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 74

g_1 = 0.098
g_2 = -0.048
θ_{int} = -2.3
v_{circ} = 1.5e+02
cos (i) = 0.9
$r_{hl,disk}$ = 1.2
log (F_{disk}) = 4.9
Δx_{disk} = -0.12
Δy_{disk} = 0.12
r_{vscale} = 0.74

χ^2_ν=1.8
χ^2 = 578
dof = 318

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 18

[O II] $\lambda\lambda$3726,3729

v_0 = -87.6
v_0 = -92.6
I_0^{Spec1} = 48.5
I_0^{Spec1} = 63.1

χ^2_ν=1.9
χ^2 = 1350
dof = 693

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 13

[O II] $\lambda\lambda$3726,3729

v_0 = -87.6
v_0 = -92.6
I_0^{Spec2} = 15.6
I_0^{Spec2} = 25.9

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 871
dof = 673

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

[O II] $\lambda\lambda$3726,3729

v_0 = -87.6
v_0 = -92.6
I_0^{Spec3} = 1.4
I_0^{Spec3} = 6.9

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 757
dof = 779

Wavelength (Å)

#75

g_1 0.10 ± 0.02
g_2 -0.05 ± 0.03
θ_{int} -2.34 ± 0.12
v_{circ} 153.33 ± 21.40
cos (i) 0.90 ± 0.05
$r_{hl,\,disk}$ 1.16 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.92 ± 0.01
Δx_{disk} -0.12 ± 0.02
Δy_{disk} 0.12 ± 0.02
r_{vscale} 0.76 ± 0.35
O2 : v_0 -87.62 ± 3.54
O2b : v_0 -92.63 ± 2.53
O2 : I_0^{Spec1} 48.44 ± 2.88
O2b : I_0^{Spec1} 63.00 ± 2.21
O2 : I_0^{Spec2} 15.58 ± 1.00
O2b : I_0^{Spec2} 25.93 ± 0.98
O2 : I_0^{Spec3} 1.73 ± 1.26
O2b : I_0^{Spec3} 7.03 ± 3.41

#77 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 61

g_1 = 0.072
g_2 = -0.055
θ_{int} = 0.19
v_{circ} = 1.2e+02
cos (i) = 0.54
$r_{hl,disk}$ = 0.62
log (F_{disk}) = 4.6
Δx_{disk} = -0.05
Δy_{disk} = -0.4
r_{vscale} = 0.43

χ^2_ν=1.5
χ^2 = 639
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -3

v_0 = -4.2
I_0^{Spec1} = 7.3

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 996
dof = 786

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = -4.2
I_0^{Spec2} = 8.7

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 964
dof = 786

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = -4.2
I_0^{Spec3} = 0.8

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 833
dof = 786

Hβ

Wavelength (Å)

#77

g_1 0.05 ± 0.08

g_2 -0.03 ± 0.09

θ_{int} 0.14 ± 0.18

v_{circ} 118.18 ± 16.70

cos (i) 0.53 ± 0.08

$r_{hl,disk}$ 0.64 ± 0.05

log (F_{disk}) 4.55 ± 0.01

Δx_{disk} -0.08 ± 0.11

Δy_{disk} -0.39 ± 0.06

r_{vscale} 0.47 ± 0.28

Hb : v_0 -0.71 ± 11.87

Hb : I_0^{Spec1} 7.27 ± 0.66

Hb : I_0^{Spec2} 8.71 ± 0.88

Hb : I_0^{Spec3} 1.00 ± 0.87


#78 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 79
g_1 = -0.15
g_2 = -0.14
θ_{int} = -0.63
v_{circ} = 1.6e+02
cos (i) = 0.61
$r_{hl,disk}$ = 0.8
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = -0.027
Δy_{disk} = -0.072
r_{vscale} = 1.6
χ^2_v=7.6
χ^2 = 3175
dof = 419
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Spec set C
Spec set B
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 6
SNR = 9
SNR = -6
SNR = 11
SNR = 10
SNR = -5
SNR = 26
SNR = 22
SNR = 6
Hβ
[O III] λ4959
[O III] λ5007
v_0 = 5.5
σ_0^{spec1} = 27.6
σ_0^{spec2} = 21.3
σ_0^{spec3} = 7.0
v_0 = -4.7
σ_0^{spec1} = 19.8
σ_0^{spec2} = 18.7
σ_0^{spec3} = 31.1
v_0 = -0.7
σ_0^{spec1} = 58.9
σ_0^{spec2} = 53.4
σ_0^{spec3} = 83.3
χ^2_v=1.1
χ^2 = 696
dof = 627
χ^2_v=1.3
χ^2 = 790
dof = 627
χ^2_v=1.4
χ^2 = 860
dof = 626
χ^2_v=1.2
χ^2 = 968
dof = 778
χ^2_v=1.1
χ^2 = 860
dof = 750
χ^2_v=1.4
χ^2 = 1037
dof = 734
χ^2_v=1.1
χ^2 = 880
dof = 778
χ^2_v=1.1
χ^2 = 827
dof = 778
χ^2_v=1.1
χ^2 = 851
dof = 778
Wavelength (Å)

#78

g_1 -0.15 ± 0.00
g_2 -0.14 ± 0.01
θ_{int} -0.63 ± 0.02
v_{circ} 157.18 ± 11.87
cos (*i*) 0.60 ± 0.02
$r_{hl,\,disk}$ 0.80 ± 0.01
log (F_{disk}) 4.79 ± 0.00
Δx_{disk} -0.03 ± 0.01
Δy_{disk} -0.07 ± 0.01
r_{vscale} 1.55 ± 0.16
Hb : v_0 5.49 ± 3.30
Hb : I_0^{Spec1} 27.64 ± 1.79
Hb : I_0^{Spec2} 21.26 ± 0.98
Hb : I_0^{Spec3} 7.01 ± 2.49
O3a : v_0 -4.77 ± 2.63
O3a : I_0^{Spec1} 19.78 ± 0.81
O3a : I_0^{Spec2} 18.72 ± 0.96
O3a : I_0^{Spec3} 31.12 ± 3.95
O3b : v_0 -0.75 ± 1.11
O3b : I_0^{Spec1} 58.92 ± 1.13
O3b : I_0^{Spec2} 53.41 ± 1.06
O3b : I_0^{Spec3} 83.30 ± 3.16

#79 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 90

g_1 = -0.12
g_2 = -0.077
θ_{int} = 2.8
v_{circ} = 1e+02
cos (i) = 0.78
$r_{hl,\,disk}$ = 0.57
log (F_{disk}) = 5
Δx_{disk} = 0.27
Δy_{disk} = -0.018
r_{vscale} = 0.49

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 461
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

[O III] λ5007

v_0 = -5.7
I_0^{Spec1} = 45.9

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 717
dof = 653

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

[O III] λ5007

v_0 = -5.7
I_0^{Spec2} = 37.1

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 778
dof = 654

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

[O III] λ5007

v_0 = -5.7
I_0^{Spec3} = 94.5

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 753
dof = 656

Wavelength (Å)

#79

g_1 -0.11 ± 0.03
g_2 -0.07 ± 0.04
θ_{int} 2.81 ± 0.12
v_{circ} 102.26 ± 13.19
cos (i) 0.78 ± 0.06
$r_{hl,\,disk}$ 0.57 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.98 ± 0.00
Δx_{disk} 0.27 ± 0.01
Δy_{disk} -0.02 ± 0.03
r_{vscale} 0.51 ± 0.25
O3b : v_0 -5.62 ± 3.18
O3b : I_0^{Spec1} 45.96 ± 3.01
O3b : I_0^{Spec2} 37.05 ± 1.12
O3b : I_0^{Spec3} 94.41 ± 4.98


#80 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
Δ RA (arcsec)
N_RA = 20 px
N_DEC = 21 px
SNR = 49
g_1 = 0.059
g_2 = 0.15
θ_{int} = -0.42
v_{circ} = 1.5e+02
cos (i) = 0.98
$r_{hl,disk}$ = 1.2
log (F_{disk}) = 5.4
Δx_{disk} = -0.055
Δy_{disk} = -0.18
r_{vscale} = 0.073
χ^2_v=1.2
χ^2 = 476
dof = 398
Spec set A
Spec set C
Spec set B
Slit Position (arcsec)
Hβ
[O III] λ4959
[O III] λ5007
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 10
v_0 = 4.8
δ^{spec1} = 21.7
χ^2_v=0.7
χ^2 = 514
dof = 693
SNR = 14
δ^{spec2} = 75.6
χ^2_v=0.7
χ^2 = 517
dof = 693
SNR = 1
δ^{spec3} = 81.4
χ^2_v=1.1
χ^2 = 831
dof = 730
SNR = 8
v_0 = 3.0
δ^{spec1} = 15.4
χ^2_v=1.2
χ^2 = 635
dof = 546
SNR = 11
δ^{spec2} = 61.4
χ^2_v=1.2
χ^2 = 696
dof = 589
SNR = 10
δ^{spec3} = 181.2
χ^2_v=1.3
χ^2 = 774
dof = 616
SNR = 18
v_0 = 1.3
δ^{spec1} = 43.9
χ^2_v=0.4
χ^2 = 306
dof = 687
SNR = 31
δ^{spec2} = 149.3
χ^2_v=0.8
χ^2 = 587
dof = 715
SNR = 9
δ^{spec3} = 619.0
χ^2_v=1.0
χ^2 = 739
dof = 731
Wavelength (Å)

#80

g_1 0.06 ± 0.02
g_2 0.15 ± 0.00
θ_{int} -0.41 ± 0.03
v_{circ} 152.22 ± 19.07
cos (i) 0.98 ± 0.01
$r_{hl,disk}$ 1.17 ± 0.03
log (F_{disk}) 5.38 ± 0.01
Δx_{disk} -0.05 ± 0.02
Δy_{disk} -0.18 ± 0.02
r_{vscale} 0.08 ± 0.04
Hb : v_0 4.77 ± 1.39
Hb : I_0^{Spec1} 21.72 ± 0.74
Hb : I_0^{Spec2} 75.55 ± 2.14
Hb : I_0^{Spec3} 81.41 ± 3.93
O3a : v_0 3.01 ± 1.56
O3a : I_0^{Spec1} 15.37 ± 0.77
O3a : I_0^{Spec2} 61.37 ± 2.00
O3a : I_0^{Spec3} 181.19 ± 7.99
O3b : v_0 1.30 ± 0.70
O3b : I_0^{Spec1} 43.89 ± 1.08
O3b : I_0^{Spec2} 149.25 ± 2.10
O3b : I_0^{Spec3} 619.10 ± 14.56


#82 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 77
g_1 = -0.13
g_2 = -0.081
θ_{int} = 0.12
v_{circ} = 1.8e+02
cos.(i) = 0.39
$r_{hl,disk}$ = 0.9
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = 0.045
Δy_{disk} = -0.23
r_{vscale} = 1.8
χ^2_ν=0.9
χ^2 = 371
dof = 419
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5
v_0 = -4.9
f_0^{spec1} = 21.9
χ^2_ν=1.6
χ^2 = 1230
dof = 777
Hβ
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12
v_0 = -4.9
f_0^{spec2} = 22.9
χ^2_ν=0.9
χ^2 = 729
dof = 778
Hβ
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 6
v_0 = -4.9
f_0^{spec3} = 16.4
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 882
dof = 778
Hβ
Spec set A
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8
v_0 = -9.6
f_0^{spec1} = 35.0
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 831
dof = 778
[O III] λ4959
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 9
v_0 = -9.6
f_0^{spec2} = 18.0
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 928
dof = 778
[O III] λ4959
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5
v_0 = -9.6
f_0^{spec3} = 9.1
χ^2_ν=1.3
χ^2 = 984
dof = 778
[O III] λ4959
Spec set A
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12
v_0 = -19.8
f_0^{spec1} = 45.8
χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1061
dof = 778
[O III] λ5007
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 13
v_0 = -19.8
f_0^{spec2} = 25.2
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 886
dof = 778
[O III] λ5007
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2
v_0 = -19.8
f_0^{spec3} = 14.8
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 851
dof = 777
[O III] λ5007
Wavelength (Å)


#82
g_1 -0.12 ± 0.03
g_2 -0.08 ± 0.02
θ_{int} 0.12 ± 0.03
v_{circ} 178.31 ± 13.28
cos (i) 0.40 ± 0.03
$r_{hl,disk}$ 0.90 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.80 ± 0.00
Δx_{disk} 0.05 ± 0.01
Δy_{disk} -0.23 ± 0.02
r_{vscale} 1.78 ± 0.20
Hb : v_0 -4.87 ± 2.02
Hb : I_0^{Spec1} 21.90 ± 0.98
Hb : I_0^{Spec2} 22.93 ± 0.75
Hb : I_0^{Spec3} 16.32 ± 1.77
O3a : v_0 -9.63 ± 2.54
O3a : I_0^{Spec1} 35.01 ± 1.59
O3a : I_0^{Spec2} 18.01 ± 0.82
O3a : I_0^{Spec3} 9.07 ± 1.36
O3b : v_0 -19.78 ± 1.92
O3b : I_0^{Spec1} 45.84 ± 1.50
O3b : I_0^{Spec2} 25.18 ± 0.83
O3b : I_0^{Spec3} 14.75 ± 1.70

#84 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 80

g_1 = 0.11
g_2 = -0.0044
θ_{int} = -1.5
v_{circ} = 1.7e+02
cos (i) = 0.67
$r_{hl,\,disk}$ = 1
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = -0.18
Δy_{disk} = 0.027
r_{vscale} = 1.2

χ^2_ν=1.7
χ^2 = 740
dof = 423

N, E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -2.3
I_0^{Spec1} = 4.7

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 851
dof = 782

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -2.3
I_0^{Spec2} = 12.9

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 956
dof = 782

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = -2.3
I_0^{Spec3} = 3.4

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 820
dof = 782

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = 10.2
I_0^{Spec1} = 17.9

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 544
dof = 467

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 14

v_0 = 10.2
I_0^{Spec2} = 25.1

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 604
dof = 454

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

v_0 = 10.2
I_0^{Spec3} = 20.2

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 546
dof = 466

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#84

g_1 0.11 ± 0.03
g_2 -0.00 ± 0.02
θ_{int} -1.47 ± 0.06
v_{circ} 167.49 ± 14.81
cos (i) 0.68 ± 0.05
$r_{hl,disk}$ 1.02 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.78 ± 0.01
Δx_{disk} -0.18 ± 0.01
Δy_{disk} 0.03 ± 0.01
r_{vscale} 1.15 ± 0.18
Hb : v_0 -2.28 ± 3.26
Hb : I_0^{Spec1} 4.67 ± 0.51
Hb : I_0^{Spec2} 12.89 ± 0.80
Hb : I_0^{Spec3} 3.42 ± 1.30
O3b : v_0 10.25 ± 2.14
O3b : I_0^{Spec1} 17.86 ± 0.93
O3b : I_0^{Spec2} 25.09 ± 0.95
O3b : I_0^{Spec3} 20.23 ± 4.16

#87 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 61

g_1 = -0.026
g_2 = -0.13
θ_{int} = -1.2
v_{circ} = 85
cos (i) = 0.9
$r_{hl,disk}$ = 0.24
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.32
Δy_{disk} = -0.39
r_{vscale} = 3.2

χ^2_ν=2.6
χ^2 = 1118
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 3.6
I_0^{Spec1} = 1.6

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 844
dof = 782

Hγ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = 3.6
I_0^{Spec2} = 6.4

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 837
dof = 782

Hγ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = 3.6
I_0^{Spec3} = 1.9

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 932
dof = 782

Hγ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 7.9
I_0^{Spec1} = 48.3

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 990
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 31

v_0 = 7.9
I_0^{Spec2} = 76.7

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 924
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 7.9
I_0^{Spec3} = 57.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 834
dof = 782

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#87

g_1 -0.02 ± 0.04

g_2 -0.12 ± 0.03

θ_{int} -1.21 ± 0.26

v_{circ} 84.95 ± 11.13

cos (i) 0.89 ± 0.07

$r_{hl,\,disk}$ 0.24 ± 0.01

log (F_{disk}) 4.42 ± 0.00

Δx_{disk} -0.30 ± 0.11

Δy_{disk} -0.39 ± 0.08

r_{vscale} 3.00 ± 0.77

Hg : v_0 3.76 ± 7.75

Hg : I_0^{Spec1} 1.60 ± 0.48

Hg : I_0^{Spec2} 6.39 ± 0.82

Hg : I_0^{Spec3} 2.09 ± 1.33

O3b : v_0 7.87 ± 0.87

O3b : I_0^{Spec1} 48.27 ± 1.52

O3b : I_0^{Spec2} 76.67 ± 1.10

O3b : I_0^{Spec3} 57.08 ± 3.49


#88 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 49
g_1 = -0.13
g_2 = -0.031
θ_{int} = 2.5
v_{circ} = 1.2e+02
cos (i) = 0.54
$r_{hl,disk}$ = 0.6
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.14
Δy_{disk} = 0.21
r_{vscale} = 1.3
χ^2_ν=1.4
χ^2 = 568
dof = 419
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3
Hβ
v_0 = -5.5
f_0^{spec1} = 18.9
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 794
dof = 649
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5
Hβ
v_0 = -5.5
f_0^{spec2} = 8.5
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 732
dof = 647
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -5
Hβ
v_0 = -5.5
f_0^{spec3} = 25.6
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 788
dof = 653
Spec set A
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8
[O III] λ4959
v_0 = -2.4
f_0^{spec1} = 33.7
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 825
dof = 698
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 9
[O III] λ4959
v_0 = -2.4
f_0^{spec2} = 14.4
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 755
dof = 709
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -6
[O III] λ4959
v_0 = -2.4
f_0^{spec3} = 0.4
χ^2_ν=1.3
χ^2 = 894
dof = 704
Spec set A
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 19
[O III] λ5007
v_0 = -3.5
f_0^{spec1} = 101.4
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 878
dof = 778
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 16
[O III] λ5007
v_0 = -3.5
f_0^{spec2} = 43.8
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 833
dof = 778
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7
[O III] λ5007
v_0 = -3.5
f_0^{spec3} = 73.6
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 914
dof = 778
Wavelength (Å)

#88

g_1 -0.12 ± 0.02
g_2 -0.03 ± 0.07
θ_{int} 2.47 ± 0.03
v_{circ} 122.46 ± 12.64
cos (*i*) 0.54 ± 0.08
$r_{hl,disk}$ 0.60 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.41 ± 0.01
Δx_{disk} 0.14 ± 0.02
Δy_{disk} 0.21 ± 0.03
r_{vscale} 1.37 ± 0.26
Hb : v_0 -5.55 ± 3.67
Hb : I_0^{Spec1} 18.85 ± 1.24
Hb : I_0^{Spec2} 8.46 ± 0.80
Hb : I_0^{Spec3} 25.39 ± 8.76
O3a : v_0 -2.45 ± 2.69
O3a : I_0^{Spec1} 33.71 ± 1.55
O3a : I_0^{Spec2} 14.39 ± 0.71
O3a : I_0^{Spec3} 0.56 ± 0.50
O3b : v_0 -3.58 ± 1.52
O3b : I_0^{Spec1} 101.41 ± 1.93
O3b : I_0^{Spec2} 43.80 ± 0.98
O3b : I_0^{Spec3} 73.60 ± 4.83

#90 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 78

g_1 = -0.077
g_2 = 0.12
θ_{int} = -2.6
v_{circ} = 2.9e+02
cos (*i*) = 0.43
$r_{hl,\,disk}$ = 0.7
log (F_{disk}) = 4.9
Δx_{disk} = -0.078
Δy_{disk} = -0.014
r_{vscale} = 0.63

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 440
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = 11.6
I_0^{Spec1} = 2.8

χ^2_ν=1.5
χ^2 = 919
dof = 632

Hα

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = 11.6
I_0^{Spec2} = 12.7

χ^2_ν=1.7
χ^2 = 1099
dof = 636

Hα

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 10

v_0 = 11.6
I_0^{Spec3} = 96.9

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 812
dof = 632

Hα

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -13

v_0 = 24.1
I_0^{Spec1} = 0.3

χ^2_ν=2.9
χ^2 = 1859
dof = 637

[N II] λ6583

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 24.1
I_0^{Spec2} = 12.7

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 709
dof = 633

[N II] λ6583

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 24.1
I_0^{Spec3} = 36.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 700
dof = 630

[N II] λ6583

Wavelength (Å)

#90

g_1 -0.08 ± 0.02
g_2 0.11 ± 0.03
θ_{int} -2.61 ± 0.03
v_{circ} 288.69 ± 31.48
cos (i) 0.43 ± 0.03
$r_{hl,\,disk}$ 0.71 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.94 ± 0.00
Δx_{disk} -0.08 ± 0.01
Δy_{disk} -0.01 ± 0.00
r_{vscale} 0.62 ± 0.12
Ha : v_0 11.23 ± 5.52
Ha : I_0^{Spec1} 2.95 ± 1.83
Ha : I_0^{Spec2} 12.72 ± 0.45
Ha : I_0^{Spec3} 96.97 ± 2.97
N2b : v_0 23.63 ± 6.51
N2b : I_0^{Spec1} 0.38 ± 0.35
N2b : I_0^{Spec2} 12.75 ± 0.84
N2b : I_0^{Spec3} 36.36 ± 2.29

#91 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 82

g_1 = -0.073
g_2 = 0.077
θ_{int} = 1.9
v_{circ} = 1.8e+02
cos (i) = 0.47
$r_{hl,\,disk}$ = 0.79
log (F_{disk}) = 4.9
Δx_{disk} = 0.24
Δy_{disk} = -0.021
r_{vscale} = 0.52

χ^2_ν=0.7
χ^2 = 266
dof = 407

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set *A*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

v_0 = -35.6
I_0^{Spec1} = 16.9

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 719
dof = 628

Hβ

Spec set *C*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 15

v_0 = -35.6
I_0^{Spec2} = 18.3

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 847
dof = 636

Hβ

Spec set *B*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -5

v_0 = -35.6
I_0^{Spec3} = 1.0

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 790
dof = 632

Hβ

Spec set *A*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 20

v_0 = -1.5
I_0^{Spec1} = 35.5

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 804
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set *C*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12

v_0 = -1.5
I_0^{Spec2} = 24.9

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 948
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set *B*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = -1.5
I_0^{Spec3} = 34.7

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 969
dof = 782

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#91

g_1 -0.07 ± 0.04
g_2 0.08 ± 0.03
θ_{int} 1.88 ± 0.02
v_{circ} 177.61 ± 9.58
cos (i) 0.47 ± 0.05
$r_{hl,\,disk}$ 0.79 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.94 ± 0.00
Δx_{disk} 0.24 ± 0.01
Δy_{disk} -0.02 ± 0.01
r_{vscale} 0.53 ± 0.09
Hb : v_0 -35.68 ± 2.77
Hb : I_0^{Spec1} 16.93 ± 0.60
Hb : I_0^{Spec2} 18.31 ± 0.66
Hb : I_0^{Spec3} 1.19 ± 0.88
O3b : v_0 -1.58 ± 1.92
O3b : I_0^{Spec1} 35.45 ± 0.84
O3b : I_0^{Spec2} 24.88 ± 0.78
O3b : I_0^{Spec3} 34.70 ± 2.70

#92 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 68

g_1 = -0.14
g_2 = 0.11
θ_{int} = -2.8
v_{circ} = 1.8e+02
cos (i) = 0.83
$r_{hl,\,disk}$ = 0.81
log (F_{disk}) = 5
Δx_{disk} = -0.054
Δy_{disk} = 0.14
r_{vscale} = 0.051

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 424
dof = 423

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set *A*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -52.4
I_0^{Spec1} = 29.6

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 535
dof = 487

Hβ

Spec set *C*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -52.4
I_0^{Spec2} = 14.7

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 601
dof = 607

Hβ

Spec set *B*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -52.4
I_0^{Spec3} = 26.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 628
dof = 606

Hβ

Spec set *A*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -44.0
I_0^{Spec1} = 22.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 691
dof = 630

[O III] λ5007

Spec set *C*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -44.0
I_0^{Spec2} = 18.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 694
dof = 635

[O III] λ5007

Spec set *B*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = -44.0
I_0^{Spec3} = 5.7

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 673
dof = 634

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#92

g_1 -0.14 ± 0.01
g_2 0.11 ± 0.03
θ_{int} -2.79 ± 0.10
v_{circ} 180.76 ± 19.76
cos (*i*) 0.82 ± 0.04
$r_{hl,\,disk}$ 0.81 ± 0.02
log (F_{disk}) 5.05 ± 0.01
Δx_{disk} -0.05 ± 0.02
Δy_{disk} 0.14 ± 0.01
r_{vscale} 0.07 ± 0.06
Hb : v_0 -53.94 ± 9.22
Hb : I_0^{Spec1} 29.65 ± 3.92
Hb : I_0^{Spec2} 14.76 ± 1.98
Hb : I_0^{Spec3} 26.59 ± 11.61
O3b : v_0 -44.16 ± 8.66
O3b : I_0^{Spec1} 22.20 ± 2.02
O3b : I_0^{Spec2} 18.28 ± 2.50
O3b : I_0^{Spec3} 7.28 ± 5.73

#95 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 43

g_1 = 0.026
g_2 = -0.028
θ_{int} = -2.7
v_{circ} = 89
cos (i) = 0.66
$r_{hl,\,disk}$ = 0.66
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = -0.1
Δy_{disk} = 0.3
r_{vscale} = 0.53

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 543
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 17

[O II] λλ3726,3729

v_0 = -6.1
v_0 = -15.3
I_0^{Spec1} = 29.3
I_0^{Spec1} = 53.6

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 833
dof = 582

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 15

[O II] λλ3726,3729

v_0 = -6.1
v_0 = -15.3
I_0^{Spec2} = 13.4
I_0^{Spec2} = 26.0

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 722
dof = 582

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

[O II] λλ3726,3729

v_0 = -6.1
v_0 = -15.3
I_0^{Spec3} = 13.0
I_0^{Spec3} = 51.0

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 667
dof = 582

Wavelength (Å)

#95

g_1 0.02 ± 0.06
g_2 -0.03 ± 0.06
θ_{int} -2.73 ± 0.04
v_{circ} 90.46 ± 12.10
cos (i) 0.66 ± 0.11
$r_{hl,\,disk}$ 0.67 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.42 ± 0.01
Δx_{disk} -0.10 ± 0.02
Δy_{disk} 0.30 ± 0.05
r_{vscale} 0.55 ± 0.22
O2 : v_0 -6.13 ± 2.13
O2b : v_0 -15.31 ± 1.53
O2 : I_0^{Spec1} 29.26 ± 1.16
O2b : I_0^{Spec1} 53.62 ± 1.47
O2 : I_0^{Spec2} 13.39 ± 0.67
O2b : I_0^{Spec2} 26.04 ± 0.89
O2 : I_0^{Spec3} 13.04 ± 1.37
O2b : I_0^{Spec3} 51.13 ± 3.42

#96 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 106

g_1 = 0.076
g_2 = -0.12
θ_{int} = -1.8
v_{circ} = 1.3e+02
cos (i) = 0.71
$r_{hl,\,disk}$ = 0.33
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = -0.11
Δy_{disk} = 0.27
r_{vscale} = 0.81

χ^2_ν=2.4
χ^2 = 1002
dof = 423

N E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -5.9
I_0^{Spec1} = 13.1

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 904
dof = 782

[O III] λ4959

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -5.9
I_0^{Spec2} = 16.4

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 929
dof = 782

[O III] λ4959

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -5.9
I_0^{Spec3} = 6.7

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 820
dof = 782

[O III] λ4959

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 10

v_0 = -22.3
I_0^{Spec1} = 33.8

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 956
dof = 781

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 15

v_0 = -22.3
I_0^{Spec2} = 40.4

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 965
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 0

v_0 = -22.3
I_0^{Spec3} = 10.3

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 852
dof = 782

[O III] λ5007

Wavelength (Å)


#96
g_1 0.07 ± 0.04
g_2 -0.12 ± 0.02
θ_{int} -1.79 ± 0.06
v_{circ} 128.11 ± 13.17
cos (i) 0.72 ± 0.05
$r_{hl,disk}$ 0.33 ± 0.01
log (F_{disk}) 4.78 ± 0.00
Δx_{disk} -0.11 ± 0.02
Δy_{disk} 0.28 ± 0.02
r_{vscale} 0.82 ± 0.18
O3a : v_0 -5.89 ± 4.09
O3a : I_0^{Spec1} 13.12 ± 0.95
O3a : I_0^{Spec2} 16.40 ± 0.89
O3a : I_0^{Spec3} 6.70 ± 1.84
O3b : v_0 -22.33 ± 1.98
O3b : I_0^{Spec1} 33.80 ± 1.02
O3b : I_0^{Spec2} 40.43 ± 0.98
O3b : I_0^{Spec3} 10.30 ± 1.34

#97 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 87

g_1 = 0.047
g_2 = -0.14
θ_{int} = 0.61
v_{circ} = 1.5e+02
cos (i) = 0.77
$r_{hl,disk}$ = 0.6
log (F_{disk}) = 4.9
Δx_{disk} = 0.1
Δy_{disk} = -0.34
r_{vscale} = 0.91

χ^2_ν=0.6
χ^2 = 246
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -8.7
I_0^{Spec1} = 5.6

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 770
dof = 549

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -8.7
I_0^{Spec2} = 8.8

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 717
dof = 545

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -8.7
I_0^{Spec3} = 18.5

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 681
dof = 532

Hβ

Wavelength (Å)

#97

g_1 0.05 ± 0.04

g_2 -0.14 ± 0.01

θ_{int} 0.63 ± 0.14

v_{circ} 153.01 ± 18.95

cos (i) 0.77 ± 0.03

$r_{hl,\,disk}$ 0.60 ± 0.01

log (F_{disk}) 4.86 ± 0.00

Δx_{disk} 0.11 ± 0.06

Δy_{disk} -0.34 ± 0.02

r_{vscale} 0.92 ± 0.25

Hb : v_0 -8.70 ± 4.87

Hb : I_0^{Spec1} 5.66 ± 0.52

Hb : I_0^{Spec2} 8.80 ± 0.55

Hb : I_0^{Spec3} 18.52 ± 1.96

#98 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 60

g_1 = -0.1
g_2 = -0.01
θ_{int} = 2.7
v_{circ} = 1.6e+02
cos (i) = 0.46
$r_{hl,\,disk}$ = 0.99
log (F_{disk}) = 4.7
Δx_{disk} = 0.13
Δy_{disk} = 0.17
r_{vscale} = 0.07

χ^2_ν=0.4
χ^2 = 173
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -72.8
I_0^{Spec1} = 7.9

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 757
dof = 669

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -5

v_0 = -72.8
I_0^{Spec2} = 8.4

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 738
dof = 669

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = -72.8
I_0^{Spec3} = 123.8

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 698
dof = 676

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = -59.5
I_0^{Spec1} = 6.8

χ^2_ν=1.8
χ^2 = 876
dof = 498

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -59.5
I_0^{Spec2} = 2.8

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 577
dof = 498

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = -59.5
I_0^{Spec3} = 4.2

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 510
dof = 513

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#98

g_1 -0.09 ± 0.04
g_2 -0.01 ± 0.06
θ_{int} 2.68 ± 0.04
v_{circ} 161.11 ± 11.76
cos (i) 0.47 ± 0.07
$r_{hl,\,disk}$ 0.99 ± 0.07
log (F_{disk}) 4.74 ± 0.01
Δx_{disk} 0.13 ± 0.02
Δy_{disk} 0.17 ± 0.03
r_{vscale} 0.09 ± 0.07
Hb : v_0 -72.84 ± 4.87
Hb : I_0^{Spec1} 7.88 ± 0.63
Hb : I_0^{Spec2} 8.46 ± 2.77
Hb : I_0^{Spec3} 124.54 ± 31.84
O3b : v_0 -59.45 ± 7.87
O3b : I_0^{Spec1} 6.78 ± 0.67
O3b : I_0^{Spec2} 2.78 ± 0.78
O3b : I_0^{Spec3} 4.60 ± 3.11

#99 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 68

g_1 = 0.054
g_2 = -0.022
θ_{int} = 1.8
v_{circ} = 1.3e+02
cos (i) = 0.55
$r_{hl,disk}$ = 0.53
log (F_{disk}) = 4.6
Δx_{disk} = 0.46
Δy_{disk} = -0.18
r_{vscale} = 0.4

χ^2_v=0.8
χ^2 = 314
dof = 374

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -28.2
I_0^{Spec1} = 6.5

χ^2_v=1.1
χ^2 = 693
dof = 606

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -28.2
I_0^{Spec2} = 9.6

χ^2_v=1.4
χ^2 = 780
dof = 569

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -1

v_0 = -28.2
I_0^{Spec3} = 4.1

χ^2_v=1.1
χ^2 = 598
dof = 553

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -57.9
I_0^{Spec1} = 1.6

χ^2_v=1.2
χ^2 = 793
dof = 672

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -57.9
I_0^{Spec2} = 8.0

χ^2_v=1.3
χ^2 = 845
dof = 674

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -57.9
I_0^{Spec3} = 7.9

χ^2_v=1.1
χ^2 = 736
dof = 675

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#99

g_1 0.05 ± 0.07

g_2 -0.01 ± 0.06

θ_{int} 1.79 ± 0.09

v_{circ} 133.30 ± 18.45

cos (i) 0.57 ± 0.09

$r_{hl,\,disk}$ 0.53 ± 0.04

log (F_{disk}) 4.61 ± 0.00

Δx_{disk} 0.46 ± 0.03

Δy_{disk} -0.18 ± 0.04

r_{vscale} 0.41 ± 0.17

Hb : v_0 -28.44 ± 7.25

Hb : I_0^{Spec1} 6.50 ± 0.57

Hb : I_0^{Spec2} 9.66 ± 0.74

Hb : I_0^{Spec3} 4.10 ± 2.30

O3b : v_0 -58.65 ± 8.32

O3b : I_0^{Spec1} 1.65 ± 0.37

O3b : I_0^{Spec2} 7.97 ± 0.66

O3b : I_0^{Spec3} 7.92 ± 1.85

#100 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 69

g_1 = -0.099
g_2 = 0.13
θ_{int} = 2.5
v_{circ} = 1.2e+02
cos (i) = 0.61
$r_{hl,disk}$ = 0.86
log (F_{disk}) = 4.9
Δx_{disk} = 0.28
Δy_{disk} = 0.1
r_{vscale} = 0.39

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 403
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 9

v_0 = -39.7
I_0^{Spec1} = 11.6

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 869
dof = 782

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -39.7
I_0^{Spec2} = 14.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 912
dof = 782

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -5

v_0 = -39.7
I_0^{Spec3} = 16.8

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 943
dof = 782

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 9

v_0 = -87.3
I_0^{Spec1} = 58.8

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 561
dof = 429

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -87.3
I_0^{Spec2} = 86.8

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 570
dof = 439

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = -87.3
I_0^{Spec3} = 210.6

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 588
dof = 441

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#100

g_1 -0.10 ± 0.02

g_2 0.12 ± 0.03

θ_{int} 2.47 ± 0.04

v_{circ} 122.32 ± 11.33

cos (i) 0.63 ± 0.05

$r_{hl,\,disk}$ 0.85 ± 0.03

log (F_{disk}) 4.86 ± 0.01

Δx_{disk} 0.28 ± 0.01

Δy_{disk} 0.10 ± 0.01

r_{vscale} 0.39 ± 0.14

Hb : v_0 -39.75 ± 3.16

Hb : I_0^{Spec1} 11.59 ± 0.59

Hb : I_0^{Spec2} 14.35 ± 0.60

Hb : I_0^{Spec3} 16.79 ± 3.57

O3b : v_0 -87.28 ± 3.51

O3b : I_0^{Spec1} 59.06 ± 5.53

O3b : I_0^{Spec2} 87.03 ± 9.49

O3b : I_0^{Spec3} 213.40 ± 63.33

#101 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 62

g_1 = 0.079
g_2 = -0.12
θ_{int} = -1.2
v_{circ} = 1.5e+02
cos (i) = 0.46
$r_{hl,disk}$ = 0.61
log (F_{disk}) = 4.6
Δx_{disk} = -0.45
Δy_{disk} = -0.071
r_{vscale} = 0.49

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 395
dof = 423

N, E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -0.7
I_0^{Spec1} = 5.1

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 648
dof = 451

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = -0.7
I_0^{Spec2} = 10.4

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 608
dof = 444

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 0

v_0 = -0.7
I_0^{Spec3} = 9.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 477
dof = 445

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -8.9
I_0^{Spec1} = 7.5

χ^2_ν=1.5
χ^2 = 908
dof = 624

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -8.9
I_0^{Spec2} = 11.7

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 787
dof = 635

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -4

v_0 = -8.9
I_0^{Spec3} = 13.2

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 794
dof = 658

[O III] λ5007

Wavelength (Å)


#101
g_1 0.08 ± 0.04
g_2 -0.11 ± 0.03
θ_{int} -1.18 ± 0.05
v_{circ} 151.70 ± 14.82
cos (*i*) 0.46 ± 0.04
$r_{hl,disk}$ 0.61 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.60 ± 0.01
Δx_{disk} -0.45 ± 0.01
Δy_{disk} -0.07 ± 0.01
r_{vscale} 0.51 ± 0.19
Hb : v_0 -0.63 ± 4.69
Hb : I_0^{Spec1} 5.09 ± 0.77
Hb : I_0^{Spec2} 10.42 ± 1.22
Hb : I_0^{Spec3} 9.16 ± 2.12
O3b : v_0 -9.19 ± 5.95
O3b : I_0^{Spec1} 7.52 ± 0.71
O3b : I_0^{Spec2} 11.73 ± 0.96
O3b : I_0^{Spec3} 14.46 ± 9.13


#102
g_1
-0.04 ± 0.07
g_2
0.04 ± 0.06
θ_{int}
2.29 ± 0.27
v_{circ}
55.14 ± 7.24
cos (*i*)
0.71 ± 0.08
$r_{hl,\,disk}$
0.21 ± 0.01
log (F_{disk})
4.29 ± 0.01
Δx_{disk}
0.62 ± 0.09
Δy_{disk}
0.23 ± 0.13
r_{vscale}
3.01 ± 0.73
Hb : v_0
-15.80 ± 2.49
Hb : I_0^{Spec1}
10.71 ± 1.00
Hb : I_0^{Spec2}
18.15 ± 0.87
Hb : I_0^{Spec3}
1.10 ± 0.65
O3a : v_0
-11.82 ± 2.28
O3a : I_0^{Spec1}
4.07 ± 0.71
O3a : I_0^{Spec2}
18.84 ± 0.82
O3a : I_0^{Spec3}
0.53 ± 0.41


#105 Observation
Best fit model
Residual (= obs – model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 49
g_1 = -0.13
g_2 = 0.091
θ_{int} = -2.7
v_{circ} = 1.3e+02
cos (i) = 0.5
$r_{hl,disk}$ = 0.78
log (F_{disk}) = 4.5
Δx_{disk} = -0.063
Δy_{disk} = 0.11
r_{vscale} = 0.71
χ^2_ν=1.0
χ^2 = 416
dof = 419
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Spec set C
Spec set B
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4
v_0 = -9.9
f_0^{spec1} = 12.0
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 946
dof = 778
Hβ
SNR = -3
f_0^{spec2} = 7.9
χ^2_ν=1.5
χ^2 = 1130
dof = 778
SNR = -2
f_0^{spec3} = 1.8
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 851
dof = 778
v_0 = 20.7
SNR = 6
f_0^{spec1} = 25.5
χ^2_ν=1.0
χ^2 = 772
dof = 737
[O III] λ4959
SNR = -1
f_0^{spec2} = 9.7
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 811
dof = 691
SNR = -8
f_0^{spec3} = 0.6
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 779
dof = 676
v_0 = 6.9
SNR = 14
f_0^{spec1} = 59.9
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 539
dof = 496
[O III] λ5007
SNR = 11
f_0^{spec2} = 24.7
χ^2_ν=1.3
χ^2 = 658
dof = 498
SNR = -1
f_0^{spec3} = 9.2
χ^2_ν=1.4
χ^2 = 670
dof = 496
Wavelength (Å)

#105

g_1 -0.12 ± 0.02
g_2 0.09 ± 0.03
θ_{int} -2.73 ± 0.03
v_{circ} 125.93 ± 10.46
cos (*i*) 0.50 ± 0.04
$r_{hl,\,disk}$ 0.78 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.52 ± 0.01
Δx_{disk} -0.06 ± 0.01
Δy_{disk} 0.12 ± 0.01
r_{vscale} 0.71 ± 0.14
Hb : v_0 -9.94 ± 3.46
Hb : I_0^{Spec1} 11.92 ± 0.87
Hb : I_0^{Spec2} 7.91 ± 0.66
Hb : I_0^{Spec3} 1.85 ± 0.87
O3a : v_0 20.60 ± 3.12
O3a : I_0^{Spec1} 25.50 ± 1.30
O3a : I_0^{Spec2} 9.69 ± 0.92
O3a : I_0^{Spec3} 0.79 ± 0.71
O3b : v_0 6.92 ± 2.12
O3b : I_0^{Spec1} 59.93 ± 1.77
O3b : I_0^{Spec2} 24.68 ± 0.83
O3b : I_0^{Spec3} 9.18 ± 1.94


#107 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 56
g_1 = -0.045
g_2 = 0.1
θ_{int} = -0.58
v_{circ} = 1.5e+02
cos (i) = 0.62
r_{hl_disk} = 1.1
log (F_{disk}) = 5.2
Δx_{disk} = -0.2
Δy_{disk} = -0.057
r_{vscale} = 1.3
χ^2_v=0.3
χ^2 = 140
dof = 419
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Spec set C
Spec set B
Slit Position (arcsec)
Hβ
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 15
v_0 = -60.8
f_0^{spec1} = 29.8
χ^2_v=0.9
χ^2 = 675
dof = 778
SNR = 10
f_0^{spec2} = 15.5
χ^2_v=1.0
χ^2 = 774
dof = 778
SNR = 21
f_0^{spec3} = 67.9
χ^2_v=0.8
χ^2 = 616
dof = 778
[O III] λ4959
N_λ = 36 px
SNR = -1
v_0 = -59.3
f_0^{spec1} = 0.4
χ^2_v=1.1
χ^2 = 775
dof = 698
SNR = 5
f_0^{spec2} = 2.7
χ^2_v=1.3
χ^2 = 980
dof = 778
SNR = 16
f_0^{spec3} = 55.6
χ^2_v=0.9
χ^2 = 726
dof = 778
[O III] λ5007
v_0 = -58.6
f_0^{spec1} = 16.8
χ^2_v=0.9
χ^2 = 525
dof = 577
SNR = 14
f_0^{spec2} = 28.1
χ^2_v=1.0
χ^2 = 606
dof = 595
SNR = 23
f_0^{spec3} = 196.8
χ^2_v=0.5
χ^2 = 327
dof = 635
Wavelength (Å)

#107

g_1 -0.04 ± 0.02
g_2 0.10 ± 0.04
θ_{int} -0.58 ± 0.02
v_{circ} 156.38 ± 12.88
cos (i) 0.64 ± 0.06
$r_{hl,disk}$ 1.10 ± 0.05
log (F_{disk}) 5.15 ± 0.01
Δx_{disk} -0.20 ± 0.01
Δy_{disk} -0.06 ± 0.01
r_{vscale} 1.34 ± 0.20
Hb : v_0 -60.83 ± 0.88
Hb : I_0^{Spec1} 29.75 ± 0.97
Hb : I_0^{Spec2} 15.52 ± 0.49
Hb : I_0^{Spec3} 67.89 ± 1.37
O3a : v_0 -59.42 ± 1.81
O3a : I_0^{Spec1} 0.48 ± 0.41
O3a : I_0^{Spec2} 2.75 ± 0.51
O3a : I_0^{Spec3} 55.54 ± 1.65
O3b : v_0 -58.54 ± 0.92
O3b : I_0^{Spec1} 16.81 ± 0.60
O3b : I_0^{Spec2} 28.13 ± 0.90
O3b : I_0^{Spec3} 196.90 ± 3.60


#108 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 45
g_1 = 0.012
g_2 = -0.11
θ_{int} = 1.5
v_{circ} = 98
cos (i) = 0.46
$r_{hl,disk}$ = 0.67
log (F_{disk}) = 4.4
Δx_{disk} = 0.34
Δy_{disk} = 0.042
r_{vscale} = 0.98
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 505
dof = 419
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3
Hβ
v_0 = -29.2
f_0^{Spec1} = 4.4
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 741
dof = 631
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5
Hβ
v_0 = -29.2
f_0^{Spec2} = 13.9
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 725
dof = 632
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -4
Hβ
v_0 = -29.2
f_0^{Spec3} = 10.7
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 760
dof = 633
Spec set A
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1
[O III] λ4959
v_0 = -12.1
f_0^{Spec1} = 6.7
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 878
dof = 777
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -5
[O III] λ4959
v_0 = -12.1
f_0^{Spec2} = 5.8
χ^2_ν=1.5
χ^2 = 1178
dof = 778
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -3
[O III] λ4959
v_0 = -12.1
f_0^{Spec3} = 1.6
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 914
dof = 778
Spec set A
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3
[O III] λ5007
v_0 = -11.5
f_0^{Spec1} = 27.1
χ^2_ν=1.6
χ^2 = 1032
dof = 642
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 11
[O III] λ5007
v_0 = -11.5
f_0^{Spec2} = 28.5
χ^2_ν=1.3
χ^2 = 811
dof = 648
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -5
[O III] λ5007
v_0 = -11.5
f_0^{Spec3} = 14.6
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 737
dof = 647
Wavelength (Å)

#108

g_1 0.01 ± 0.08
g_2 -0.10 ± 0.03
θ_{int} 1.51 ± 0.05
v_{circ} 99.17 ± 13.14
cos (*i*) 0.47 ± 0.09
$r_{hl,disk}$ 0.67 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.43 ± 0.01
Δx_{disk} 0.34 ± 0.02
Δy_{disk} 0.04 ± 0.01
r_{vscale} 0.99 ± 0.28
Hb : v_0 -29.23 ± 6.36
Hb : I_0^{Spec1} 4.38 ± 0.91
Hb : I_0^{Spec2} 13.93 ± 1.11
Hb : I_0^{Spec3} 11.38 ± 7.09
O3a : v_0 -12.12 ± 5.51
O3a : I_0^{Spec1} 6.75 ± 0.92
O3a : I_0^{Spec2} 5.77 ± 0.81
O3a : I_0^{Spec3} 1.98 ± 1.45
O3b : v_0 -11.50 ± 1.86
O3b : I_0^{Spec1} 27.03 ± 1.33
O3b : I_0^{Spec2} 28.52 ± 0.80
O3b : I_0^{Spec3} 14.59 ± 2.08


#109 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 54
g_1 = -0.1
g_2 = -0.075
θ_{int} = -2.4
v_{circ} = 2.5e+02
cos (i) = 0.4
$r_{hl,disk}$ = 1.5
log (F_{disk}) = 5.2
Δx_{disk} = 0.048
Δy_{disk} = 0.1
r_{vscale} = 1
χ^2_v=0.1
χ^2 = 45
dof = 419
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Spec set C
Spec set B
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 19
[O III] λ5007
v_0 = -6.4
f_0^{spec1} = 14.1
χ^2_v=0.6
χ^2 = 350
dof = 574
SNR = 9
f_0^{spec2} = 25.8
χ^2_v=0.9
χ^2 = 508
dof = 575
SNR = 2
f_0^{spec3} = 13.0
χ^2_v=1.1
χ^2 = 623
dof = 568
SNR = 17
v_0 = -12.4
f_0^{spec1} = 19.4
χ^2_v=0.9
χ^2 = 610
dof = 690
Hα
SNR = 13
f_0^{spec2} = 19.6
χ^2_v=1.1
χ^2 = 814
dof = 714
SNR = 4
f_0^{spec3} = 26.1
χ^2_v=0.9
χ^2 = 724
dof = 769
SNR = 6
v_0 = -49.6
f_0^{spec1} = 5.8
χ^2_v=1.1
χ^2 = 622
dof = 554
[N II] λ6583
SNR = 3
f_0^{spec2} = 4.4
χ^2_v=1.1
χ^2 = 695
dof = 631
SNR = -2
f_0^{spec3} = 1.3
χ^2_v=1.0
χ^2 = 583
dof = 590
Wavelength (Å)

#109

g_1 -0.10 ± 0.02
g_2 -0.07 ± 0.05
θ_{int} -2.40 ± 0.02
v_{circ} 247.57 ± 10.97
cos (i) 0.41 ± 0.05
$r_{hl,disk}$ 1.45 ± 0.08
log (F_{disk}) 5.22 ± 0.01
Δx_{disk} 0.05 ± 0.01
Δy_{disk} 0.10 ± 0.01
r_{vscale} 1.04 ± 0.13
O3b : v_0 -6.38 ± 2.05
O3b : I_0^{Spec1} 14.07 ± 0.46
O3b : I_0^{Spec2} 25.75 ± 1.12
O3b : I_0^{Spec3} 12.96 ± 0.95
Ha : v_0 -12.39 ± 1.83
Ha : I_0^{Spec1} 19.43 ± 0.52
Ha : I_0^{Spec2} 19.62 ± 0.57
Ha : I_0^{Spec3} 26.18 ± 1.78
N2b : v_0 -49.54 ± 5.00
N2b : I_0^{Spec1} 5.76 ± 0.44
N2b : I_0^{Spec2} 4.39 ± 0.37
N2b : I_0^{Spec3} 1.38 ± 0.79


#110 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 61
g_1 = -0.023
g_2 = 0.024
θ_{int} = 1.7
v_{circ} = 1e+02
cos (i) = 0.93
$r_{hl,disk}$ = 0.74
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = 0.13
Δy_{disk} = 0.16
r_{vscale} = 0.13
χ^2_ν=0.8
χ^2 = 323
dof = 419
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Spec set C
Spec set B
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2
SNR = 5
SNR = -3
SNR = 4
SNR = -1
SNR = 7
SNR = 6
v_0 = -27.3
δ^{spec1} = 9.3
δ^{spec2} = 12.8
δ^{spec3} = 2.0
χ^2_ν=2.4
χ^2 = 1860
dof = 778
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 832
dof = 778
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 901
dof = 778
Hβ
v_0 = -18.4
δ^{spec1} = 6.0
δ^{spec2} = 10.4
δ^{spec3} = 11.4
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 851
dof = 778
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 856
dof = 778
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 837
dof = 778
[O III] λ4959
v_0 = -12.7
δ^{spec1} = 34.3
δ^{spec2} = 17.1
δ^{spec3} = 15.3
χ^2_ν=1.5
χ^2 = 1146
dof = 778
χ^2_ν=1.2
χ^2 = 967
dof = 778
χ^2_ν=1.1
χ^2 = 822
dof = 778
[O III] λ5007
Wavelength (Å)

#110

g_1 -0.02 ± 0.02
g_2 0.02 ± 0.01
θ_{int} 1.73 ± 0.07
v_{circ} 103.51 ± 14.64
cos (*i*) 0.93 ± 0.02
$r_{hl,disk}$ 0.74 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.82 ± 0.01
Δx_{disk} 0.13 ± 0.02
Δy_{disk} 0.16 ± 0.02
r_{vscale} 0.14 ± 0.07
Hb : v_0 -27.31 ± 3.34
Hb : I_0^{Spec1} 9.30 ± 1.02
Hb : I_0^{Spec2} 12.80 ± 0.97
Hb : I_0^{Spec3} 2.09 ± 1.06
O3a : v_0 -18.37 ± 4.03
O3a : I_0^{Spec1} 6.02 ± 0.61
O3a : I_0^{Spec2} 10.38 ± 0.87
O3a : I_0^{Spec3} 11.39 ± 2.35
O3b : v_0 -12.65 ± 1.77
O3b : I_0^{Spec1} 34.35 ± 1.55
O3b : I_0^{Spec2} 17.13 ± 0.59
O3b : I_0^{Spec3} 15.35 ± 1.02

#112 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 58

g_1 = -0.048
g_2 = -0.031
θ_{int} = 3
v_{circ} = 3.1e+02
cos (i) = 0.44
$r_{hl,\,disk}$ = 0.74
log (F_{disk}) = 4.6
Δx_{disk} = 0.082
Δy_{disk} = 0.33
r_{vscale} = 0.94

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 381
dof = 419

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 15

v_0 = 5.7
v_0 = 1.5
I_0^{Spec1} = 17.2
I_0^{Spec1} = 19.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 938
dof = 778

[O II] λλ3726,3729

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 16

v_0 = 5.7
v_0 = 1.5
I_0^{Spec2} = 17.7
I_0^{Spec2} = 12.8

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1120
dof = 777

[O II] λλ3726,3729

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 19

v_0 = 5.7
v_0 = 1.5
I_0^{Spec3} = 107.7
I_0^{Spec3} = 118.5

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 873
dof = 778

[O II] λλ3726,3729

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = 7.0
I_0^{Spec1} = 17.9

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1011
dof = 778

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = 7.0
I_0^{Spec2} = 5.9

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1022
dof = 778

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 0

v_0 = 7.0
I_0^{Spec3} = 117.9

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 1041
dof = 778

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#112

g_1 -0.05 ± 0.05
g_2 -0.03 ± 0.02
θ_{int} 2.97 ± 0.02
v_{circ} 311.70 ± 13.74
cos (*i*) 0.44 ± 0.05
$r_{hl,disk}$ 0.74 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.62 ± 0.01
Δx_{disk} 0.08 ± 0.02
Δy_{disk} 0.33 ± 0.03
r_{vscale} 0.94 ± 0.10
O2 : v_0 5.77 ± 3.48
O2b : v_0 1.53 ± 2.84
O2 : I_0^{Spec1} 17.17 ± 0.86
O2b : I_0^{Spec1} 19.28 ± 1.30
O2 : I_0^{Spec2} 17.73 ± 0.92
O2b : I_0^{Spec2} 12.77 ± 0.58
O2 : I_0^{Spec3} 107.69 ± 4.59
O2b : I_0^{Spec3} 118.45 ± 3.30
O3b : v_0 7.03 ± 2.74
O3b : I_0^{Spec1} 17.90 ± 1.72
O3b : I_0^{Spec2} 5.90 ± 0.48
O3b : I_0^{Spec3} 117.82 ± 4.26

#113 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 56

g_1 = -0.14
g_2 = 0.012
θ_{int} = 2.5
v_{circ} = 2.4e+02
cos (i) = 0.55
$r_{hl,\,disk}$ = 0.87
log (F_{disk}) = 4.7
Δx_{disk} = 0.28
Δy_{disk} = 0.02
r_{vscale} = 0.32

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 279
dof = 309

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12

v_0 = 52.1
v_0 = 17.4
I_0^{Spec1} = 19.7
I_0^{Spec1} = 22.9

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 883
dof = 782

[O II] λλ3726,3729

Spec set C

Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = 52.1
v_0 = 17.4
I_0^{Spec2} = 13.3
I_0^{Spec2} = 5.5

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 957
dof = 781

[O II] λλ3726,3729

Spec set B

Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 10

v_0 = 52.1
v_0 = 17.4
I_0^{Spec3} = 56.9
I_0^{Spec3} = 69.5

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 880
dof = 782

[O II] λλ3726,3729

Wavelength (Å)

#113

g_1 -0.13 ± 0.02
g_2 0.01 ± 0.07
θ_{int} 2.53 ± 0.07
v_{circ} 234.32 ± 18.49
cos (i) 0.56 ± 0.07
$r_{hl,\,disk}$ 0.87 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.71 ± 0.01
Δx_{disk} 0.28 ± 0.02
Δy_{disk} 0.02 ± 0.02
r_{vscale} 0.29 ± 0.12
O2 : v_0 48.90 ± 10.80
O2b : v_0 16.38 ± 7.62
O2 : I_0^{Spec1} 19.52 ± 1.17
O2b : I_0^{Spec1} 23.07 ± 2.24
O2 : I_0^{Spec2} 13.31 ± 1.24
O2b : I_0^{Spec2} 5.55 ± 0.59
O2 : I_0^{Spec3} 57.05 ± 4.55
O2b : I_0^{Spec3} 69.21 ± 7.72

g_1 g_2 θ_{int} v_{circ} cos (i) $r_{hl,\,disk}$ log (F_{disk}) Δx_{disk} Δy_{disk} r_{vscale} O2 : v_0 O2b : v_0 O2 : I_0^{Spec1} O2b : I_0^{Spec1} O2 : I_0^{Spec2} O2b : I_0^{Spec2} O2 : I_0^{Spec3} O2b : I_0^{Spec3}

#115 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 73

g_1 = -0.13
g_2 = 0.021
θ_{int} = 0.018
v_{circ} = 2.2e+02
cos (*i*) = 0.69
$r_{hl,\,disk}$ = 1.8
log (F_{disk}) = 5.3
Δx_{disk} = -0.081
Δy_{disk} = -0.11
r_{vscale} = 2.3

χ^2_v=0.4
χ^2 = 169
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -7.7
I_0^{Spec1} = 36.5

χ^2_v=1.1
χ^2 = 865
dof = 778

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -7.7
I_0^{Spec2} = 11.6

χ^2_v=1.0
χ^2 = 768
dof = 782

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -7.7
I_0^{Spec3} = 38.2

χ^2_v=1.1
χ^2 = 832
dof = 782

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12

v_0 = -11.4
I_0^{Spec1} = 69.6

χ^2_v=1.9
χ^2 = 1089
dof = 567

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -11.4
I_0^{Spec2} = 9.8

χ^2_v=1.3
χ^2 = 766
dof = 579

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

v_0 = -11.4
I_0^{Spec3} = 34.9

χ^2_v=0.8
χ^2 = 488
dof = 578

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#115

g_1 -0.12 ± 0.02
g_2 0.02 ± 0.02
θ_{int} 0.02 ± 0.03
v_{circ} 217.52 ± 17.22
cos (i) 0.70 ± 0.04
$r_{hl,disk}$ 1.84 ± 0.06
log (F_{disk}) 5.33 ± 0.01
Δx_{disk} -0.08 ± 0.01
Δy_{disk} -0.11 ± 0.01
r_{vscale} 2.32 ± 0.26
Hb : v_0 -7.74 ± 1.82
Hb : I_0^{Spec1} 36.60 ± 1.94
Hb : I_0^{Spec2} 11.65 ± 0.79
Hb : I_0^{Spec3} 38.11 ± 1.97
O3b : v_0 -11.30 ± 1.70
O3b : I_0^{Spec1} 69.59 ± 2.05
O3b : I_0^{Spec2} 9.74 ± 0.95
O3b : I_0^{Spec3} 34.95 ± 1.75


#116 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 60
g_1 = -0.0087
g_2 = -0.07
θ_{int} = -0.41
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.48
$r_{hl,disk}$ = 0.79
log (F_{disk}) = 4.6
Δx_{disk} = -0.21
Δy_{disk} = -0.17
r_{vscale} = 1.4
χ^2_ν = 1.9
χ^2 = 788
dof = 419
N
E
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Spec set C
Spec set B
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -5
SNR = 1
SNR = -1
SNR = -2
SNR = 7
SNR = 5
SNR = 11
SNR = 10
Hβ
[O III] λ4959
[O III] λ5007
v_0 = 8.3
f_0^{spec1} = 0.7
f_0^{spec2} = 7.9
f_0^{spec3} = 78.2
v_0 = -142.5
f_0^{spec1} = 51.7
f_0^{spec2} = 18.3
f_0^{spec3} = 8.3
v_0 = 1.6
f_0^{spec1} = 22.2
f_0^{spec2} = 22.9
f_0^{spec3} = 139.3
χ^2_ν = 1.5
χ^2 = 1161
dof = 778
χ^2_ν = 1.1
χ^2 = 866
dof = 777
χ^2_ν = 1.2
χ^2 = 954
dof = 778
χ^2_ν = 1.7
χ^2 = 814
dof = 487
χ^2_ν = 1.5
χ^2 = 642
dof = 440
χ^2_ν = 2.1
χ^2 = 892
dof = 433
χ^2_ν = 1.5
χ^2 = 934
dof = 638
χ^2_ν = 1.2
χ^2 = 735
dof = 606
χ^2_ν = 1.3
χ^2 = 807
dof = 602
Wavelength (Å)

#116

g_1 -0.01 ± 0.04
g_2 -0.07 ± 0.04
θ_{int} -0.41 ± 0.02
v_{circ} 196.22 ± 13.38
cos (*i*) 0.48 ± 0.06
$r_{hl,disk}$ 0.80 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.62 ± 0.01
Δx_{disk} -0.21 ± 0.01
Δy_{disk} -0.17 ± 0.02
r_{vscale} 1.35 ± 0.18
Hb : v_0 8.31 ± 2.71
Hb : I_0^{Spec1} 0.74 ± 0.50
Hb : I_0^{Spec2} 7.91 ± 0.68
Hb : I_0^{Spec3} 78.11 ± 4.19
O3a : v_0 -142.55 ± 6.73
O3a : I_0^{Spec1} 52.26 ± 21.02
O3a : I_0^{Spec2} 18.40 ± 3.06
O3a : I_0^{Spec3} 8.32 ± 3.10
O3b : v_0 1.65 ± 1.22
O3b : I_0^{Spec1} 22.15 ± 0.97
O3b : I_0^{Spec2} 22.91 ± 0.74
O3b : I_0^{Spec3} 139.28 ± 3.50

#117 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 67

g_1 = -0.052
g_2 = 0.018
θ_{int} = 2.3
v_{circ} = 90
cos (*i*) = 0.97
$r_{hl,\,disk}$ = 0.35
log (F_{disk}) = 4.5
Δx_{disk} = 0.55
Δy_{disk} = 0.024
r_{vscale} = 0.46

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 531
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set *A*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -9.8
I_0^{Spec1} = 29.0

χ^2_ν=3.0
χ^2 = 1373
dof = 461

Hβ

Spec set *C*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -9.8
I_0^{Spec2} = 25.4

χ^2_ν=2.3
χ^2 = 1035
dof = 449

Hβ

Spec set *B*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -9.8
I_0^{Spec3} = 143.9

χ^2_ν=2.0
χ^2 = 927
dof = 455

Hβ

Spec set *A*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

v_0 = -4.6
I_0^{Spec1} = 33.7

χ^2_ν=2.5
χ^2 = 1324
dof = 537

[O III] λ5007

Spec set *C*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 18

v_0 = -4.6
I_0^{Spec2} = 37.0

χ^2_ν=2.0
χ^2 = 1061
dof = 537

[O III] λ5007

Spec set *B*
Slit Position (arcsec)

N_λ = 30 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -4.6
I_0^{Spec3} = 34.9

χ^2_ν=2.0
χ^2 = 1042
dof = 515

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#117

g_1 -0.05 ± 0.02
g_2 0.02 ± 0.03
θ_{int} 2.27 ± 0.13
v_{circ} 91.12 ± 12.78
cos (i) 0.95 ± 0.05
$r_{hl,\,disk}$ 0.35 ± 0.01
log (F_{disk}) 4.55 ± 0.00
Δx_{disk} 0.54 ± 0.02
Δy_{disk} 0.02 ± 0.07
r_{vscale} 0.64 ± 0.60
Hb : v_0 -9.78 ± 1.78
Hb : I_0^{Spec1} 29.03 ± 1.94
Hb : I_0^{Spec2} 25.40 ± 0.84
Hb : I_0^{Spec3} 144.03 ± 15.24
O3b : v_0 -4.56 ± 1.23
O3b : I_0^{Spec1} 33.67 ± 1.17
O3b : I_0^{Spec2} 37.07 ± 0.82
O3b : I_0^{Spec3} 34.87 ± 2.02


#118 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
Δ RA (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 73
g_1 = 0.024
g_2 = 0.053
θ_{int} = -2.8
v_{circ} = 1.2e+02
cos (i) = 1
$r_{hl\ disk}$ = 0.71
log (F_{disk}) = 5.1
Δx_{disk} = -0.096
Δy_{disk} = 0.087
r_{vscale} = 0.07
χ^2_{tv}=1.3
χ^2 = 551
dof = 415
Spec set A
Spec set C
Spec set B
Slit Position (arcsec)
Hγ
Hβ
[O III] λ4959
[O III] λ5007
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 13
v_0 = -5.1
δ^{spec1} = 27.3
χ^2_{tv}=1.1
χ^2 = 840
dof = 774
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12
v_0 = -5.1
δ^{spec2} = 28.8
χ^2_{tv}=1.0
χ^2 = 796
dof = 774
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 10
v_0 = -5.1
δ^{spec3} = 140.1
χ^2_{tv}=1.1
χ^2 = 839
dof = 774
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8
v_0 = 2.4
δ^{spec1} = 57.4
χ^2_{tv}=1.3
χ^2 = 1010
dof = 774
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 15
v_0 = 2.4
δ^{spec2} = 57.0
χ^2_{tv}=1.0
χ^2 = 780
dof = 774
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 13
v_0 = 2.4
δ^{spec3} = 279.9
χ^2_{tv}=1.1
χ^2 = 874
dof = 772
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4
v_0 = -0.2
δ^{spec1} = 34.9
χ^2_{tv}=1.5
χ^2 = 911
dof = 628
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12
v_0 = -0.2
δ^{spec2} = 23.4
χ^2_{tv}=1.2
χ^2 = 762
dof = 631
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8
v_0 = -0.2
δ^{spec3} = 252.1
χ^2_{tv}=1.1
χ^2 = 714
dof = 623
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 26
v_0 = 1.8
δ^{spec1} = 103.6
χ^2_{tv}=0.9
χ^2 = 660
dof = 774
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 34
v_0 = 1.8
δ^{spec2} = 78.3
χ^2_{tv}=1.3
χ^2 = 969
dof = 772
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 29
v_0 = 1.8
δ^{spec3} = 679.9
χ^2_{tv}=1.2
χ^2 = 897
dof = 774
Wavelength (Å)

#118

g_1 0.02 ± 0.01
g_2 0.05 ± 0.01
θ_{int} -2.78 ± 0.05
v_{circ} 121.67 ± 14.38
cos (*i*) 1.00 ± 0.00
$r_{hl,disk}$ 0.71 ± 0.01
log (F_{disk}) 5.14 ± 0.00
Δx_{disk} -0.10 ± 0.01
Δy_{disk} 0.09 ± 0.01
r_{rscale} 0.08 ± 0.07
Hg : v_0 -5.07 ± 1.02
Hg : I_0^{Spec1} 27.31 ± 0.90
Hg : I_0^{Spec2} 28.76 ± 0.79
Hg : I_0^{Spec3} 140.09 ± 3.49
Hb : v_0 2.43 ± 0.83
Hb : I_0^{Spec1} 57.37 ± 1.52
Hb : I_0^{Spec2} 57.01 ± 1.20
Hb : I_0^{Spec3} 279.97 ± 6.31
O3a : v_0 -0.23 ± 1.06
O3a : I_0^{Spec1} 34.85 ± 1.24
O3a : I_0^{Spec2} 23.39 ± 0.64
O3a : I_0^{Spec3} 252.24 ± 6.54
O3b : v_0 1.86 ± 0.44
O3b : I_0^{Spec1} 103.59 ± 1.62
O3b : I_0^{Spec2} 78.31 ± 0.96
O3b : I_0^{Spec3} 679.94 ± 7.26

g_1 g_2 θ_{int} v_{circ} cos (*i*) $r_{hl,disk}$ log (F_{disk}) Δx_{disk} Δy_{disk} r_{rscale} Hg : v_0 Hg : I_0^{Spec1} Hg : I_0^{Spec2} Hg : I_0^{Spec3} Hb : v_0 Hb : I_0^{Spec1} Hb : I_0^{Spec2} Hb : I_0^{Spec3} O3a : v_0 O3a : I_0^{Spec1} O3a : I_0^{Spec2} O3a : I_0^{Spec3} O3b : v_0 O3b : I_0^{Spec1} O3b : I_0^{Spec2} O3b : I_0^{Spec3}

#119 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 27

g_1 = 0.018
g_2 = 0.028
θ_{int} = -2.2
v_{circ} = 1.4e+02
cos (i) = 0.54
$r_{hl,\,disk}$ = 0.63
log (F_{disk}) = 4.2
Δx_{disk} = -0.078
Δy_{disk} = 0.31
r_{vscale} = 0.72

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 492
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

[O II] λλ3726,3729

v_0 = 40.4
v_0 = 15.3
I_0^{Spec1} = 2.4
I_0^{Spec1} = 2.0

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 840
dof = 782

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

[O II] λλ3726,3729

v_0 = 40.4
v_0 = 15.3
I_0^{Spec2} = 6.0
I_0^{Spec2} = 7.0

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 886
dof = 782

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

[O II] λλ3726,3729

v_0 = 40.4
v_0 = 15.3
I_0^{Spec3} = 1.4
I_0^{Spec3} = 2.8

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 777
dof = 782

Wavelength (Å)

#119

g_1 0.01 ± 0.07
g_2 0.02 ± 0.08
θ_{int} -2.21 ± 0.14
v_{circ} 146.20 ± 21.59
cos (i) 0.54 ± 0.10
$r_{hl,\,disk}$ 0.63 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.15 ± 0.01
Δx_{disk} -0.07 ± 0.07
Δy_{disk} 0.32 ± 0.05
r_{vscale} 0.77 ± 0.47
O2 : v_0 39.64 ± 8.93
O2b : v_0 15.77 ± 13.46
O2 : I_0^{Spec1} 2.40 ± 0.34
O2b : I_0^{Spec1} 1.97 ± 0.58
O2 : I_0^{Spec2} 6.02 ± 0.53
O2b : I_0^{Spec2} 7.05 ± 0.97
O2 : I_0^{Spec3} 1.47 ± 0.79
O2b : I_0^{Spec3} 2.84 ± 0.66

#120 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 49

g_1 = -0.14
g_2 = 0.033
θ_{int} = 2.9
v_{circ} = 2e+02
cos (i) = 0.79
$r_{hl,\,disk}$ = 1.5
log (F_{disk}) = 5.4
Δx_{disk} = 0.11
Δy_{disk} = 0.071
r_{vscale} = 0.39

χ^2_ν=0.5
χ^2 = 191
dof = 423

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 17

v_0 = -15.3
I_0^{Spec1} = 14.0

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 732
dof = 782

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -15.3
I_0^{Spec2} = 10.2

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 715
dof = 782

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

v_0 = -15.3
I_0^{Spec3} = 22.4

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 712
dof = 782

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 13

v_0 = 0.1
I_0^{Spec1} = 13.5

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 801
dof = 629

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 0.1
I_0^{Spec2} = 3.8

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 714
dof = 633

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = 0.1
I_0^{Spec3} = 42.6

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 710
dof = 631

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#120

g_1 -0.13 ± 0.02
g_2 0.03 ± 0.02
θ_{int} 2.90 ± 0.03
v_{circ} 200.51 ± 18.37
cos (i) 0.79 ± 0.04
$r_{hl,\,disk}$ 1.46 ± 0.05
log (F_{disk}) 5.39 ± 0.01
Δx_{disk} 0.11 ± 0.02
Δy_{disk} 0.07 ± 0.01
r_{vscale} 0.41 ± 0.16
Hb : v_0 -15.34 ± 2.00
Hb : I_0^{Spec1} 14.06 ± 0.50
Hb : I_0^{Spec2} 10.15 ± 0.49
Hb : I_0^{Spec3} 22.42 ± 0.86
O3b : v_0 -0.01 ± 4.41
O3b : I_0^{Spec1} 13.55 ± 1.19
O3b : I_0^{Spec2} 3.75 ± 0.43
O3b : I_0^{Spec3} 42.63 ± 3.71

#127 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging

Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 64

g_1 = 0.043
g_2 = 0.13
θ_{int} = -1.6
v_{circ} = 1.5e+02
cos (i) = 0.46
$r_{hl,\,disk}$ = 0.69
log (F_{disk}) = 4.6
Δx_{disk} = -0.21
Δy_{disk} = 0.22
r_{vscale} = 0.85

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 545
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A

Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

[O III] λ5007

v_0 = -20.8
I_0^{Spec1} = 6.4

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 786
dof = 622

Spec set C

Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

[O III] λ5007

v_0 = -20.8
I_0^{Spec2} = 17.4

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 610
dof = 620

Spec set B

Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -3

[O III] λ5007

v_0 = -20.8
I_0^{Spec3} = 5.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 762
dof = 611

Wavelength (Å)

#127

g_1 0.03 ± 0.08

g_2 0.13 ± 0.02

θ_{int} -1.57 ± 0.04

v_{circ} 154.09 ± 15.48

cos (i) 0.48 ± 0.08

$r_{hl,\,disk}$ 0.68 ± 0.05

log (F_{disk}) 4.63 ± 0.00

Δx_{disk} -0.21 ± 0.02

Δy_{disk} 0.23 ± 0.04

r_{vscale} 0.87 ± 0.19

O3b : v_0 -20.60 ± 2.53

O3b : I_0^{Spec1} 6.37 ± 0.38

O3b : I_0^{Spec2} 17.33 ± 0.63

O3b : I_0^{Spec3} 5.33 ± 1.39

#128 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 53

g_1 = 0.11
g_2 = -0.063
θ_{int} = 1.4
v_{circ} = 1.3e+02
cos (i) = 0.53
$r_{hl,\,disk}$ = 1.1
log (F_{disk}) = 4.9
Δx_{disk} = 0.19
Δy_{disk} = -0.094
r_{vscale} = 1.3

χ^2_ν=0.2
χ^2 = 82
dof = 367

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8

v_0 = -20.5
I_0^{Spec1} = 2.6

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 652
dof = 515

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -20.5
I_0^{Spec2} = 5.4

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 733
dof = 578

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

v_0 = -20.5
I_0^{Spec3} = 32.9

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 598
dof = 576

[O III] λ5007

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 13

v_0 = -9.7
I_0^{Spec1} = 6.8

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 677
dof = 782

Hα

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 14

v_0 = -9.7
I_0^{Spec2} = 18.3

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 789
dof = 782

Hα

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -9.7
I_0^{Spec3} = 74.6

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 808
dof = 782

Hα

Wavelength (Å)

#128

g_1 0.09 ± 0.05
g_2 -0.06 ± 0.03
θ_{int} 1.43 ± 0.03
v_{circ} 130.04 ± 13.68
cos (i) 0.55 ± 0.06
$r_{hl,\,disk}$ 1.14 ± 0.06
log (F_{disk}) 4.94 ± 0.01
Δx_{disk} 0.19 ± 0.01
Δy_{disk} -0.10 ± 0.01
r_{vscale} 1.35 ± 0.28
O3b : v_0 -20.48 ± 3.68
O3b : I_0^{Spec1} 2.57 ± 0.28
O3b : I_0^{Spec2} 5.40 ± 0.40
O3b : I_0^{Spec3} 32.91 ± 2.14
Ha : v_0 -9.69 ± 1.29
Ha : I_0^{Spec1} 6.83 ± 0.30
Ha : I_0^{Spec2} 18.27 ± 0.55
Ha : I_0^{Spec3} 74.55 ± 2.95


#129 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
Δ RA (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 55
g_1 = -0.12
g_2 = 0.044
θ_{int} = 0.23
v_{circ} = 1.6e+02
cos (i) = 0.61
f_{H_disk} = 1.1
log (F_{disk}) = 4.7
Δx_{disk} = 0.11
Δy_{disk} = -0.23
r_{vscale} = 0.93
χ^2_{tot}=0.9
χ^2 = 376
dof = 415
Spec set A
Spec set C
Spec set B
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 8
SNR = -1
SNR = 4
SNR = 1
SNR = 5
SNR = 6
SNR = 10
SNR = 11
v_0 = -15.1
δ^{spec1} = 7.2
δ^{spec2} = 10.4
δ^{spec3} = 30.3
v_0 = -19.4
δ^{spec1} = 5.5
δ^{spec2} = 16.6
δ^{spec3} = 12.6
v_0 = -10.2
δ^{spec1} = 22.4
δ^{spec2} = 49.4
δ^{spec3} = 171.9
v_0 = 5.3
δ^{spec1} = 6.5
δ^{spec2} = 7.9
δ^{spec3} = 20.5
Hβ
[O III] λ4959
[O III] λ5007
Hα
χ^2_{tot}=1.1
χ^2 = 820
dof = 774
χ^2_{tot}=1.2
χ^2 = 913
dof = 774
χ^2_{tot}=1.1
χ^2 = 884
dof = 774
χ^2_{tot}=1.3
χ^2 = 961
dof = 766
χ^2_{tot}=1.0
χ^2 = 760
dof = 772
χ^2_{tot}=1.1
χ^2 = 822
dof = 769
χ^2_{tot}=1.1
χ^2 = 594
dof = 542
χ^2_{tot}=1.2
χ^2 = 643
dof = 554
χ^2_{tot}=1.3
χ^2 = 749
dof = 567
χ^2_{tot}=1.2
χ^2 = 805
dof = 691
χ^2_{tot}=1.2
χ^2 = 827
dof = 706
χ^2_{tot}=1.2
χ^2 = 851
dof = 702
Wavelength (Å)

#129

g_1 -0.12 ± 0.02
g_2 0.04 ± 0.02
θ_{int} 0.23 ± 0.03
v_{circ} 160.95 ± 8.84
cos (*i*) 0.61 ± 0.04
$r_{hl,disk}$ 1.06 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.65 ± 0.01
Δx_{disk} 0.11 ± 0.02
Δy_{disk} -0.24 ± 0.02
r_{vscale} 0.93 ± 0.11
Hb : v_0 -15.06 ± 2.32
Hb : ζ_0^{spec1} 7.18 ± 0.59
Hb : ζ_0^{spec2} 10.40 ± 0.68
Hb : ζ_0^{spec3} 30.30 ± 1.87
O3a : v_0 -19.39 ± 3.17
O3a : ζ_0^{spec1} 5.52 ± 0.62
O3a : ζ_0^{spec2} 16.59 ± 1.16
O3a : ζ_0^{spec3} 12.60 ± 1.52
O3b : v_0 -10.16 ± 1.73
O3b : ζ_0^{spec1} 22.46 ± 2.41
O3b : ζ_0^{spec2} 49.39 ± 2.41
O3b : ζ_0^{spec3} 171.87 ± 4.77
Ha : v_0 5.30 ± 3.22
Ha : ζ_0^{spec1} 6.54 ± 0.39
Ha : ζ_0^{spec2} 7.92 ± 0.49
Ha : ζ_0^{spec3} 20.47 ± 1.70

#130 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 56

g_1 = -0.13
g_2 = 0.018
θ_{int} = -1.1
v_{circ} = 1.4e+02
cos (i) = 0.46
$r_{hl,\,disk}$ = 0.81
log (F_{disk}) = 4.5
Δx_{disk} = 0.13
Δy_{disk} = 0.09
r_{vscale} = 0.71

χ^2_ν=2.2
χ^2 = 935
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = 2.9
I_0^{Spec1} = 67.5

χ^2_ν=1.5
χ^2 = 1185
dof = 786

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 27

v_0 = 2.9
I_0^{Spec2} = 65.7

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1077
dof = 786

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 16

v_0 = 2.9
I_0^{Spec3} = 345.0

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1067
dof = 786

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#130

g_1 -0.13 ± 0.02
g_2 0.02 ± 0.04
θ_{int} -1.05 ± 0.02
v_{circ} 147.24 ± 10.71
cos (i) 0.46 ± 0.04
$r_{hl,\,disk}$ 0.81 ± 0.04
log (F_{disk}) 4.54 ± 0.01
Δx_{disk} 0.13 ± 0.01
Δy_{disk} 0.09 ± 0.01
r_{vscale} 0.75 ± 0.12
O3b : v_0 2.91 ± 0.75
O3b : I_0^{Spec1} 67.49 ± 1.92
O3b : I_0^{Spec2} 65.74 ± 0.99
O3b : I_0^{Spec3} 344.97 ± 6.26

g_1 −0.13 −0.07
g_2 0.0 0.1
θ_{int} −1.09 −1.01
v_{circ} 140 170
cos (i) 0.4 0.5
$r_{hl,\,disk}$ 0.8 0.9
log (F_{disk}) 4.52 4.55
Δx_{disk} 0.10 0.15
Δy_{disk} 0.07 0.10
r_{vscale} 0.5 1.0
O3b : v_0 2 4
O3b : I_0^{Spec1} 65 70
O3b : I_0^{Spec2} 64 66 68
O3b : I_0^{Spec3} 330 340 350 360

#131 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 80

g_1 = 0.011
g_2 = -0.13
θ_{int} = 0.93
v_{circ} = 1.7e+02
cos (i) = 0.56
$r_{hl,disk}$ = 0.63
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = 0.32
Δy_{disk} = -0.12
r_{vscale} = 0.9

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 429
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -7

v_0 = -15.1
I_0^{Spec1} = 15.0

χ^2_ν=1.7
χ^2 = 1173
dof = 673

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 2

v_0 = -15.1
I_0^{Spec2} = 23.2

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 842
dof = 663

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -15.1
I_0^{Spec3} = 16.9

χ^2_ν=1.0
χ^2 = 675
dof = 674

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 3

v_0 = -22.4
I_0^{Spec1} = 6.0

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 901
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 4

v_0 = -22.4
I_0^{Spec2} = 30.1

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 908
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -4

v_0 = -22.4
I_0^{Spec3} = 35.8

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 912
dof = 782

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#131

g_1 0.01 ± 0.04
g_2 -0.12 ± 0.02
θ_{int} 0.93 ± 0.06
v_{circ} 168.99 ± 10.95
cos (i) 0.57 ± 0.04
$r_{hl,\,disk}$ 0.63 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.79 ± 0.00
Δx_{disk} 0.32 ± 0.01
Δy_{disk} -0.12 ± 0.02
r_{vscale} 0.89 ± 0.12
Hb : v_0 -15.12 ± 2.64
Hb : I_0^{Spec1} 15.04 ± 1.73
Hb : I_0^{Spec2} 23.19 ± 0.95
Hb : I_0^{Spec3} 16.90 ± 1.91
O3b : v_0 -22.40 ± 2.55
O3b : I_0^{Spec1} 6.06 ± 0.54
O3b : I_0^{Spec2} 30.12 ± 1.06
O3b : I_0^{Spec3} 35.65 ± 6.48


#132 Observation
Best fit model
Residual (= obs − model)
Imaging
Δ DEC (arcsec)
N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 84
g_1 = -0.012
g_2 = 0.029
θ_{int} = -0.91
v_{circ} = 1.2e+02
cos (i) = 0.82
$r_{hl,disk}$ = 0.3
log (F_{disk}) = 4.7
Δx_{disk} = -0.28
Δy_{disk} = 0.0082
r_{vscale} = 2
χ^2_ν = 2.2
χ^2 = 783
dof = 357
Δ RA (arcsec)
Spec set A
Slit Position (arcsec)
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -10
v_0 = -49.2
f_0^{Spec1} = 1.1
χ^2_ν = 1.7
χ^2 = 1129
dof = 648
Hβ
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 6
f_0^{Spec2} = 23.3
χ^2_ν = 1.1
χ^2 = 710
dof = 646
Hβ
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -4
f_0^{Spec3} = 39.9
χ^2_ν = 1.3
χ^2 = 805
dof = 644
Hβ
Spec set A
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -9
v_0 = -38.2
f_0^{Spec1} = 0.4
χ^2_ν = 1.6
χ^2 = 947
dof = 586
[O III] λ4959
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 0
f_0^{Spec2} = 8.9
χ^2_ν = 1.4
χ^2 = 836
dof = 604
[O III] λ4959
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -16
f_0^{Spec3} = 1.0
χ^2_ν = 1.7
χ^2 = 1025
dof = 587
[O III] λ4959
Spec set A
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -3
v_0 = -46.4
f_0^{Spec1} = 1.9
χ^2_ν = 1.1
χ^2 = 758
dof = 667
[O III] λ5007
Spec set C
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 9
f_0^{Spec2} = 29.8
χ^2_ν = 1.0
χ^2 = 640
dof = 666
[O III] λ5007
Spec set B
N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0
f_0^{Spec3} = 57.5
χ^2_ν = 1.0
χ^2 = 666
dof = 659
[O III] λ5007
Wavelength (Å)

#132

g_1 -0.01 ± 0.03
g_2 0.03 ± 0.05
θ_{int} -0.92 ± 0.15
v_{circ} 123.36 ± 16.75
cos (*i*) 0.82 ± 0.09
$r_{hl,\,disk}$ 0.30 ± 0.02
log (F_{disk}) 4.68 ± 0.00
Δx_{disk} -0.28 ± 0.01
Δy_{disk} 0.01 ± 0.04
r_{vscale} 1.97 ± 0.82
Hb : v_0 -49.17 ± 2.32
Hb : I_0^{Spec1} 1.56 ± 1.41
Hb : I_0^{Spec2} 23.28 ± 0.94
Hb : I_0^{Spec3} 40.03 ± 4.79
O3a : v_0 -38.35 ± 4.24
O3a : I_0^{Spec1} 0.59 ± 0.56
O3a : I_0^{Spec2} 8.89 ± 0.82
O3a : I_0^{Spec3} 1.40 ± 1.26
O3b : v_0 -46.31 ± 3.04
O3b : I_0^{Spec1} 1.98 ± 1.12
O3b : I_0^{Spec2} 29.84 ± 1.40
O3b : I_0^{Spec3} 57.45 ± 7.37

#133 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 56

g_1 = -0.14
g_2 = -0.11
θ_{int} = 2.4
v_{circ} = 1.6e+02
cos (i) = 0.43
$r_{hl,disk}$ = 1.1
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = 0.27
Δy_{disk} = 0.038
r_{vscale} = 0.22

χ^2_ν=2.6
χ^2 = 956
dof = 363

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -13

[O III] λ4959

v_0 = -21.8
I_0^{Spec1} = 9.2

χ^2_ν=3.5
χ^2 = 2740
dof = 785

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -11

[O III] λ4959

v_0 = -21.8
I_0^{Spec2} = 2.9

χ^2_ν=1.6
χ^2 = 1257
dof = 786

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -13

[O III] λ4959

v_0 = -21.8
I_0^{Spec3} = 25.0

χ^2_ν=1.5
χ^2 = 1176
dof = 786

Wavelength (Å)


#133
g_1
-0.13 ± 0.01
g_2
-0.10 ± 0.04
θ_{int}
2.38 ± 0.03
v_{circ}
163.50 ± 16.78
cos (*i*)
0.42 ± 0.04
$r_{hl,\,disk}$
1.08 ± 0.05
log (F_{disk})
4.78 ± 0.01
Δx_{disk}
0.27 ± 0.02
Δy_{disk}
0.04 ± 0.01
r_{vscale}
0.25 ± 0.16
O3a : v_0
-21.73 ± 4.71
O3a : I_0^{Spec1}
9.21 ± 0.99
O3a : I_0^{Spec2}
2.85 ± 0.75
O3a : I_0^{Spec3}
25.15 ± 4.31

#135 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 54

g_1 = 0.056
g_2 = 0.12
θ_{int} = 1.9
v_{circ} = 1.4e+02
cos (i) = 0.61
$r_{hl,\,disk}$ = 0.89
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = 0.21
Δy_{disk} = 0.057
r_{vscale} = 0.51

χ^2_ν=0.6
χ^2 = 262
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

[O III] λ5007

v_0 = -19.2
I_0^{Spec1} = 11.3

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 733
dof = 619

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

[O III] λ5007

v_0 = -19.2
I_0^{Spec2} = 8.5

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 747
dof = 620

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -3

[O III] λ5007

v_0 = -19.2
I_0^{Spec3} = 11.4

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 725
dof = 616

Wavelength (Å)

#135

g_1 0.05 ± 0.05

g_2 0.11 ± 0.02

θ_{int} 1.86 ± 0.06

v_{circ} 144.42 ± 15.62

cos (i) 0.62 ± 0.07

$r_{hl,\,disk}$ 0.89 ± 0.05

log (F_{disk}) 4.76 ± 0.01

Δx_{disk} 0.21 ± 0.01

Δy_{disk} 0.06 ± 0.01

r_{vscale} 0.52 ± 0.19

O3b : v_0 -19.31 ± 3.12

O3b : I_0^{Spec1} 11.25 ± 0.80

O3b : I_0^{Spec2} 8.50 ± 0.53

O3b : I_0^{Spec3} 11.47 ± 1.40

#136 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 69

g_1 = 0.12
g_2 = 0.062
θ_{int} = -0.37
v_{circ} = 92
cos (i) = 0.76
$r_{hl,\,disk}$ = 0.29
log (F_{disk}) = 4.6
Δx_{disk} = -0.68
Δy_{disk} = -0.15
r_{vscale} = 2.3

χ^2_ν=2.2
χ^2 = 955
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

[O III] λ5007

v_0 = 1.8
I_0^{Spec1} = 10.6

χ^2_ν=1.4
χ^2 = 1075
dof = 786

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12

[O III] λ5007

v_0 = 1.8
I_0^{Spec2} = 67.2

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 933
dof = 786

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 0

[O III] λ5007

v_0 = 1.8
I_0^{Spec3} = 76.4

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 864
dof = 784

Wavelength (Å)

#136

g_1 0.10 ± 0.04

g_2 0.07 ± 0.04

θ_{int} -0.36 ± 0.11

v_{circ} 93.17 ± 13.22

cos (i) 0.74 ± 0.08

$r_{hl,\,disk}$ 0.29 ± 0.02

log (F_{disk}) 4.58 ± 0.00

Δx_{disk} -0.67 ± 0.03

Δy_{disk} -0.15 ± 0.06

r_{vscale} 2.31 ± 0.81

O3b : v_0 1.78 ± 1.16

O3b : I_0^{Spec1} 10.57 ± 0.87

O3b : I_0^{Spec2} 67.22 ± 1.42

O3b : I_0^{Spec3} 76.40 ± 4.19

#138 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 42

g_1 = 0.12
g_2 = 0.14
θ_{int} = -0.23
v_{circ} = 1.7e+02
cos (i) = 0.44
$r_{hl,\,disk}$ = 0.9
log (F_{disk}) = 4.5
Δx_{disk} = -0.18
Δy_{disk} = -0.097
r_{vscale} = 0.85

χ^2_v=1.1
χ^2 = 451
dof = 427

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 12

[O III] λ5007

v_0 = -0.8
I_0^{Spec1} = 61.8

χ^2_v=1.4
χ^2 = 1129
dof = 786

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 9

[O III] λ5007

v_0 = -0.8
I_0^{Spec2} = 22.0

χ^2_v=1.2
χ^2 = 968
dof = 785

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 6

[O III] λ5007

v_0 = -0.8
I_0^{Spec3} = 109.4

χ^2_v=1.1
χ^2 = 856
dof = 786

Wavelength (Å)

#138

g_1 0.11 ± 0.03

g_2 0.13 ± 0.01

θ_{int} -0.23 ± 0.02

v_{circ} 173.22 ± 10.40

cos (i) 0.43 ± 0.03

$r_{hl,\,disk}$ 0.90 ± 0.03

log (F_{disk}) 4.47 ± 0.01

Δx_{disk} -0.18 ± 0.01

Δy_{disk} -0.10 ± 0.01

r_{vscale} 0.85 ± 0.10

O3b : v_0 -0.82 ± 1.35

O3b : I_0^{Spec1} 61.75 ± 1.73

O3b : I_0^{Spec2} 21.97 ± 0.75

O3b : I_0^{Spec3} 109.44 ± 4.80

#139 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 55

g_1 = -0.051
g_2 = -0.13
θ_{int} = 0.32
v_{circ} = 2.8e+02
cos (i) = 0.39
$r_{hl,\,disk}$ = 1.1
log (F_{disk}) = 4.8
Δx_{disk} = -0.043
Δy_{disk} = -0.087
r_{vscale} = 1.3

χ^2_ν=0.8
χ^2 = 319
dof = 390

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 9

v_0 = -37.2
I_0^{Spec1} = 13.7

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 882
dof = 782

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 11

v_0 = -37.2
I_0^{Spec2} = 12.1

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 861
dof = 780

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -37.2
I_0^{Spec3} = 47.9

χ^2_ν=1.3
χ^2 = 993
dof = 782

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 5

v_0 = -7.0
I_0^{Spec1} = 84.8

χ^2_ν=1.5
χ^2 = 582
dof = 380

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -7.0
I_0^{Spec2} = 24.6

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 501
dof = 413

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 14

v_0 = -7.0
I_0^{Spec3} = 60.2

χ^2_ν=1.2
χ^2 = 556
dof = 466

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#139

g_1 -0.05 ± 0.04
g_2 -0.13 ± 0.02
θ_{int} 0.32 ± 0.02
v_{circ} 275.97 ± 13.27
cos (i) 0.40 ± 0.04
$r_{hl,\,disk}$ 1.12 ± 0.05
log (F_{disk}) 4.79 ± 0.01
Δx_{disk} -0.04 ± 0.01
Δy_{disk} -0.09 ± 0.01
r_{vscale} 1.30 ± 0.13
Hb : v_0 -37.23 ± 2.69
Hb : I_0^{Spec1} 13.68 ± 0.87
Hb : I_0^{Spec2} 12.15 ± 0.54
Hb : I_0^{Spec3} 47.89 ± 3.56
O3b : v_0 -7.11 ± 2.12
O3b : I_0^{Spec1} 84.70 ± 6.03
O3b : I_0^{Spec2} 24.60 ± 0.98
O3b : I_0^{Spec3} 60.14 ± 2.20

#141 Observation

Best fit model

Residual (= obs – model)

Imaging
Δ DEC (arcsec)

N_RA = 21 px
N_DEC = 21 px
SNR = 89

g_1 = -0.07
g_2 = -0.034
θ_{int} = 0.24
v_{circ} = 1.3e+02
cos (i) = 0.86
$r_{hl,\,disk}$ = 0.58
log (F_{disk}) = 4.9
Δx_{disk} = -0.19
Δy_{disk} = -0.43
r_{vscale} = 1.5

χ^2_ν=0.8
χ^2 = 340
dof = 423

N
E

Δ RA (arcsec)

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -2

v_0 = -16.2
I_0^{Spec1} = 8.0

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 761
dof = 680

Hβ

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 7

v_0 = -16.2
I_0^{Spec2} = 18.8

χ^2_ν=0.9
χ^2 = 616
dof = 653

Hβ

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 1

v_0 = -16.2
I_0^{Spec3} = 36.7

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 691
dof = 657

Hβ

Spec set A
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = 0

v_0 = -52.9
I_0^{Spec1} = 0.8

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 869
dof = 756

[O III] λ5007

Spec set C
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

v_0 = -52.9
I_0^{Spec2} = 10.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 834
dof = 782

[O III] λ5007

Spec set B
Slit Position (arcsec)

N_λ = 40 px
N_slit = 20 px
SNR = -0

v_0 = -52.9
I_0^{Spec3} = 22.2

χ^2_ν=1.1
χ^2 = 842
dof = 779

[O III] λ5007

Wavelength (Å)

#141

g_1 -0.07 ± 0.04
g_2 -0.04 ± 0.03
θ_{int} 0.25 ± 0.14
v_{circ} 129.18 ± 17.04
cos (*i*) 0.86 ± 0.08
$r_{hl,\,disk}$ 0.58 ± 0.03
log (F_{disk}) 4.88 ± 0.00
Δx_{disk} -0.18 ± 0.07
Δy_{disk} -0.43 ± 0.05
r_{vscale} 1.53 ± 0.96
Hb : v_0 -16.13 ± 3.41
Hb : I_0^{Spec1} 8.04 ± 1.78
Hb : I_0^{Spec2} 18.84 ± 1.13
Hb : I_0^{Spec3} 36.78 ± 3.72
O3b : v_0 -52.74 ± 4.75
O3b : I_0^{Spec1} 0.83 ± 0.27
O3b : I_0^{Spec2} 10.15 ± 0.84
O3b : I_0^{Spec3} 22.16 ± 1.93