

Shaped-mean priors (M~N(1.0, 1.0), x0=0.1) vs injected JAM truth


t3: a~N(0.5, 0.4), b~N(3.0, 2.0)
truth fit a=+0.44 (-0.1σ), b=1.92 (-0.5σ)




v3: a~N(0.5, 0.4), b~N(3.0, 2.0)
truth fit a=+0.49 (-0.0σ), b=2.34 (-0.3σ)




v8: a~N(0.5, 0.4), b~N(3.0, 2.0)
truth fit a=+0.58 (+0.2σ), b=3.21 (+0.1σ)




v: a~N(0.5, 0.4), b~N(3.0, 2.0)
truth fit a=+0.59 (+0.2σ), b=3.38 (+0.2σ)




v15: a~N(0.5, 0.4), b~N(3.0, 2.0)
truth fit a=+0.59 (+0.2σ), b=3.38 (+0.2σ)




t8: a~N(-0.2, 0.15), b~N(3.0, 2.0)
truth fit a=-0.06 (+1.0σ), b=2.32 (-0.3σ)



t15: a~N(-0.2, 0.15), b~N(3.0, 2.0)
truth fit a=-0.05 (+1.0σ), b=2.52 (-0.2σ)



sigma: a~N(-0.2, 0.15), b~N(3.0, 2.0)
truth fit a=-0.10 (+0.7σ), b=2.58 (-0.2σ)



g: a~N(-0.2, 0.15), b~N(5.0, 3.0)
truth fit a=+0.04 (+1.6σ), b=5.95 (+0.3σ)

