
a
Chromosome arms differ in assembled telomere length (HPRC Release 2, 11,998 tips, 230 samples; mean ± 95% CI)
black: arm in Karimian et al. 2024 Fig. 4e; grey: not reported there
Assembled telomere length relative to sample mean (kb)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
9q 7p 20q 21q 19p 9p 17q 2q 16p 12p 20p 16q 5q 11p 11q Xq 3q 17p 10q 1p 6q 15q 10p 4q 6p 13q 22q 7q 4p 18q 19q 18p 8q 8p 12q 21p 1q 2p 5p 14q 22p 3p 14p Xp 15p 13p
b
Arm ranking matches nanopore profiling (ρ = 0.73, 38 arms)
HPRC relative length (kb)
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
3p
12q
4q
17p
12p
20q
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
Karimian et al. 2024 relative mean length (kb, digitized)
c
Absolute length depends on HiFi input batch
Assembled telomere length (kb)
20
15
10
5
0
Revio only 2.6k
DC only 1.5k
DC + Revio 5.2k
other CCS 0.4k
unk-nown 2.4k
d
Telomeres lie well below tip-read length (ρ = -0.20)
Assembled telomere length (kb)
35
30
25
20
15
10
5
0
telomere = read
0 10 20 30
Tip-carrying read length (kb)