

a Terminal blocks resembling another arm (tier A/B alleles)
1p 1q 2p 2q 3p 3q 4p 4q 5p 5q 6p 6q 7p 7q 8p 8q 9p 9q 10p 10q 11p 11q 12p 12q acroP 13q 14q 15q 16p 16q 17p 17q 18p 18q 19p 19q 20p 20q 21q 22q PAR1 PAR2
Structural alleles per arm (outer bars)
tier A/B
tier C
longest bar: 16p, 49
Frequency on recipient arm
0.05
0.2
0.45
within family
recipient arm
b Native ends are a minority on 17 of 42 arms
PAR1 7q 5p 3p 2p 14q 11q 18q 12q 1q acroP 8q 13q 10p 22q 18p 21q 12p 10q PAR2 4p 19q 7p 16p 2q 5q 6q 17p 20q 20p 4q 16q 9p 15q 11p 8p 9q 17q 3q 1p 19p 6p
0
0.5
1
Fraction of Release 2 ends
native (home, none)
foreign
within family
no core structure
Colour = CHM13 v2.0 end (ring: own arm; chord: best end of the terminal block; faded: not drawn)
p
q
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X Y
none
Paralog families (outlined; shared hue):
PF01 4p,14p,15p,21p,22p
PF02 1p,5q,6q
PF03 11p,15q
PF04 3q,19p
PF05 Xp,Yp
PF06 Xq,Yq