
donor allele (CHM13 D)
recipient / proximal allele (CHM13 P)
neither
telomere
unique anchor
switch 95% interval
a HG002 3q maternal (SA-3q-01): CHM13 11p to CHM13 3q, switch 33.0-40.5 kb, anchor 313 kb unique (ont_ul_dorado)
CHM13 11p chr11:2,956-31,880
CHM13 3q chr3:200,589,762-201,061,965
b HG002 9p maternal (SA-9p-08): CHM13 15q to CHM13 9p, switch 24.0-25.1 kb, anchor 174 kb unique (ont_q28)
CHM13 15q chr15:99,731,422-99,749,758
CHM13 9p chr9:25,155-228,408
c HG002 19q maternal (SA-19q-08): CHM13 22q to CHM13 19q, switch 12.8-13.0 kb, anchor 79 kb unique (ont_ul_dorado)
CHM13 22q chr22:51,310,445-51,321,512
CHM13 19q chr19:61,610,633-61,694,059
d HG002 17p paternal (SA-17p-02): CHM13 11p to CHM13 17p, switch 16.1-16.4 kb, anchor 89 kb unique (ont_ul_dorado)
CHM13 11p chr11:202,196-213,668 (202-214 kb from the CHM13 11p telomere; drawn under the read)
CHM13 17p chr17:6,341-94,767 (6-95 kb from the CHM13 17p telomere; drawn under the read)
e HG004 9p (transmitting parent, SA-9p-08): CHM13 15q to CHM13 9p, switch 28.9-30.1 kb, anchor 19 kb unique (HG004_ont_ul_r941)
CHM13 15q chr15:99,731,269-99,749,758
CHM13 9p chr9:25,985-63,425
f HG01258 20q SA-20q-01: CHM13 3q to CHM13 20q, switch 25.0-34.6 kb, anchor 32 kb unique (1KG_ONT_HG01258)
CHM13 3q chr3:201,088,985-201,091,009
CHM13 20q chr20:66,119,392-66,176,291
g HG01258 17p SA-17p-02: CHM13 11p to CHM13 17p, switch 26.7-26.8 kb, anchor 31 kb unique (1KG_ONT_HG01258)
CHM13 11p chr11:202,749-220,548 (203-221 kb from the CHM13 11p telomere; drawn under the read)
CHM13 17p chr17:15,973-61,165 (16-61 kb from the CHM13 17p telomere; drawn under
h NA20346 2q SA-2q-04: CHM13 7p to CHM13 2q, switch 7.4-8.4 kb, anchor 17 kb unique (1KG_ONT_NA20346)
CHM13 7p chr7:2,306-6,889
CHM13 2q chr2:242,599,930-242,689,151
read position from the telomeric end (kb)