

Pruebas de Conocimiento Cero y sus Aplicaciones

José Luis Cánovas Sánchez

Tutores:

Antonio José Pallarés Ruiz

Leandro Marín Muñoz

10 de julio de 2017

Universidad de Murcia

Facultad de Matemáticas

Decision Problems

Residuos Cuadráticos

Pruebas Interactivas

Pruebas de Conocimiento Cero

Decision Problems

Definición (Decision Problem)

General description of a task which depend on some parameters and which possible answers are in the set $\{True, False\}$.

Name *A characteristic name.*

Parameters *Arguments the problem depends on.*


Question *Question such the possible answers are True or False.*

Graph Isomorphism

Name Graph Isomorphism Problem (GI).

Parameters Given two graphs $G_1 = (V_1, E_1)$ and $G_2 = (V_2, E_2)$ with $|V_1| = |V_2| = n$.

Question Is there a permutation $\tau : V_1 \rightarrow V_2$ such that an edge $(u, v) \in E_1$ if and only if $(\tau(u), \tau(v)) \in E_2$?




Hamiltonian Cycle ^{NPC}

Name Hamiltonian Cycle Problem (HC).

Parameters Given graph $G = (V, E)$.

Question Does there exist a Hamiltonian cycle in G ?




Graph 3-colorability ^{NPC}

Name Graph 3-colorability Problem (G3C).

Parameters Given graph $G = (V, E)$.

Question Is there a function $\phi : V \rightarrow \{1, 2, 3\}$ such that
 $\phi(u) \neq \phi(v) \quad \forall (u, v) \in E$?



Quadratic residue

Name Factorization problem (FACT).

Parameters Positive integer N .

Question Are there integers $p, q \geq 2$ such that $N = pq$?

Name Quadratic residue problem (QR).

Parameters Given a composite integer $N = pq$ and the integer x with Jacobi Symbol $\left(\frac{x}{N}\right) = 1$.

Question Is x a quadratic residue in \mathbb{Z}_N ? $\exists a \in \mathbb{Z}_N : x \equiv a^2(N)$?

Theorem


$QR \leq_P FACT$

Discrete Logarithm

Name Discrete Logarithm problem (DL).

Parameters A cyclic group $G = \langle g \rangle$ of prime order q , an element $y \in G$.

Question What is the integer $s \in \mathbb{Z}_q$ such that $g^s = y$, or $\log_g y = s$?



Discrete Logarithm with
 $G = \mathbb{Z}_{1231}$, $g = 3$.

Adolfo Quirós Gracián. *Grupos y criptografía: de Julio César a las curvas elípticas*.

Definition (Class P)

The set of decision problems which can be solved in polynomial time.

Definition (Class NP)

The set of decision problems where a *True* answer can be verified in polynomial time, given some extra information (certificate).

Definition (Polynomial-time reduction $L_1 \leq_P L_2$)

Be L_1 and L_2 two decision problems. L_1 can be reduced in polynomial time to L_2 if L_1 can be solved using L_2 as a subroutine plus a polynomial time.

Definition (Class NP-complete or NPC)

A decision problems L is in **NPC** if:

1. $L \in \mathbf{NP}$, and
2. $L_1 \leq_P L \quad \forall L_1 \in \mathbf{NP}$.

Residuos Cuadráticos

Definición

Sea $x \in \mathbb{Z}_n^*$. Se dice que x es un *residuo cuadrático* módulo n , o un *cuadrado* módulo n , si existe un $a \in \mathbb{Z}_n^*$ tal que

$$x \equiv a^2 \pmod{n}.$$

Si no existe dicho a , entonces x se llama un *no-residuo cuadrático* módulo n .

Al conjunto de los residuos cuadráticos módulo n los denotaremos como Q_n . Al de los no-residuos cuadráticos, como $\overline{Q_n}$.

Ejemplo

Si tomamos $n = 4$, los no-residuos cuadráticos son 2 y 3, y el único residuo cuadrático es 1:

$$1^2 \equiv 1 \pmod{4} \quad 2^2 \equiv 0 \pmod{4} \quad 3^2 \equiv 1 \pmod{4}$$

Por definición $0 \notin \mathbb{Z}_n^*$, y por tanto $0 \notin Q_n$ ni $0 \notin \overline{Q_n}$.

Residuos Cuadráticos: Propiedades

Proposición

Sea $p > 1$ un número primo, entonces $|Q_p| = |\overline{Q_p}| = \frac{p-1}{2}$.

Proposición

Sea n y m dos números enteros positivos coprimos. Entonces un elemento $x \in \mathbb{Z}_{mn}$ es un residuo cuadrático si y sólo si $x \bmod m$ y $x \bmod n$ son residuos cuadráticos en \mathbb{Z}_m y \mathbb{Z}_n respectivamente.

Además, si a y b son raíces cuadradas de $x \bmod m$ y $x \bmod n$ en sus correspondientes anillos, podemos combinarlas mediante el Teorema Chino de los Restos para obtener una raíz cuadrada de x en \mathbb{Z}_{mn} .

En particular, esto es cierto cuando queramos estudiar los residuos cuadráticos en \mathbb{Z}_{pq} con p y q dos primos impares distintos, que son en particular coprimos.

Corolario

Definición (Símbolo de Legendre)

Dados un primo impar p y un entero a , se define el *Símbolo de Legendre* como

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & \text{si } a \equiv 0 \pmod{p} \\ 1, & \text{si } a \in Q_p \\ -1, & \text{si } a \in \overline{Q_p} \end{cases}$$

Definición (Símbolo de Jacobi)

Sea n un entero impar positivo cuya descomposición en factores primos es $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r}$ y sea a un entero. Entonces definimos el *símbolo de Jacobi* de a y n como

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right)^{e_1} \cdot \left(\frac{a}{p_2}\right)^{e_2} \cdots \left(\frac{a}{p_t}\right)^{e_t}$$

Observación

Un Símbolo de Jacobi -1 nos indica *no-residuo*, pero un 1 ya no indica necesariamente *residuo cuadrático*.

Nombre Problema de los residuos cuadráticos (QR).

Parámetros N un entero impar tal que $N = pq$ para p y q primos, y el entero x tal que $\left(\frac{x}{N}\right) = 1$.

Pregunta ¿Es x un residuo cuadrático en \mathbb{Z}_N ?

Pruebas Interactivas

Probador (P) computacionalmente *todopoderosa*.

Verificador (V) cómputo limitado, probabilístico de tiempo de polinomial.

Definición (Sistema de Prueba Interactiva)

Un problema de decisión Q tiene un *sistema de prueba interactiva* si tiene un protocolo de interacción polinomialmente acotado en número de mensajes que cumple:

- *Complejidad* Para toda instancia q Verdadera, del problema Q , V acepta q como Verdadera.
- *Robustez* Para cada instancia q Falsa, V rechaza la prueba de q con una probabilidad no menor que $\epsilon = 1 - n^{-c}$, para cualquier constante $c > 0$ y donde n es el tamaño de la instancia.

Definición

Denominamos clase de problemas **IP** (Interactivos en tiempo Polinomial) al conjunto de problemas de decisión para los que existe un sistema de prueba interactivo.

Teorema

$\text{NP} \subset \text{IP}$.

Demostración.

Sea Q un problema **NP**. Definimos el siguiente protocolo:

1. P resuelve la instancia del problema gracias a su capacidad de cómputo ilimitada y genera el certificado para V .
2. V recibe y verifica el certificado en tiempo polinomial. Si es válido, V acepta como *Verdadera* la instancia. Si no, rechaza la prueba.



Ejemplo Pruebas Interactivas: Problema QR

Teorema

El problema QR tiene un sistema de prueba interactivo.

Nombre Problema de los residuos cuadráticos (QR).

Parámetros N un entero impar tal que $N = pq$ para p y q primos, y el entero x tal que $\left(\frac{x}{N}\right) = 1$.

Pregunta ¿Es x un residuo cuadrático en \mathbb{Z}_N ?

Ejemplo Pruebas Interactivas: Problema QR

Prueba interactiva para QR (x, N)

Sea $t(n)$ un polinomio en n , el tamaño de la instancia (x, N) . P y V repiten $t(n)$ veces los siguientes pasos.

1. $P \rightarrow V$: $u \in_R \mathbb{Z}_N^{Q+}$, un residuo cuadrático en \mathbb{Z}_N .
2. $V \rightarrow P$: $b \in_R \{0, 1\}$.
3. $P \rightarrow V$: w , una raíz cuadrada aleatoria de $u \cdot x^b$.
4. V comprueba si:

$$w^2 \stackrel{?}{\equiv} \begin{cases} u \bmod N, & \text{si } b = 0 \\ xu \bmod N, & \text{si } b = 1. \end{cases}$$

Si la comparación falla, V termina en rechazo. En caso contrario, vuelve al paso 1.

Demostración.

La prueba es **completa**:

Instancia (x, N) *Verdadera* $\Rightarrow x$ es residuo cuadrático, existe raíz.

P computacionalmente todopoderoso \Rightarrow puede calcular w raíz de x o xu .

V acepta la prueba de P.



Ejemplo Pruebas Interactivas: Problema QR

Demostración.

La prueba es **robusta**:

Instancia *Falsa*, x no residuo cuadrático. P^* intenta adivinar el reto $b \in_R \{0, 1\}$.

- Si $b = 0$, sigue el protocolo, elige $u \in_R \mathbb{Z}_N^{Q+}$.
- Si $b = 1$, elige $u \equiv x^{-1}a^2 \pmod N$, con $a \in_R \mathbb{Z}_N$. Responde con $w = a$. V comprobará $w^2 \equiv a^2 \stackrel{?}{=} x \cdot x^{-1}a^2 \equiv a^2 \pmod N$.

Si P^* falla al adivinar, o no existirá raíz de xu , o $w^2 \not\equiv u \pmod N$.

Probabilidad de acertar el reto b : $\frac{1}{2}$.

Probabilidad de pasar la prueba: $2^{-t(n)}$.



Pruebas de Conocimiento Cero
