<u>ANTIBIÓTICOS</u>

CONVENIA INYECTABLE





INDICACIONES:

Antibiótico inyectable de acción prolongada para uso en caninos y felinos.

Perros: Para el tratamiento de las infecciones de la piel (incluyendo pioderma superficial secundario, heridas infectadas y abscesos), causadas por cepas susceptibles de Staphylococcus intermedius, Streptococcus canis (Grupo G), Escherichia coli y/o Pasteurella multocida. También está indicado para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario (cistitis) causadas por cepas susceptibles de Escherichia coli y Proteus mirabilis, así como para el tratamiento complementario de infecciones periodontales, causadas por cepas susceptibles de Escherichia coli y Proteus mirabilis.

Gatos: Para el tratamiento de infecciones de la piel (heridas y abscesos), causadas por cepas susceptibles de Pasteurella multocida e infecciones de tejidos blandos (heridas y abscesos), así como para el tratamiento de infecciones del tracto urinario asociadas con Escherichia coli.

INGREDIENTES:

Cada ml contiene: Cefovecin sódico equivalente a 80 mg de Cefovecin. Frasco de 4 ml.







CONSERVACIÓN

Almacenar en refrigeración entre 2°C y 8°C (36°F y 46°F) antes y después de reconstituir el producto en su caja original.



Dosis:

Se recomienda obtener una muestra para cultivo y pruebas de sensibilidad (cultivo y antibiograma), antes de comenzar la terapia antimicrobiana. CONVENIA® se debe administrar por vía subcutánea a una dosis de 8 mg/kg de peso corporal en gatos y perros. Para infecciones cutáneas y tejidos blandos en perros, se puede administrar una segunda aplicación subcutánea de 8 mg/kg 14 días después de la primera aplicación.

La decisión se tomará para cada animal de forma individual, considerando factores como el progreso hacia la resolución clínica, la susceptibilidad de los organismos causantes y la integridad de los mecanismos de defensa del hospedador.

SYNULOX TABLETAS





INDICACIONES:

Combinación antibacteriana en tabletas masticables, para perros y gatos. Tratamiento de enfermedades infecciosas en caninos y felinos producidas por microorganismos sensibles a la amoxicilina.



INGREDIENTES:

Amoxicilina (trihidrato) 200 mg. Ácido clavulánico(clavulanato potásico) 50 mg. Caja con contenido neto de 10 tabletas.

PRESENTACIÓN	P.V.P.
250 MG X 10	10,17



12,5 mg. de antibiótico/Kg. de peso vivo dos veces al día. Se administra por la boca a razón de una tableta por cada 20 kilos de peso, 2 veces al día y durante el periodo de tiempo que determine el médico veterinario.

