

## BRONCHICINE CAE



### INDICACIONES:

Extracto antigénico sin adyuvante obtenido a partir de células de Bordetella bronchiseptica, que se recomienda para la prevención y control de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (tos de las perreras) causada por el microorganismo mencionado.



### INGREDIENTES:

Células (antígeno) de Bordetella bronchiseptica 3 x 10<sup>8</sup>, cepa 78-9159, en 1 ml.  
Contenido neto: Caja con 50 dosis de frascos de 1 ml cada una.

### PRESENTACIÓN

CAJAS 50 X 1 DS

### P.V.P.

230,15



### Dosis:

Administrar 1ml vía subcutánea a cachorros a partir de las 8 semanas de edad. Debe aplicarse una segunda dosis de dos a cuatro semanas después. Se recomienda la revacunación anual.



### CONSERVACIÓN

Almacene entre 2°–8°C. No congelar el producto.

## VANGUARD PLUS CPV/CV



### INDICACIONES:

Vacuna contra Coronavirus y Parvovirus Canino. Virus inactivado y virus vivo modificado.

Vacuna para perros sanos como una ayuda en la prevención de la enteritis causada por el Coronavirus Canino y el Parvovirus Canino.

### INGREDIENTES:

Cada dosis de 1 ml de vacuna a la liberación contiene:  
Virus vivo modificado de Parvovirus canino cepa NL-35-D  $\geq$  107.2 TCID<sub>50</sub>.  
Virus Inactivado de Coronavirus canino cepa NL-18  $\geq$  1.49 RP.  
Contenido neto:  
Caja con 50 dosis de frascos de 1 ml cada una.

### PRESENTACIÓN

CAJA X 50

### P.V.P.

279,11



### Dosis:

Administre 1 ml vía subcutánea o intramuscular. Perros sanos de 6 semanas de edad o mayores deben recibir 3 dosis, administradas cada una a un intervalo de 3 semanas. Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.



### CONSERVACIÓN

Almacene verticalmente entre 2°–8°C. No congelar el producto.

## DEFENSOR 3



### INDICACIONES:

Vacuna preventiva de la Rabia en caninos y felinos. Para la vacunación de perros y gatos sanos de 12 semanas de edad o mayores como ayuda en la prevención de la rabia. Esta vacuna se prepara con virus de la rabia desarrollado en cultivo celular inactivado químicamente. La semilla viral es una cepa fija altamente inmunogénica del virus de la rabia procedente del aislamiento original de Louis Pasteur en 1882. El virus inactivado se formula con un adyuvante altamente purificado y se empaqueta en forma líquida.



### INGREDIENTES:

Cada ml contiene:  
Virus de la rabia cepa  
SVR-289 10<sup>7.35</sup> TCID<sub>50</sub>  
Excipientes c.s.p. 1 ml  
Contenido neto:  
Caja con 50 dosis de frascos de  
1 ml cada una.

### PRESENTACIÓN

1 ML CJA X 50

### P.V.P.

156,82



### CONSERVACIÓN

Almacene entre 2°-7°C.  
No congelar el producto.



### Dosis:

Administre asépticamente 1 ml por vía subcutánea. Los perros pueden ser vacunados vía subcutánea o intramuscular. **Primovacuna:** Administrar una sola dosis de 1 mL a las 12 semanas de edad o más en perros y gatos sanos. La dosis se debe repetir 1 año después. **Revacunación:** Se recomienda la posterior revacunación cada 3 años con una sola dosis.

## FELOCELL 3



### INDICACIONES:

Vacuna contra Rinotraqueítis, Calicivirus y Panleucopenia Felina (Virus Vivos Modificados). Para la vacunación de gatos sanos como una ayuda en la prevención de la Rinotraqueítis Viral Felina causada por el Virus Herpes Felino-1, la enfermedad respiratoria causada por el Calicivirus Felino y la Panleucopenia Felina causada por el Parvovirus Felino.



### INGREDIENTES:

Cada dosis contiene un mínimo de:  
10<sup>6.2</sup> TCID<sub>50</sub> de FRV  
10<sup>6.7</sup> TCID<sub>50</sub> de FCV  
10<sup>3.5</sup> TCID<sub>50</sub> de FPV  
Contenido neto:  
Caja con 50 dosis de frascos de  
1 ml cada una.

### PRESENTACIÓN

1DS CAJA X 25

### P.V.P.

160,49



### CONSERVACIÓN

Almacene entre 2°-8°C.  
No congelar el producto.



### Dosis:

Rehidratar el componente liofilizado con el componente líquido que se proporciona, agite bien y administre 1 ml subcutánea o intramuscularmente. Los gatos sanos de 12 semanas de edad o más deben recibir 2 dosis con un intervalo de 3 a 4 semanas. Si se vacunan antes de las 12 semanas se deberán revacunar cuando cumplan las 12 semanas de edad. Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

## FELOCELL FELV



### INDICACIONES:

Vacuna de Leucemia Felina Virus Muerto Biológico en suspensión. Para uso exclusivo en gatos



### INGREDIENTES:

Cada dosis a la liberación contiene:  
Virus de Leucemia Felina, línea celular FL-74,  
cepa Kawakami-Theilen  $\geq 1.25$  Potencia relativa  
Contenido neto:  
Caja con 25 viales x 1 ml más su diluyente

### PRESENTACIÓN

1DS 1ML 25CT

### P.V.P.

288,69



### CONSERVACIÓN

Almacene entre 2°-8°C  
No congelar el producto.



### Dosis:

Agite bien. En gatos sanos de 9 semanas de edad o mayores administrar la primera dosis (1 mL) por vía subcutánea y una segunda dosis (1 mL) con 3 a 4 semanas de diferencia. Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

**INDICACIONES:**

Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad y mayores como una ayuda en la prevención de enfermedades causadas por los virus de Distemper, CAV-1, CAV-2, Parainfluenza, Parvovirus, Coronavirus Canino, Leptospira canicola, L. grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae y L. pomona.

**INGREDIENTES:**

Cada dosis a la liberación contiene un mínimo de:  
 Virus del Distemper Canino cepa N-CDV 103.5TCID50  
 Adenovirus Canino tipo 2 cepa Manhattan 103.4 TCID50  
 Virus de la Parainfluenza Canina cepa NL-CPI-5 105.5TCID50  
 Parvovirus Canino cepa NL-35-D 107.2TCID50  
 Coronavirus Canino cepa NL-18 1,49 U. Relativas de Potencia  
 Leptospira canicola cepa C-51 600 (UN)  
 L. icterohaemorrhagiae cepa NADL 11403 600 (UN)  
 L. grippotyphosa cepa MAL 1540 600 (UN)  
 L. pomona cepa T262 600 (UN)  
 25 frascos de 1 dosis de vacuna, para rehidratar cada uno a 1 ml.  
 25 frascos de 1 ml de vacuna líquida para ser usado como diluyente.

**PRESENTACIÓN****P.V.P.**

CAJA X 25

173,06

**Dosis:**

Rehidrate asépticamente la vacuna liofilizada con líquido del vial provisto, agite bien y administre 1 ml vía subcutánea o intramuscular. Los perros deben recibir 3 dosis administradas a intervalos de 3 semanas. Para evitar la potencial interferencia maternal, los perros vacunados en las primeras 9 semanas de edad deben recibir 3 dosis, administradas separadamente a intervalos de 3 semanas cada una. Se recomienda revacunación anual con una sola dosis.

**CONSERVACIÓN**

Almacene verticalmente entre 2°–7°C. No congelar el producto

## VANGUARD PLUS 5 L4

**INDICACIONES:**

Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad y mayores como ayuda en la prevención de enfermedades causadas por los virus de Distemper, Adenovirus Canino Tipo 1 y 2, Parainfluenza, Parvovirus Canino, Leptospira canicola, L. grippotyphosa, L. icterohaemorrhagiae y L. pomona.

**INGREDIENTES:**

Cada dosis a la liberación contiene un mínimo de:  
 Virus del Distemper Canino cepa N-CDV 103.5TCID50  
 Adenovirus Canino tipo 2 cepa Manhattan 103.4 TCID50  
 Virus de la Parainfluenza Canina cepa NL-CPI-5 105.5TCID50  
 Parvovirus Canino cepa NL-35-D 107.2TCID50  
 Leptospira canicola cepa C-51 600 (UN)  
 L. icterohaemorrhagiae cepa NADL 11403 600 (UN)  
 L. grippotyphosa cepa MAL 1540 600 (UN)  
 L. pomona cepa T262 600 (UN)  
 Contenido neto:  
 25 frascos de 1 dosis de vacuna, para rehidratar cada uno a 1 ml.  
 25 frascos de 1 ml de gel estéril para ser usado como diluyente.

**PRESENTACIÓN****P.V.P.**

CAJA X 25

159,76

**Dosis:**

Rehidrate asépticamente la vacuna liofilizada con el gel estéril provisto, agite bien y administre 1 ml vía subcutánea o intramuscular. Los perros deben recibir 2 dosis administradas a intervalos de 3 semanas. Para evitar la potencial interferencia maternal, los perros vacunados en las primeras 9 semanas de edad deben recibir 3 dosis, administradas separadamente a intervalos de 3 semanas. Se recomienda revacunación anual con una sola dosis.

**CONSERVACIÓN**

Almacene verticalmente entre 2°–7°C. No congelar el producto.

## VANGUARD PLUS 5/CV-L



### INDICACIONES:

Para la vacunación de perros sanos como una ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por los virus del Distemper Canino, Adenovirus Canino Tipo 1, Adenovirus Canino Tipo 2, Parainfluenza Canina, Parvovirus Canino y Coronavirus Canino, *Leptospira canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*.

### INGREDIENTES:

#### Fracción liofilizada

Virus Distemper N-CDV  $\geq 103.5$  TCID<sub>50</sub> (Dosis Infecciosa de Cultivo de tejido)

Adenovirus Canino Tipo 2 Cepa Manhattan  $\geq 103.4$  TCID<sub>50</sub>

Parainfluenza Canina Cepa NL-CPI-5  $\geq 105.5$  TCID<sub>50</sub>

Parvovirus Canino Cepa NL-35-D  $\geq 107.2$  TCID<sub>50</sub>

*Leptospira canicola* Cepa C-51 600 (UN)

*L. icterohaemorrhagiae* Cepa NADL 11403 600 (UN)


#### Fracción Líquida (Diluyente)

Coronavirus canino Cepa NL-18  $\geq 1.49$  RP (Potencia Relativa).

Contenido neto:

25 frascos de 1 dosis de vacuna, rehidratar cada uno a 1 ml.

25 frascos de 1 ml de vacuna líquida para usarla como diluyente.



### PRESENTACIÓN

### P.V.P.

CAJA X 25

165,96



### Dosis:

Rehidrate asépticamente la vacuna liofilizada con la vacuna líquida que la acompaña, agite bien y administre 1 ml vía subcutánea o intramuscular. Los perros sanos de 6 semanas de edad o mayores deben recibir 3 dosis, con 3 semanas de intervalo entre cada una. Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.



### CONSERVACIÓN

Almacene de manera vertical entre 2°–7°C. No congelar el producto.

## VANGUARD PLUS 5/L



### INDICACIONES:

Para la inmunización de cachorros sanos de 6 o más semanas de edad, para la prevención del moquillo, hepatitis, enfermedad respiratoria por Adenovirus Tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus y Leptospirosis canina.

### INGREDIENTES:

#### Fracción liofilizada

Virus activos modificados de:

Moquillo canino cepa N-CDV  $\geq 103.5$  TCID<sub>50</sub>

Adenovirus Canino Tipo 2 cepa Manhattan  $\geq 103.4$  TCID<sub>50</sub>

Parainfluenza canina cepa NL-CPI-5  $\geq 105.5$  TCID<sub>50</sub>

Parvovirus canino cepa NL-35-D  $\geq 107.2$  TCID<sub>50</sub>

#### Fracción líquida

Bacterina de *Leptospira*: *Leptospira canicola*. 600 UN

*L. icterohaemorrhagiae* 600 UN

Contenido neto:

25 frascos de 1 dosis de vacuna.

25 frascos de 1 ml de vacuna líquida para usarla como diluyente.



### PRESENTACIÓN

### P.V.P.

CAJA X 25

136,68



### Dosis:

Rehidrate asépticamente la vacuna liofilizada con la vacuna líquida que la acompaña, agite bien y administre 1 ml vía subcutánea o intramuscular.

Vacunación primaria: Los perros sanos de 6 semanas de edad o mayores deben recibir 3 dosis, con 3 semanas de intervalo entre una y otra.

Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis



### CONSERVACIÓN

Almacene entre 2°–7°C. No congelar el producto.



**INDICACIONES:**

Para la vacunación de perros sanos como una ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por el virus del Distemper Canino, el Adenovirus Canino tipo 1, el Adenovirus Canino tipo 2, el virus de la Parainfluenza Canina, el Coronavirus Canino y el Parvovirus Canino.

**INGREDIENTES:**

Cada dosis de 1 ml de vacuna a la liberación contiene:  
Virus de Distemper canino, cepa N-CDV  $\geq 103.5$  TCID<sub>50</sub>  
Adenovirus canino tipo 2, cepa Manhattan  $\geq 103.4$  TCID<sub>50</sub>  
Virus de Parainfluenza canina, cepa NL-CPI-5  $\geq 105.5$  TCID<sub>50</sub>  
Parvovirus Canino, cepa NL-35-D  $\geq 107.2$  TCID<sub>50</sub>  
Coronavirus Canino, cepa NL-18  $\geq 1.49$  RP

Contenido neto:

25 frascos de 1 dosis de vacuna.

25 frascos de 1 ml de vacuna líquida para usarla como diluyente.

**PRESENTACIÓN**

CAJA X 25

**P.V.P.**

154,17

**Dosis:**

Rehidrate asépticamente la vacuna liofilizada con la vacuna líquida que la acompaña, agite bien y administre 1 ml vía subcutánea o intramuscular. Perros sanos de 6 semanas de edad o más deben recibir 3 dosis, administrando a intervalos de 3 semanas cada una. Se recomienda tla revacunación anual con una sola dosis.

**CONSERVACIÓN**

Almacene a 2°-8°C. Almacene verticalmente. No congele.