



ANTIBIÓTICOS

EMICINA LA



INDICACIONES:

Emicina LA es un antibiótico inyectable de amplio espectro y larga acción para el control y tratamiento de las enfermedades de los bovinos, ovinos y caprinos, causadas por bacterias sensibles a la oxitetraciclina.



INGREDIENTES:

Cada ml contiene:
Oxitetraciclina dihidrato.....215.6 mg
(equivalente a 200 mg de oxitetraciclina base)
Excipientes c.b.p. 1 ml

PRESENTACIÓN P.V.P.

20 cc	7,98
100 cc	26,32
250 cc	51,27



Dosis:

Intramuscular
1ml por cada 10 Kg de peso.
Ejemplo: Un toro de 880 libras deberá recibir 40 ml.



Periodo Retiro:

Bovinos: Leche 72 horas. Carne vía IM 16 días.
Carne vía SC 28 días.
Ovinos: Carne vía IM: 9 días.
Cabras: Carne vía IM: 9 días. Leche: 60 horas.



CONTRAINDICACIONES

No aplicar más de 20 ml en un mismo sitio de aplicación.

DRAXXIN



INDICACIONES:

Draxxin es un antibiótico inyectable indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades respiratorios como el complejo respiratorio bovino o la neumonía en porcinos provocada por bacterias sensibles a la tulatromicina.

INGREDIENTES:

Cada 1 ml contiene:
Tulatromicina.....100 mg
Monotioglicerol.....5 mg
Excipientes.....C.S.P.

PRESENTACIÓN

50 cc 197,58



Dosis:

Ganado bovino y porcino:
Administrar 1 ml por cada 40 Kg de peso corporal.



Periodo Retiro:

Bovino: Carne y vísceras: 18 días.
Leche: No usar en vacas en lactación porque deja residuos
Porcino: Carne y vísceras: 5 días.



FARMATIP SUGERENCIA TÉCNICA

Se sugiere su uso como metafilaxis ante el complejo respiratorio porcino en lechones a los días 21 (destete) y al día 70 (engorde) de vida.

**INDICACIONES:**

Excede Cattle es un antibiótico inyectable indicado para el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias sensibles al ceftiofur.

INGREDIENTES:

Cada ml de esta suspensión estéril lista para usar contiene:
Ceftiofur ácido libre cristalino equivalente a 200 mg de ceftiofur, en una suspensión a base de MiglyolR y aceite de semilla de algodón.

PRESENTACIÓN**P.V.P.**

100 cc

198,46

**Periodo Retiro:**

Carne: 13 días.

No se requiere periodo de retiro en leche.

**Dosis:**

Administrar una única inyección subcutánea en la parte dorsal próxima a la base de la oreja del ganado a razón de: 1 ml por cada 30 kg de peso.

**CONTRAINDICACIONES**

Está contraindicado en animales hipersensibles a la droga. Las penicilinas y cefalosporinas pueden causar reacciones alérgicas en individuos sensibles. La inyección en las arterias auriculares conlleva a la muerte súbita del animal.

Lapisa® SALUD ANIMAL



SULFATROPIN



INDICACIONES:

Sulfatropin es un antibiótico inyectable indicado en todas las especies animales en casos de enfermedades de los aparatos respiratorio, digestivo, genitourinario; septicemias, mastitis y pododermatitis asociadas a bacterias sensibles al Sulfametoxazol.

INGREDIENTES:

Sulfametoxazol 200 mg
Trimetoprim 40 mg
Vehículo c.b.p. 1 ml

PRESENTACIÓN

100 cc

23,35



Dosis:

Administrar mediante inyección intramuscular o subcutánea.

Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos Caninos y Felinos: aplicar 1 ml por cada 17 a 20 kg de peso corporal cada 24 horas.
Aves: Diluir 70 ml de Sulfatropin en 100 ml de solución salina fisiológica. De esta dilución, debe aplicar 1 ml por cada kg de peso corporal.

En equinos: administrar mediante inyección intravenosa lenta

✓ Periodo Retiro:

Carne: 28 días.

Leche: 3 días.

PYLOSIN 200



INDICACIONES:

Pylosin es un antibiótico inyectable indicado en todas las especies de animales para infecciones causadas por gérmenes sensibles a la fórmula como neumonía micoplásica, neumoenteritis, gabarro, metritis, mastitis, corynebacteriosis.

INGREDIENTES:

Cada ml contiene:
Tilosina base 200 mg
Vehículo c.b.p. 1 ml

PRESENTACIÓN

100 cc

21,75

250 cc

39,50



Dosis:

1ml por cada 20 kg de peso vivo cada 24 horas vía intramuscular o subcutánea.

✓ Periodo Retiro:

Carne: 21 días.

Leche: 3 días.



INDICACIONES:

Compol B es un complejo B inyectable indicada en deficiencias vitamínicas y épocas de sequías, ya que por la escasez de pastos verdes se disminuyen los niveles de vitaminas obtenidos en la dieta.



INGREDIENTES:

Cada 100 ml contiene:

Tiamina Clorhidrato (B1)	1000 mg
Riboflavina 5- fosfato (B2)	200 mg
Cianocobalamina (B 12)	10 mg
Pantenol (derivado B5)	1333 mg
Niacinamida (B3).....	2500 mg
Lidocaína Clorhidrato	250 mg
Alcohol Bencílico	1000 mg
Vehículo c.b.p.	100 ml

Bovinos y Equinos: 5 a 10 ml

Ovinos, Caprinos y Porcinos: 3 a 5 ml

Caninos y Felinos: 0.5 a 1 ml

Mediante inyección intramuscular, subcutánea e intravenosa.

PRESENTACIÓN

100 cc

10,20



Periodo Retiro:

No tiene.



INDICACIONES:

Compol ADE es un conjunto de vitaminas liposolubles de alta calidad indicadas para la mejora de rendimientos productivos y reproductivos causados por las deficiencias de las mismas vitaminas.

INGREDIENTES:

Cada ml contiene:

Vitamina A 500 000 U.I.

Vitamina D 375 000

U.I.

Vitamina E 50 U.I.



PRESENTACIÓN

100 cc

31,00



Periodo Retiro:

No tiene.



Dosis: Vía intramuscular, subcutánea o mezclado en el agua de beber administrándolo en una sola toma.

Bovinos

Becerros 2 ml
Adultos 5 ml

Equinos

Potros 2 ml
Adultos 5 ml

Ovinos y Caprinos

Corderos y cabritos 1 ml
Adultos 2 ml

Porcinos

Lechones 1 ml
Engorda y Cria 2 ml

Aves

Pollos de engorda, pollonas de reemplazo, gallinas ponedoras; reproductoras y gallos de pelea: 40-80 ml x 1000 L de agua de beber.



INDICACIONES:

Dectiver es una ivermectina inyectable de larga acción indicado para el control de parásitos internos y externos.

Cada ml contiene:
Ivermectina 10 mg
Vehículo c.b.p. 1 ml



PRESENTACIÓN

P.V.P.

100 ml	14,90
500 ml	31,50

Vía subcutánea, 1 ml por cada 50 kg de peso corporal.



Periodo Retiro:

Carne: 28 días.

Leche: No administrar en vacas productoras de leche porque deja residuos.



INDICACIONES:

MaxiBeef 40 es un implante anabólico hormonal que incrementa la ganancia de peso y mejora la eficiencia alimentaria en bovinos de carne. Su efecto es de hasta 120 días.

INGREDIENTES:

Cada implante contiene:
Acetato de trembolona 40 mg
Benozoato de estradiol 8 mg
Excipiente c.b.p. 2 comprimidos

PRESENTACIÓN

P.V.P.

CAJA X 20 IMPLANTES	63,00
---------------------	-------



Periodo Retiro:

No tiene.

Un implante (2 comprimidos) de 40 mg para cada bovino adulto implantados de forma subcutánea en el tercio medio de la parte posterior de la oreja.

FARMATIP SUGERENCIA TÉCNICA

Se sugiere usar en animales de entre 180 kg hasta los 350 kg de peso y que estén en pastoreo. Se sugiere que vaya acompañado de vitaminas y desparasitante.



INDICACIONES:

MaxiBeef 100 es un implante anabólico hormonal que incrementa la ganancia de peso y mejora la eficiencia alimentaria en bovinos de carne. Su efecto es de hasta 120 días.

INGREDIENTES:

Cada cartucho contiene 10 implantes que contienen:
Acetato de trembolona 100 mg
Benozoato de estradiol 14 mg
Excipiente c.b.p. 4 comprimidos

PRESENTACIÓN

P.V.P.

CAJA X 20 IMPLANTES	88,00
---------------------	-------



Periodo Retiro:

No tiene.



Un implante (cuatro comprimidos) de 100 mg para cada bovino adulto implantados de forma subcutánea en el tercio medio de la parte posterior de la oreja.



FARMATIP SUGERENCIA TÉCNICA

Se sugiere usar en animales mayores de 350 kg de peso vivo que estén en pastoreo. Se sugiere que vaya acompañado de vitaminas y desparasitante.

**INDICACIONES:**

Maxibeef es un implante anabólico hormonal que incrementa la ganancia de peso y mejora la eficiencia alimentaria en bovinos de carne. Su efecto es de hasta 120 días.

INGREDIENTES:

Cada cartucho contiene 10 implantes que contienen:
 Acetato de trembolona 140 mg
 Benzoato de estradiol 20 mg
 Excipiente c.b.p. 7 comprimidos

PRESENTACIÓN**P.V.P.**

CAJA X 20 IMPLANTES

108,00

**Dosis:**

Un implante (siete comprimidos) de 140 mg para cada bovino adulto implantados de forma subcutánea en el tercio medio de la parte posterior de la oreja.

**Periodo Retiro:**

No requiere periodo de retiro.

**FARMATIP SUGERENCIA TÉCNICA**

Se sugiere usar en animales mayores de 350 kg de peso vivo que estén en estabulado intensivo. Se sugiere que vaya acompañado de vitaminas y desparasitante.

PRIMECIN**INDICACIONES:**

Primecin es un antibiótico inyectable indicado para la prevención y tratamiento de las infecciones causadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y Mycoplasmas, así como en infecciones respiratorias, digestivas, septicémicas y genitourinarias, de bovinos y porcinos.

**INGREDIENTES:**

Cada ml contiene:
 Ciprofloxacina
 (Como Ciprofloxacina Clorhidrato) 75 mg
 Vehículo c.b.p. 1 ml

PRESENTACIÓN**P.V.P.**

100 cc

20,40

**Dosis:**

Bovinos: 1 ml por cada 30 kg de peso
 Cerdos: 1 ml por cada 20 kg de peso
 Vía intramuscular profunda.

**Periodo Retiro:**

Carne: 5 días

Leche: 2 días