

zoetis

ANTIMASTÍTICOS

CLAVAMOX LC



INDICACIONES:

Clavamox es una cánula intramamaria antimastática indicada para el tratamiento de infecciones mamarias agudas o crónicas de los bovinos en lactancia, causadas por agentes Gram positivos y negativos sensibles a la Amoxicilina y ácido clavulánico.

INGREDIENTES:

Amoxicilina trihidrato	0.200 g
Acido clavulánico	0.055 g
Prednisolona	0.010 g
Excipientes c.s.p.....	3g

PRESENTACIÓN

P.V.P.

4,5 cc x 12

37,07

Periodo Retiro:

Leche: 48 horas, (4 ordeños)

Carne: 7 días.



Dosis:

1 cánula por cada cuarto mamario (pezón) infectado cada 24 horas durante tres días consecutivos.



CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con historial conocido de alergia a los antibióticos B-lactámicos.

ORBENIN EXTRA DC



INDICACIONES:

Orbenin Extra es una cánula intramamaria ANTIMASTITICA indicada para el tratamiento de infecciones mamarias en SECADO, causadas por agentes gram positivos y negativos sensibles a la Cloxacilina.

INGREDIENTES:

Cloxacilina benzatínica	0,600 g.
Excipientes c.s.p.	3,6 g.

PRESENTACIÓN

P.V.P.

7 cc x 24

73,39

Periodo Retiro:

Carne y leche: 28 días



Dosis:

1 cánula por cada cuarto mamario (pezón) una sola vez después del último ordeño a fondo.



CONTRAINDICACIONES

No se recomienda su uso en vacas con períodos secos de 42 días o menos. A partir del parto solo se podrá usar la leche para consumo humano 96 hs después. No debe usarse en vacas en lactación.

**INDICACIONES:**

Teatseal es una cánula intramamaria indicado para la prevención de nuevas infecciones durante el periodo de seco. Puede utilizarse en vacas consideradas libres de mastitis subclínicas en vaca seca.

INGREDIENTES:

Composición por jeringa
Subnitrito de Bismuto 2,6 g
Excipientes c.s.p 4 g

PRESENTACIÓN**P.V.P.**

144 Jeringas de 4 g. cada una	316,04
UND X 7CC	2,19

**Dosis:**

1 cánula por cada cuarto mamario (pezón) una sola vez después del último ordeño a fondo.

**CONTRAINDICACIONES**

No usar en vacas en lactación.
No utilizar en vacas con mastitis clínicas al secado.

DESINFECTANTE**VANODINE****INDICACIONES:**

Vanodine es un desinfectante de tejidos vivos, ambientes y superficies a base de un complejo iodóforo indicado para cualquier tipo de desinfección.

INGREDIENTES:

Cada 100ml contiene:
Complejo iodo-nonilfenoxi-polietoxi-etanol (2.5% de iodo disponible) 21.95 g
Acido fosforico al 100% 12,48 g
Vehículo (agua, emulsionante y detergente), c.b.p. 100,00ml

PRESENTACIÓN**P.V.P.**

1 Litro	17,81
5 Litros	91,29
25 Litros	345,61

**Dosis:**

Desinfección de ubres, manos, pediluvios, construcciones y vehículos: 4 ml de Vanodine por cada Litro de agua.
Para baño y desinfección de animales: 2 ml de Vanodine por cada Litro de agua. Potabilizar agua de bebida: 0,5 ml de Vanodine por cada Litro de agua. Para lavado de alimentos como vegetales y huevos: 0,83 ml de Vanodine por cada Litro de agua.

SUEROS Y VITAMINAS**CALMAFOS****INDICACIONES:**

Calmafos es un suero mineral inyectable indicado para una rápida y efectiva provisión de calcio, fósforo, magnesio y dextrosa, para el tratamiento y prevención de hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia y cetosis, así como otras enfermedades nutricionales.

INGREDIENTES:

Cada 500 ml de solución inyectable contienen:
Gluconato de calcio (aporte de calcio 8.4 g) 90.60 g
Hidróxido de magnesio (aporte de magnesio 3.5 g) 8.50 g
Ácido hipofosforoso (aporta fosforo 4.8 g) 20.45 g
Dextrosa 82.50 g
Excipientes c.b.p / c.s.p 500 ml

PRESENTACIÓN**P.V.P.**

17,92

**Periodo Retiro:**

No posee periodo de retiro



Dosis: Bovinos y equinos: Aplicar 150 ml por cada 100 kg de peso.
Porcinos y ovinos: 50 a 125 ml vía intravenosa lenta.

**CONTRAINDICACIONES**

Si se detecta aumento de la frecuencia cardiaca o respiratoria durante el tratamiento, suspender o disminuir el ritmo de la aplicación hasta que los parámetros se normalicen.

ENDECTOCIDAS

DECTOMAX



INDICACIONES:

Dectomax es un endectocida a base de doramectina inyectable de larga acción indicado para el tratamiento y parásitos internos y externos como nemátodos, garrapatas, gusano de monte (nuchas), sarnas, piojos y moscas hematófagas.

INGREDIENTES:

Cada 100 ml contiene:
Doramectina 1 g

PRESENTACIÓN	P.V.P.
20 cc	12,97
50 cc	24,54
250 cc	89,80
500 cc	134,03

Dosis:

Administrar por vía intramuscular o subcutánea.
Bovinos: 1 ml cada 50 kg de peso corporal.
Ovinos: 1 ml cada 50 kg de peso corporal.
Porcinos: 1 ml cada 33 kg de peso corporal.



Periodo Retiro:

Bovinos carne: Hasta 50 días después del tratamiento.
Ovinos carne: Hasta 35 días después del tratamiento.
Cerdos carne: Hasta 28 días después del tratamiento.
Leche: No usar en animales productores de leche para consumo porque deja residuos.



FARMATIP SUGERENCIA TÉCNICA

Se sugiere su uso en protocolos de manejo contra nuche o gusano de monte, sobre todo en los meses de lluvias. Siempre debe ser precedido por un baño como impacto ourofino (7-10 días antes) para evitar el enquistamiento de las larvas de nuche.

VACUNAS

CATTLE MASTER GOLD FP 5 L5



INDICACIONES:

Cattle Master gold L5 es una vacuna múltiple inyectable de virus vivo termosensible indicada para la prevención y control de varias enfermedades virales reproductivas además de 5 tipos de Leptospirosis. Las enfermedades que cubre son: Rinotraqueitis Infectiosa Bovina (IBR), Virus Parainfluenza 3 (PI3), Virus de la Diarrea Viral Bovina (BVD) tipos 1 y 2; Virus Sincicial Respiratorio Bovino (RSV) y Leptospirosis.

INGREDIENTES:

Cada dosis de 5 ml contiene:

Fracción liofilizada:

Virus (IBR) cepa RLB 106 ≥106.8 TCID*50

Virus (PI3) cepa RLB 103 ≥105.8 TCID*50

Virus VRSB/ 375 ≥104.7 TCID*50

*TCID: Dosis infectante de cultivo de tejidos al 50%

Fracción líquida:

Cada dosis de 5 ml contiene:

Virus (DVB) Tipo I cepa citopática 5960 ≥5000 RU*

Virus (DVB) Tipo II cepa citopática 53637 ≥5000 RU*

L. canicola cepa C-51 ≥1200 NU*

L. gryppotyphosa cepa MAL 1540 ≥1200 NU*

L. hardjo cepa WHO ≥1200 NU*

L. icterohaemorrhagiae cepa NADL ≥1200 NU*

L. pomona cepa T262 ≥1200 NU*

*NU Unidades Nefelométricas, pre-inactivación.

PRESENTACIÓN

P.V.P.

25 Ds 124,95



Periodo Retiro: Carne: 21 días

Dosis:

Vía subcutánea

Primovacunación: Administrar 2 dosis de 5 ml c/u, con un intervalo de 3 semanas entre ambas vacunaciones. El manejo recomendado sobre todo para prevenir abortos y animales persistentes en terneros por BVD, se recomienda la primera dosis las 5 semanas antes del periodo de montas y el booster a las 2 semanas antes de las montas. Se recomienda la revacunación anual con dosis única de 3 a 4 semanas antes de las montas.

**INDICACIONES:**

Cattle Master es una vacuna múltiple inyectable de virus vivo termosensible indicada para la prevención y control de varias enfermedades virales reproductivas. Las enfermedades que cubre son: Rinotraqueitis Infectiosa Bovina (IBR), Virus Parainfluenza 3 (PI3), Virus de la Diarrea Viral Bovina (BVD) tipos 1 y 2 y Virus Sincicial Respiratorio Bovino (BRSV).

INGREDIENTES:

Cada dosis de 5 ml contiene:

Fracción liofilizada:

Virus (IBR) cepa RLB 106 ≥106.8 TCID*50

Virus (PI3) cepa RLB 103 ≥105.8 TCID*50

Virus VRSB/ 375 ≥104.7 TCID*50

*TCID: Dosis infectante de cultivo de tejidos al 50%

Fracción líquida:

Cada dosis de 5 ml contiene:

Virus (DVB) Tipo I cepa citopática 5960 ≥5000 RU*

Virus (DVB) Tipo II cepa citopática 53637 ≥5000 RU*

**PRESENTACIÓN****P.V.P.**

10 Ds

52.15



Periodo Retiro: Carne: 21 días

**Dosis:**

Primovacunación: Administrar 2 dosis de 5 ml c/u, con un intervalo de 3 semanas entre ambas vacunaciones.

Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con dosis única de 3 a 4 semanas antes de las montas.

ULTRACHOICE 8**INDICACIONES:**

Ultrachoice 8 es una vacuna bacterina-toxoides inyectable indicada para la prevención y control de enfermedades clostridiales como: pierna negra, edema maligno, hemoglobinuria bacilar, enfermedad negra, gangrena gaseosa, enterotoxemia y enteritis.

INGREDIENTES

Cultivos inactivados de clostridium chauvoei, septicum, haemolyticum, novyi sordelli y toxido clostridium perfringens tipo C y D.

Contiene stimugen, un adyuvante que permite aumentar y prolongar la respuesta inmune, minimizando las reacciones en el punto de inoculación.

**PRESENTACIÓN****P.V.P.**

1 L

47,00

**Dosis:**

Ganado bovino y ovino

Primovacunación: Administrar 2 dosis de 2 ml c/u, con un intervalo de 3 a 5 semanas entre ambas vacunaciones.

Revacunación: cada 6 meses.

**Periodo Retiro:**

No se administre este producto 21 días antes del sacrificio.