

ÀLGEBRA (2 hores)

P1.- Sigui el següent subconjunt de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$: $B = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid a - b + c + d = 0 \right\}$

- a) Demostrau que B és un subespai vectorial de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. 0.5 pt
- b) Trobau una base i la dimensió de B . 0.5 pt
- c) Trobau un conjunt A tal que $A \oplus B = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. 0.5 pt

P2.- Donada l'aplicació $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida com $f(x, y, z) = (x - 2y + z, y, z + x)$.

- a) Demostrau que és aplicació lineal. 0.25 pt
- b) Trobau $\text{Im} f$, $\text{Ker} f$ i la dimensió de cada un d'ells. 0.5 pt
- c) Indica si l'aplicació és un epimorfisme, un monomorfisme i/o un isomorfisme. 0.25 pt
- d) Calculau la matriu associada a l'aplicació en la base (inicial i final): $\{(0, 1, 1), (0, 2, 0), (1, -1, 0)\}$ 0.5pt
- e) És el vector $(1, 2, 1)$ un vector propi de l'aplicació? 0.5 pt

P3.- Calculau l'expressió general de A^n , on n és la matriu següent: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 1.5 pt

PROBABILITAT (2 hores)

P4.- Una empresa fabrica mobles econòmics però de baixa qualitat. S'ha determinat que el nombre de defectes en cada un dels panells de fusta emprats per a la fabricació dels mobles segueix una llei de Poisson de mitjana 0.2.

- a) Si examinem un panell, quina és la probabilitat que no tenguim cap defecte? 0.25 pt
- b) Si examinem 50 panells independents, quina és la probabilitat que cap d'ells tenguim defectes? 0.25 pt
- c) Si examinem un per un els panells fins a trobar-ne un de defectuós, quina és la probabilitat que el panell defectuós sigui el que fa 20? (suposam que els panells són independents entre si). 0.25 pt
- d) Si examinem un per un els panells fins a trobar-ne un de defectuós, quin és el nombre esperat de panells que és necessari examinar abans de trobar un defecte? (suposam que els panells són independents entre si). 0.5 pt
- e) Quina és la probabilitat que un panell tenguim dos o més defectes? 0.25 pt

P5.- La funció de densitat de probabilitat del temps d'error (en hores) d'un component electrònic és

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{1000} e^{-\frac{x}{1000}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

- a) Calculau la probabilitat que el component es torbi més de 3000 hores en fallar. 0.25 pt
- b) Calculau la probabilitat que el component falli en el lapse de temps comprès entre 1000 i 2000 hores. 0.25 pt
- c) Calculau la probabilitat que el component falli abans de 1000 hores. 0.25 pt
- d) Calculau el nombre d'hores que tardaran en fallar el 10% de tots els components. 0.5 pt
- e) Calculau la funció de distribució acumulada. 0.25 pt
- f) Obteniu la mitjana i la variància del temps de vida del component electrònic. 0.5 pt

P6.- Sigui X una variable aleatòria absolutament contínua amb funcions de densitat i distribució $f_X(x)$ i $F_X(x)$, respectivament. Es defineix una nova variable aleatòria $Y = X^2$. Trobar les funcions de densitat i distribució de Y en funció de les de X . 1.5 pt