

# Métodos Iterativos para la Resolución Numérica de Sistemas de Ecuaciones Lineales.

José Luis Ramírez B.

January 21, 2025

- 1 Introducción
- 2 Métodos Iterativos
- 3 Refinamiento Iterativo

# Problemas de los métodos directos para la resolución de (SL).

- El método de Gauss y sus variantes se conocen con el nombre de métodos directos: se ejecutan un número finito de pasos y dan a lugar a una solución que sería exacta si no fuese por los errores de redondeo.

# Problemas de los métodos directos para la resolución de (SL).

- El método de Gauss y sus variantes se conocen con el nombre de métodos directos: se ejecutan un número finito de pasos y dan a lugar a una solución que sería exacta si no fuese por los errores de redondeo.
- Cuando el tamaño de la matriz  $A$  es grande ( $n \gg 100$ ), la propagación del error de redondeo es también grande, y los resultados obtenidos pueden diferir de los exactos.

# Problemas de los métodos directos para la resolución de (SL).

- Muchas de las matrices que aparecen en (SL) poseen la mayoría de sus elementos nulos. Estas matrices reciben el nombre de matrices dispersas o sparse.

# Problemas de los métodos directos para la resolución de (SL).

- Muchas de las matrices que aparecen en (SL) poseen la mayoría de sus elementos nulos. Estas matrices reciben el nombre de matrices dispersas o sparse.
  - ① Si los elementos no nulos están distribuidos alrededor de la diagonal principal, son de aplicación todavía los métodos directos que conservan la estructura diagonal, como  $LU$ .

# Problemas de los métodos directos para la resolución de (SL).

- Muchas de las matrices que aparecen en (SL) poseen la mayoría de sus elementos nulos. Estas matrices reciben el nombre de matrices dispersas o sparse.
  - 1 Si los elementos no nulos están distribuidos alrededor de la diagonal principal, son de aplicación todavía los métodos directos que conservan la estructura diagonal, como  $LU$ .
  - 2 Si no ocurre lo anterior, al aplicar métodos directos se produce un fenómeno de llenado. Entonces, si no se realiza una adaptación de los métodos directos los resultados no van a ser, en general, buenos.

# Métodos Iterativo

- Un método iterativo que da resolución al sistema  $Ax = b$  es aquel que genera, a partir de un vector inicial  $x^{(0)}$ , una sucesión de vectores  $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$



# Métodos Iterativo

- Un método iterativo que da resolución al sistema  $Ax = b$  es aquel que genera, a partir de un vector inicial  $x^{(0)}$ , una sucesión de vectores  $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$
- El método se dirá que es consistente con el sistema  $Ax = b$ , si el límite de dicha sucesión, en caso de existir, es solución del sistema.

# Métodos Iterativo

- Un método iterativo que da resolución al sistema  $Ax = b$  es aquel que genera, a partir de un vector inicial  $x^{(0)}$ , una sucesión de vectores  $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$
- El método se dirá que es consistente con el sistema  $Ax = b$ , si el límite de dicha sucesión, en caso de existir, es solución del sistema.
- Se dirá que el método es convergente si la sucesión generada por cualquier vector inicial  $x^{(0)}$  es convergente a la solución del sistema.

# Métodos Iterativo

- Un método iterativo que da resolución al sistema  $Ax = b$  es aquel que genera, a partir de un vector inicial  $x^{(0)}$ , una sucesión de vectores  $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$
- El método se dirá que es consistente con el sistema  $Ax = b$ , si el límite de dicha sucesión, en caso de existir, es solución del sistema.
- Se dirá que el método es convergente si la sucesión generada por cualquier vector inicial  $x^{(0)}$  es convergente a la solución del sistema.
- El vector  $r^{(k)} = b - Ax^{(k)}$  es el vector residual obtenido en la  $k$ -ésima iteración.

# Métodos Iterativo

Si un método es convergente es consistente, sin embargo, el recíproco no es cierto.

# Métodos Iterativo

Si un método es convergente es consistente, sin embargo, el recíproco no es cierto.

## Ejemplo:

El método  $x^{(n+1)} = 2x^{(n)} - A^{-1}b$  es consistente con el sistema  $Ax = b$  pero no es convergente. En efecto:

## Métodos Iterativo

$$\begin{aligned}x^{(n+1)} - x &= 2x^{(n)} - A^{-1}b - x = 2x^{(n)} - 2x - A^{-1}b + x \\&= 2(x^{(n)} - x) - (A^{-1}b - x)\end{aligned}$$

y como  $A^{-1}b = x$ , se tiene que:

$$x^{(n+1)} - x = 2(x^{(n)} - x)$$

## Métodos Iterativo

$$\begin{aligned}x^{(n+1)} - x &= 2x^{(n)} - A^{-1}b - x = 2x^{(n)} - 2x - A^{-1}b + x \\&= 2(x^{(n)} - x) - (A^{-1}b - x)\end{aligned}$$

y como  $A^{-1}b = x$ , se tiene que:

$$x^{(n+1)} - x = 2(x^{(n)} - x)$$

Si existe  $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)} = x^*$ , se tiene que:

$$x^* - x = 2(x^* - x) \Rightarrow x^* - x = 0 \Rightarrow x^* = x$$

es decir, el límite es solución del sistema  $Ax = b$ , por lo que el método es consistente.

# Métodos Iterativo

Sin embargo, de  $x^{(n+1)} - x = 2(x^{(n)} - x)$  se obtiene que:

$$\|x^{(n+1)} - x\| = 2\|x^{(n)} - x\|$$

es decir, el vector  $x^{(n+1)}$  dista el doble de lo que distaba  $x^{(n)}$ , por lo que el método no puede ser convergente.



# Refinamiento Iterativo

- Al resolver un sistema de ecuaciones  $Ax = b$  utilizando un método numérico se obtiene una aproximación  $\tilde{x}$  de la verdadera solución del sistema.

## Refinamiento Iterativo

- Al resolver un sistema de ecuaciones  $Ax = b$  utilizando un método numérico se obtiene una aproximación  $\tilde{x}$  de la verdadera solución del sistema.
- La exactitud de dicha solución depende de errores inherentes a los cálculos realizados.

## Refinamiento Iterativo

- Al resolver un sistema de ecuaciones  $Ax = b$  utilizando un método numérico se obtiene una aproximación  $\tilde{x}$  de la verdadera solución del sistema.
- La exactitud de dicha solución depende de errores inherentes a los cálculos realizados.
- Sea  $x$  la solución exacta del sistema y  $\tilde{x}$  es la aproximación, por lo tanto cuando se sustituye  $\tilde{x}$  en el sistema se obtiene:

$$A\tilde{x} \approx b$$

esto significa que al realizar la resta  $b - A\tilde{x} \neq 0$

## Refinamiento Iterativo

- Definiendo a esta diferencia  $r$  (residuo), así  $r = b - A\tilde{x}$ .

## Refinamiento Iterativo

- Definiendo a esta diferencia  $r$  (residuo), así  $r = b - A\tilde{x}$ .
- La solución deseada es de la forma  $\tilde{x} + z$  tal que al sustituir en el sistema de ecuaciones se obtenga

$$A(\tilde{x} + z) = b$$

y desarrollando se obtiene

## Refinamiento Iterativo

- Definiendo a esta diferencia  $r$  (residuo), así  $r = b - A\tilde{x}$ .
- La solución deseada es de la forma  $\tilde{x} + z$  tal que al sustituir en el sistema de ecuaciones se obtenga

$$A(\tilde{x} + z) = b$$

y desarrollando se obtiene

$$A(\tilde{x} + z) = b$$

## Refinamiento Iterativo

- Definiendo a esta diferencia  $r$  (residuo), así  $r = b - A\tilde{x}$ .
- La solución deseada es de la forma  $\tilde{x} + z$  tal que al sustituir en el sistema de ecuaciones se obtenga

$$A(\tilde{x} + z) = b$$

y desarrollando se obtiene

$$A(\tilde{x} + z) = b$$

$$A\tilde{x} + Az = b$$

## Refinamiento Iterativo

- Definiendo a esta diferencia  $r$  (residuo), así  $r = b - A\tilde{x}$ .
- La solución deseada es de la forma  $\tilde{x} + z$  tal que al sustituir en el sistema de ecuaciones se obtenga

$$A(\tilde{x} + z) = b$$

y desarrollando se obtiene

$$A(\tilde{x} + z) = b$$

$$A\tilde{x} + Az = b$$

$$Az = b - A\tilde{x}$$



## Refinamiento Iterativo

- Definiendo a esta diferencia  $r$  (residuo), así  $r = b - A\tilde{x}$ .
- La solución deseada es de la forma  $\tilde{x} + z$  tal que al sustituir en el sistema de ecuaciones se obtenga

$$A(\tilde{x} + z) = b$$

y desarrollando se obtiene

$$A(\tilde{x} + z) = b$$

$$A\tilde{x} + Az = b$$

$$Az = b - A\tilde{x}$$

$$Az = r$$

## Refinamiento Iterativo

- Definiendo a esta diferencia  $r$  (residuo), así  $r = b - A\tilde{x}$ .
- La solución deseada es de la forma  $\tilde{x} + z$  tal que al sustituir en el sistema de ecuaciones se obtenga

$$A(\tilde{x} + z) = b$$

y desarrollando se obtiene

$$A(\tilde{x} + z) = b$$

$$A\tilde{x} + Az = b$$

$$Az = b - A\tilde{x}$$

$$Az = r$$

- Una vez que obtenida  $z$  se puede crear una mejor aproximación  $\tilde{x} + z$  de la solución.

## Ejemplo:

Al resolver el sistema  $Ax = b$  donde

$$A = \begin{bmatrix} 60 & 30 & 20 \\ 30 & 20 & 15 \\ 20 & 15 & 12 \end{bmatrix} \quad y \quad b = \begin{bmatrix} 110 \\ 65 \\ 47 \end{bmatrix}$$

suponiendo que una solución aproximada es  $b = \begin{bmatrix} 0.9 \\ 0.8 \\ 1.2 \end{bmatrix}$

## Ejemplo:

- Aplicando un paso de refinamiento iterativo tomando  $tol = 10^{-5}$ , se tendría que:

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.9 \\ 0.8 \\ 1.2 \end{bmatrix}$$

## Ejemplo:

- Aplicando un paso de refinamiento iterativo tomando  $tol = 10^{-5}$ , se tendría que:

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.9 \\ 0.8 \\ 1.2 \end{bmatrix}$$

- Calculando el residuo  $r^{(0)} = b - Ax^{(0)} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 2.6 \end{bmatrix}$

## Ejemplo:

- Aplicando un paso de refinamiento iterativo tomando  $tol = 10^{-5}$ , se tendría que:

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.9 \\ 0.8 \\ 1.2 \end{bmatrix}$$

- Calculando el residuo  $r^{(0)} = b - Ax^{(0)} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 2.6 \end{bmatrix}$
- Verificando criterio de parada  $\|r^{(0)}\|_{\infty} = 8 > tol$

## Ejemplo:

- Obteniendo  $z$  resolviendo el sistema  $Az = r$  se obtiene

$$z = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ -0.2 \end{bmatrix}$$

## Ejemplo:

- Obteniendo  $z$  resolviendo el sistema  $Az = r$  se obtiene

$$z = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ -0.2 \end{bmatrix}$$

- Generando la nueva aproximación

$$x^{(1)} = x^{(0)} + z = \begin{bmatrix} 0.9 \\ 0.8 \\ 1.2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ -0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$



## Ejemplo:

- Obteniendo  $z$  resolviendo el sistema  $Az = r$  se obtiene

$$z = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ -0.2 \end{bmatrix}$$

- Generando la nueva aproximación

$$x^{(1)} = x^{(0)} + z = \begin{bmatrix} 0.9 \\ 0.8 \\ 1.2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ -0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Calculando el residuo  $r^{(0)} = b - Ax^{(0)} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 2.6 \end{bmatrix}$

# Métodos Iterativo

Un métodos iterativo es estacionarios cuando la transición de  $x^{(k)}$  a  $x^{(k+1)}$  no depende de la historia anterior:

- **Métodos Estacionarios:**  $x^{(k+1)} = f(x^{(k)})$
- **Métodos no Estacionarios:**  
 $x^{(k+1)} = f(x^{(k)}, x^{(k-1)}, x^{(k-2)}, \dots)$