


A partir de los metamielocitos, la maduración es diferente:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Metamielocito neutrófilo: <u>gránulos neutros</u> | 1. Metamielocito eosinófilo: <u>gránulos grandes con cuerpo cristaloides</u> | 1. Metamielocito basófilo: <u>gránulos basófilos metacromáticos</u> |
| 2. Neutrófilo en cayado: <u>núcleo cóncavo en forma de C/V</u> | 2. Eosinófilo en cayado | 2. Basófilo en cayado |
| 3. Neutrófilo maduro o segmentado: <u>núcleo lobulado</u> | 3. Eosinófilos: <u>núcleo bilobulado</u> | 3. Basófilo: <u>núcleo en S</u> |

5. MONOCITOPOYESIS

1. **CFU-GM:** célula madre bipotencial
2. **Monoblastos**
3. **Promonocitos:** división rápida, los más abundantes
4. **Monocitos:** permanecen en médula ósea menos de 24 horas
5. **Macrófagos:** en tejido conjuntivo.




6. TROMBOPOYÉSIS

1. **Célula madre mieloide multipotencial (CFU-GEMM)**
2. **CFU-Meg** (estimulada por GM-CSF e IL-3)
3. **Megacarioblasto** (megacariocitoblasto): célula grande, 30 μm , núcleo no lobulado, se dan endomitosis sucesivas por acción de la trombapoyetina (de modo que tienen entre 8n y 64n).
4. **Megacariocito:** células grandes (50-70 μm) con canales de demarcación plaquetaria
5. **Plaquetas**

7. LINFOPOYÉSIS

1. **Célula madre hematopoyética pluripotencial común (CMHP)**
 - a. **CFU-Linf:** célula madre linfóide multipotencial
 - i. **CFU precursora de linfocitos T:** se dirige al timo. En la corteza del timo, se produce la proliferación, diferenciación y selección positiva (se seleccionan los que se activan cuando ven antígenos extrínsecos) y en la médula del timo, se produce selección negativa (se les presentan autoantígenos y si los reconocen se induce la apoptosis).
 - ii. **CFU precursora de linfocitos B:** maduran en la médula ósea o en órganos
 - iii. **CFU precursora de linfocitos NK**



TEMA 26: BASES CELULARES DE LA RESPUESTA INMUNE

😊😊😊😊😊 Este tema Nacho se lo saltó 😊😊😊😊😊