PROTOCOLO GTPS. SÍNDROME DE DOLOR TROCÁNTER MAYOR.

El dolor de cadera es un síntoma inespecífico y mal definido, relativamente frecuente como motivo de consulta; implica un amplio diagnóstico diferencial entre diferentes patología intro-articular, tejidos peri-articulares e incluso puede ser un dolor referido de la columna lumbar. El tratamiento de primera elección es una pauta de ejercicios encaminados a mejorara la estabilidad de la articulación.

Recomendaciones generales

- Realizar los ejercicios de forma lenta y controlada, coordinando los ejercicios con al respiración
- Hacerlos en una superficie plana, si puede ser, delante de un espejo para evitar las malas posturas
- 10-15 repeticiones, 2 veces al día
- Al finalizar los ejercicios, aplicar durante 10 minutos gel en al zona de la cadera

1. Estiramiento isométrico de glúteos: apretar el glúteo al máximo, mantener 3 segundos y descansar.



2. Elevación de pelvis: levantar la pelvis hasta alinearla con la piernas, mantener 3-5 segundos y descansar



3. Isométricos de aductores: en la posición indicada, poner un cojín o pelota entre las piernas y apretar, mantener 3-5 segundos y descansar.

4. Trabajar glúteo medio: de lado, levantar la pierna unos 20 cm, mantener 5 segundos y descansar

5. Extensión de la pierna: de pie, llevar la pierna hacia atrás, sin girar la pelvis ni el tronco, mantener 5 segundos y descansar. Se puede colocar un peso de 1 kg en el tobillo si se tolera.

6. Trabajar el glúteo: de pie, llevar la pierna hacia el lado, manteniendo el tronco recto y sin desplazar la pelvis, mantener 5 segundos y descansar. Se puede colocar un peso de 1 kg en el tobillo si se tolera.

7. Sentadilla: apoyar la espalda en la pared, deslizarse como si fuésemos a sentarnos en un taburete, mantener la posición 5 segundos y volver a la posición inicial, poner una pelota entre las piernas y no dejar que se caiga.

8. Estiramiento del psoas y recto anterior: poner una pierna atrás, en esta posición avanzar la rodilla que está delante para notar cómo estira la parte anterior de la cadera contraria, aguantar 20 segundos y descansar. Repetir 5 veces.

9. Estiramiento banda iliotibial: cruzar pierna sana por delante de la que está dolorida. Inclinar el tronco hacia el lado sano manteniendo los brazos por encima de la cabeza. Aguantar la postura 20 segundos y descansar. Repetir 5 veces.

10. Estiramiento glúteo medio: en posición estirado, flexionar la cadera afecta y llevar la rodilla hacia la esquina contraria. Aguantar 20 segundos y descansar. Repetir 5 veces.



11. Estiramiento del glúteo mayor: en posición estirado, flexión la cadera afecta y llevar la rodilla hacia el pecho. Aguantar 20 segundos y descansar. Se puede realizar con la pierna contralateral estirada o flexionada. Repetir 5 veces.

12. Estiramiento piramidal: poner la pierna afecta sobre la rodilla contraria; agarrar el muslo de la pierna sana y llevar la pierna hacia el pecho. Aguantar 20 segundos y descansar. Repetir 5 veces.



13. Estiramiento cuádriceps: flexionar la rodilla, coger el pie y llevar el pie hacia el glúteo, evitando la inclinación del cuerpo. Aguantar 20 segundos y descansar. Repetir 5 veces.