# Statistique inférentielle

## Chapitre 17 : L'analyse de la variance

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 22 octobre 2026

# Plan du chapitre

Pourquoi un outil de plus

La décomposition

Le rapport de Fisher

L'application

Ce que l'ANOVA ne dit pas

S'entraîner

Ce qu'il faut retenir

# Pourquoi un outil de plus

**Le diplôme influence-t-il le salaire ?**

Dans l'échantillon de $50$ salariés : $20$ Bac, payés en moyenne $6\,217$ dirhams ; $17$ Bac+2, à $6\,869$ ; $13$ Bac+5, à $8\,398$.

Les trois moyennes diffèrent. Ces écarts reflètent-ils des écarts réels dans l'entreprise, ou le seul hasard du tirage ?

**Trois groupes, et non plus deux**

Le test de Welch du chapitre 16 compare **deux** moyennes. Avec trois groupes, la tentation est de l'appliquer trois fois.

C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire.

## Trois groupes, trois comparaisons

Bac contre Bac+2, Bac+2 contre Bac+5, Bac contre Bac+5. Trois tests à $5\,\%$ chacun.

$$P(\text{au moins un rejet à tort}) \approx 1 - (0{,}95)^3 = 0{,}143$$

Le risque réel n'est plus $5\,\%$ mais $14\,\%$ ; $40\,\%$ avec cinq groupes (dix comparaisons).

## La solution

Un **test unique**, portant sur les trois moyennes à la fois :


$$H_0 : m_1 = m_2 = m_3 \qquad H_1 : \text{au moins une diffère}$$

Le risque annoncé redevient le risque réel.

# La décomposition

# Ce que l'ANOVA regarde

deux dispersions : celle des moyennes de groupe, et celle autour de chacune



## La décomposition, déjà vue en descriptive

$$\underbrace{\text{SCT}}_{\text{variation totale}} = \underbrace{\text{SCE}}_{\text{entre les groupes}} + \underbrace{\text{SCR}}_{\text{à l'intérieur}}$$

$$\text{SCT} = \sum_{i,j}(x_{ij} - \overline{x})^2 \qquad \text{SCE} = \sum_{i} n_i(\overline{x}_i - \overline{x})^2 \qquad \text{SCR} = \sum_{i,j}(x_{ij} - \overline{x}_i)^2$$

## Le nom du test est trompeur

On appelle cela « analyse de la variance », et l'on y compare pourtant des **moyennes**.

La raison est dans la figure : si les moyennes de groupe s'écartaient peu, la dispersion entre elles serait faible devant la dispersion interne. **C'est en comparant deux dispersions qu'on juge des moyennes.**

## Chaque groupe pèse selon son effectif

Avec $\overline{x} = 7\,005{,}80$ :

| Groupe | $n_i$ | $\overline{x}_i$ | $\overline{x}_i - \overline{x}$ | $n_i(\overline{x}_i - \overline{x})^2$ |
|---|---|---|---|---|
| Bac | $20$ | $6\,217{,}00$ | $-788{,}80$ | $12\,444\,109$ |
| Bac+2 | $17$ | $6\,869{,}41$ | $-136{,}39$ | $316\,230$ |
| Bac+5 | $13$ | $8\,397{,}69$ | $+1\,391{,}89$ | $25\,185\,735$ |
| SCE | | | | $37\,946\,073$ |

## Les Bac+5 font l'essentiel

Deux tiers de SCE viennent du groupe Bac+5, le plus éloigné de la moyenne générale, bien qu'il soit le moins nombreux.

Les Bac+2, presque à la moyenne, ne contribuent pratiquement pas.

## La dispersion à l'intérieur de chaque groupe

$\sum_j (x_{ij} - \overline{x}_i)^2 = (n_i - 1)\, s_i^2$ :

| Groupe | $n_i$ | $s_i$ | $(n_i - 1)\, s_i^2$ |
|---|---|---|---|
| Bac | 20 | 2 163,87 | 88 964 620 |
| Bac+2 | 17 | 1 838,38 | 54 074 294 |
| Bac+5 | 13 | 2 368,07 | 67 292 831 |
| **SCR** | | | 210 331 745 |

## La vérification

SCT $= (n - 1)\, s^2 = 49 \times 2\,250{,}98^2 = 248\,277\,818$.

Et $37\,946\,073 + 210\,331\,745 = 248\,277\,818$ : la décomposition tombe juste, au dirham carré près.

# Le rapport de Fisher

## La statistique de test

$$F = \frac{\text{SCE}/(k-1)}{\text{SCR}/(n-k)} \sim \text{Fisher à } (k-1) \text{ et } (n-k) \text{ degrés de liberté}$$

où $k$ est le nombre de groupes et $n$ l'effectif total.

## Pourquoi cette forme

On divise chaque somme de carrés par son nombre de degrés de liberté — la règle du chapitre 3, appliquée deux fois.

Sous $H_0$, les deux quantités estiment la même variance résiduelle : leur rapport vaut environ $1$. Un $F$ nettement supérieur à $1$ signale que les moyennes diffèrent.

**Ils s'additionnent, comme les sommes de carrés**

| Source | SC | ddl | Pourquoi |
|---|---|---|---|
| entre | SCE | $k-1$ | $k$ moyennes liées par la moyenne générale |
| résiduelle | SCR | $n-k$ | $n$ écarts, $k$ moyennes estimées |
| totale | SCT | $n-1$ | $n$ écarts, une moyenne estimée |

**Sur notre échantillon**

$k = 3$, $n = 50$ : $2 + 47 = 49$.

Le seuil se lit dans la table de Fisher à $2$ et $47$ degrés de liberté : $F_{0,95} = 3{,}20$, $F_{0,99} = 5{,}09$.

# L’application

## Ce que tout logiciel affiche


| Source | Somme de carrés | ddl | Carré moyen | $F$ |
|---|---|---|---|---|
| Entre (SCE) | $37\,946\,073$ | $2$ | $18\,973\,037$ | $4{,}24$ |
| Résiduelle (SCR) | $210\,331\,745$ | $47$ | $4\,475\,144$ | |
| **Totale** | $248\,277\,818$ | $49$ | | |

## Lire le tableau en une phrase

La variance « entre » ($18{,}97$ millions) est $4{,}24$ fois plus grande que la variance « à l'intérieur » ($4{,}48$ millions).

Si le diplôme n'avait aucun effet, ces deux nombres seraient du même ordre.

notre $F = 4{,}24$ dépasse le seuil de 3,20 : $p = 0{,}020$




valeur de $F$ si $H_0$ est vraie : loi de Fisher à 2 et 47 degrés de liberté

## Le résultat

$$F = \frac{18\,973\,037}{4\,475\,144} = 4{,}24 \qquad \text{contre un seuil de } 3{,}20$$

$p = 0{,}020$ : **on rejette** $H_0$ au seuil de $5\,\%$ (mais pas à $1\,\%$). Les salaires moyens diffèrent selon le diplôme.

## Le rapport de corrélation, et ce qu'il ajoute

$$\eta^2 = \frac{\text{SCE}}{\text{SCT}} = \frac{37\,946\,073}{248\,277\,818} = 0{,}153$$

Dans l'échantillon, le diplôme explique $15\,\%$ de la dispersion des salaires. Le test dit que l'effet existe ; $\eta^2$ dit quelle part il représente.

# Ce que dit la population

## La vérité, que l'on connaît ici

| Diplôme | Effectif | Salaire moyen |
|---|---|---|
| Bac | $219$ | $6\,058{,}90$ |
| Bac+2 | $174$ | $7\,080{,}75$ |
| Bac+5 | $107$ | $9\,534{,}39$ |

$\eta^2 = 869\,847\,811 / 3\,375\,060\,986 = 0{,}258.$

## Le rejet était juste, l'échantillon sous-estimait

Les moyennes diffèrent bien dans la population : $H_0$ est fausse, et le test l'a vu.

Mais notre échantillon donnait $\eta^2 = 0{,}153$ pour une vraie valeur de $0{,}258$, et un écart Bac / Bac+5 de $2\,181$ dirhams pour un vrai de $3\,475$. Un rapport de corrélation calculé sur $50$ personnes est **une estimation**, et fort imprécise.

**Le même test sur les dix échantillons systématiques**

| $r$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $F$ | 4,2 | 9,3 | 9,6 | 4,2 | 7,0 | 17,4 | 12,9 | 13,3 | 14,2 | 4,6 |
| $\eta^2$ | 0,15 | 0,28 | 0,29 | 0,15 | 0,23 | 0,43 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,16 |

**Dix rejets, mais un effet mal mesuré**

Les dix échantillons rejettent $H_0$ : l'effet du diplôme est assez fort pour être vu à $n = 50$. Par simulation, la puissance vaut $0{,}94$.

Mais $\eta^2$ va de $0{,}15$ à $0{,}43$ autour de la vraie valeur $0{,}26$. Notre échantillon ($r = 0$) était l'un des **moins** favorables.

# Ce que l’ANOVA ne dit pas

**Laquelle diffère ?**

« Au moins une moyenne diffère » : l'ANOVA ne dit pas laquelle, ni de combien.

Pour le savoir, on compare ensuite les groupes deux à deux — mais avec un **seuil corrigé**, sinon on retombe dans le problème des tests multiples.

**Les comparaisons deux à deux, avec Bonferroni**

Trois comparaisons : on multiplie chaque $p$-value par $3$ (ou l'on compare à $0{,}05/3 = 0{,}0167$).

**Trois tests de Welch, corrigés**

| Comparaison | Écart | $t$ | $p$ | $p$ corrigée |
|---|---|---|---|---|
| Bac / Bac+2 | $-652$ | $-0{,}99$ | $0{,}33$ | $0{,}98$ |
| Bac / Bac+5 | $-2\,181$ | $-2{,}67$ | $0{,}013$ | $0{,}040$ |
| Bac+2 / Bac+5 | $-1\,528$ | $-1{,}93$ | $0{,}067$ | $0{,}20$ |

**La lecture**

Seul l'écart Bac / Bac+5 reste significatif après correction. Avec $50$ personnes, l'échantillon ne permet pas de séparer les Bac+2 de leurs voisins.

Dans la population, les trois écarts sont réels ($1\,022$, $3\,475$ et $2\,454$ dirhams) : là encore, **non significatif ne veut pas dire nul**.

## Trois conditions

1. Échantillons **indépendants**.
2. Population **normale** dans chaque groupe — ou effectifs suffisants.
3. Variances **comparables** entre groupes.

## Ce que coûte la troisième, sur nos salaires

Dans la population, l'écart-type des Bac+5 ($2\,872$) dépasse celui des autres groupes (environ $2\,030$), et c'est le plus petit groupe.

On simule $5\,000$ échantillons de $50$ dans une population où l'on a **égalisé les moyennes** : l'ANOVA rejette à tort dans $7{,}7\,\%$ des cas, pour $5\,\%$ annoncés.

**La version qui ne suppose pas l'égalité des variances**

Comme pour deux groupes, il existe une version de Welch de l'ANOVA. Elle pondère chaque groupe par l'inverse de sa variance et ajuste les degrés de liberté.

Dans la même simulation, son risque réel est de $6{,}2\,\%$.

**Sur notre échantillon**

ANOVA de Welch : $F = 3{,}51$ avec $2$ et $28{,}2$ degrés de liberté, $p = 0{,}044$.

La conclusion à $5\,\%$ est la même, mais plus fragile : $p$ passe de $0{,}020$ à $0{,}044$.

**Quand $k = 2$, $F = t^2$**

Avec deux groupes, l'ANOVA est exactement le test $t$ à variances égales du chapitre 16 : $F = t^2$, et les deux $p$-values coïncident.

**Hommes et femmes**

Test $t$ à variances égales : $t = 0{,}825$, $p = 0{,}414$.

ANOVA à deux groupes : $F = 0{,}680 = 0{,}825^2$, $p = 0{,}414$. **L'ANOVA généralise le test $t$**, elle ne le remplace pas.

# S’entraîner

# Exercice 1 : compléter un tableau

**Quatre méthodes de vente**

On compare le chiffre d'affaires de $40$ commerciaux répartis en $4$ groupes, un par méthode de vente. On obtient SCE $= 600$ et SCR $= 1\,800$.

1. Compléter le tableau d'analyse de la variance.
2. Conclure au seuil de $5\,\%$ ($F_{0,95\,;3\,;36} = 2{,}87$).
3. Calculer et interpréter $\eta^2$.

**Degrés de liberté, carrés moyens, F**

1. ddl $3$, $36$ et $39$ ; carrés moyens $600/3 = 200$ et $1\,800/36 = 50$ ; $F = 200/50 = 4{,}00$.
2. $4{,}00 > 2{,}87$ : on rejette $H_0$ ($p = 0{,}015$). Au moins une méthode donne un chiffre d'affaires moyen différent.
3. $\eta^2 = 600/2\,400 = 0{,}25$ : la méthode explique un quart de la dispersion des chiffres d'affaires.

## Trois agences, dix clients chacune

Durée d'attente (en minutes) dans trois agences, $10$ clients par agence :

| Agence | A | B | C |
|---|---|---|---|
| moyenne | $12$ | $15$ | $18$ |
| écart-type | $3$ | $4$ | $3{,}5$ |

1. Calculer SCE et SCR.
2. Tester l'égalité des durées moyennes ($F_{0{,}95\,;2\,;27} = 3{,}35$).

**SCE par les moyennes, SCR par les écarts-types**

1. Moyenne générale $15$. SCE $= 10 \times (3^2 + 0^2 + 3^2) = 180$.
   SCR $= 9 \times (3^2 + 4^2 + 3{,}5^2) = 335{,}25$.
2. $F = (180/2)/(335{,}25/27) = 90/12{,}42 = 7{,}25 > 3{,}35$ : **rejet**, $p = 0{,}003$.

$\eta^2 = 180/515{,}25 = 0{,}35$. L'agence C fait nettement attendre plus longtemps.

# Exercice 3 : significatif et important

**Six régions, cinq mille clients**

Une enquête compare le panier moyen de $5\,000$ clients répartis dans $6$ régions. L'ANOVA donne $F = 20{,}4$, $p < 0{,}0001$ et $\eta^2 = 0{,}02$.

1. Un analyste avait d'abord prévu de comparer les régions deux à deux au seuil de $5\,\%$. Quel aurait été le risque d'au moins une fausse découverte ?
2. Le directeur commercial veut adapter sa politique à chaque région. Que lui dire ?

**Le test et l'ampleur**

1. $15$ comparaisons : $1 - 0{,}95^{15} = 0{,}54$. Plus d'une chance sur deux de « découvrir » un écart inexistant.
2. L'effet de la région est **réel** ($p$ minuscule), mais il n'explique que $2\,\%$ de la dispersion des paniers.

Avec $5\,000$ clients, un effet aussi faible devient significatif. Il ne justifie pas, à lui seul, six politiques différentes.

# Ce qu’il faut retenir

## Six points

1. Comparer $k$ groupes deux à deux **gonfle le risque réel** : $14\,\%$ pour trois groupes, $40\,\%$ pour cinq. L'ANOVA teste toutes les moyennes en **un seul test**.
2. SCT $=$ SCE $+$ SCR : la décomposition du cours de statistique descriptive.
3. $F$ compare deux dispersions pour juger des **moyennes** ; sous $H_0$ il vaut environ $1$.
4. Sur l'échantillon : $F = 4{,}24$, $p = 0{,}020$, $\eta^2 = 0{,}153$ — pour un vrai $\eta^2$ de $0{,}258$.
5. L'ANOVA rejette **en bloc** ; les comparaisons deux à deux se font avec un seuil corrigé.
6. Variances inégales et groupes déséquilibrés faussent le risque : l'ANOVA de Welch le corrige.

**Deux variables qualitatives**

Il reste un type de données non traité : les **effectifs de tableau**, quand les deux variables sont qualitatives — le diplôme et le sexe, par exemple.

**Le prochain chapitre**

Le chapitre 18 y consacre le dernier test du cours, le khi-deux — celui qui ferme la boucle avec le tableau de contingence de la statistique descriptive.