Échantillonnage

Chapitre 11 : Les probabilités inégales

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 21 octobre 2026

Plan du chapitre

Tirer selon la taille

Avec remise : Hansen-Hurwitz

Cinq districts tirés selon leur taille

Sans remise : Horvitz-Thompson

Deux degrés autopondéré

Le risque d'une mauvaise mesure de taille

S'entraîner

Ce qu'il faut retenir

Tirer selon la taille

Des districts de tailles inégales


Cinq districts tirés à probabilités égales (chapitre 9)

Estimateur de la dépense moyenne	Écart-type	*deff*
Aléatoire simple de 200 ménages	$267{,}3$	1
5 districts, Horvitz-Thompson	$1\,516{,}6$	$32{,}2$
5 districts, ratio	$773{,}8$	$8{,}4$

Ce qui fait varier le total d'un district

Les districts comptent de 13 à 71 ménages. Le total Y_i d'un district dépend d'abord de sa **taille** M_i, ensuite seulement de la dépense de ses ménages. Tirés à probabilités égales, cinq districts héritent de toute la variation des tailles : c'est elle qui gonfle la variance de Horvitz-Thompson.

La dépense d'un district suit sa taille



Une corrélation de 0,87

Les points s'alignent autour de la droite $Y_i = \overline{Y}\, M_i$: la moyenne $\overline{Y}_i = Y_i/M_i$ varie beaucoup moins que le total Y_i. Coefficient de variation des totaux : $0{,}45$; des moyennes : $0{,}21$.

Le tirage proportionnel à la taille

On connaît pour chaque unité i, avant l'enquête, une **mesure de taille** $x_i > 0$, de total X. On tire l'unité i avec la probabilité

$$p_i = \frac{x_i}{X}, \qquad \sum_i p_i = 1$$

On parle de tirage **PPT** (probabilité proportionnelle à la taille). Pour les districts : $x_i = M_i$, $X = N = 2\,000$ et $p_i = M_i/2\,000$.

Le plus grand et le plus petit district

District 1 : $p_1 = 71/2\,000 = 0{,}0355$. District 46 : $p_{46} = 13/2\,000 = 0{,}0065$. Le premier a $71/13 = 5{,}46$ fois plus de chances d'être tiré que le second.

Avec remise : Hansen-Hurwitz

Tirer selon la taille avec un seul nombre

1. Calculer les tailles cumulées $C_i = x_1 + \cdots + x_i$, avec $C_0 = 0$.
2. Tirer un entier a au hasard entre 1 et X.
3. Retenir l'unité i telle que $C_{i-1} < a \leq C_i$.

L'unité i occupe x_i entiers sur X : elle sort avec la probabilité x_i/X. On répète n fois, **indépendamment** : c'est un tirage avec remise.

La mini-population, avec la taille pour mesure

Tailles $2, 3, 3, 4, 6$; cumuls $2, 5, 8, 12, 18$. On tire a entre 1 et 18 : A si $a \leq 2$, B de 3 à 5, C de 6 à 8, D de 9 à 12, E de 13 à 18. Ainsi $p_A = 2/18 = 1/9$ et $p_E = 6/18 = 1/3$.

Tirer un ménage, garder son district

Pour les districts, $X = N$: tirer a, c'est tirer **un ménage** au hasard et retenir son district.

Une estimation par tirage, puis leur moyenne

Au tirage j sort une unité de valeur $y_{(j)}$ et de probabilité $p_{(j)}$. Ce tirage fournit à lui seul l'estimation $z_j = y_{(j)}/p_{(j)}$ du total, et

$$\widehat{Y}_{HH} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} z_j = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{y_{(j)}}{p_{(j)}}$$

Sans biais, en une ligne

z_j vaut y_i/p_i avec la probabilité p_i, donc

$$E(z_j) = \sum_i p_i \frac{y_i}{p_i} = \sum_i y_i = Y$$

La moyenne de n estimations sans biais est sans biais. Avec $p_i = 1/N$, on retrouve $N\,\overline{y}_{AR'}$ l'estimateur avec remise du chapitre 4.

Des tirages indépendants et de même loi

$$V(\widehat{Y}_{HH}) = \frac{1}{n}\sum_i p_i \left(\frac{y_i}{p_i} - Y\right)^2 \qquad \widehat{V}(\widehat{Y}_{HH}) = \frac{s_z^2}{n} = \frac{1}{n\,(n-1)}\sum_{j=1}^{n}\left(z_j - \widehat{Y}_{HH}\right)^2$$

La démonstration

Les z_j sont indépendants, d'espérance Y et de variance $V(z) = \sum_i p_i\,(y_i/p_i - Y)^2$: leur moyenne a la variance $V(z)/n$. La variance s_z^2 des n valeurs z_j est sans biais pour $V(z)$ (Statistique inférentielle, chapitre 3), quels que soient les p_i.

Une variance nulle

Si y_i/p_i est le même pour toutes les unités, chaque tirage donne exactement Y : il faudrait des p_i **proportionnels aux** y_i. Comme les y_i sont inconnus, on prend une taille x_i qui leur est à peu près proportionnelle.

Deux tirages proportionnels à la taille

Ménage	A	B	C	D	E
y_i (milliers de dh)	4	6	7	9	14
$p_i = x_i/18$	$1/9$	$1/6$	$1/6$	$2/9$	$1/3$
$z_i = y_i/p_i$	36	36	42	40,5	42

$V(z) = \frac{1}{18}(2 \times 4^2 + 3 \times 4^2 + 3 \times 2^2 + 4 \times 0{,}5^2 + 6 \times 2^2) = \frac{117}{18} = 6{,}5$, d'où $V(\widehat{Y}_{HH}) = 6{,}5/2 = 3{,}25$.

Trente-trois fois moins que le sondage aléatoire simple

À probabilités égales, $V(\widehat{Y}) = 25 \times 4{,}35 = 108{,}75$ sans remise (chapitre 2), $25 \times 5{,}8 = 145$ avec remise (chapitre 4). Ici $3{,}25$: la dépense par personne y_i/x_i ne va que de 2 à $2{,}33$, et chaque z_i reste proche de $Y = 40$.

Cinq districts tirés selon leur taille

Hansen-Hurwitz pour des grappes

Avec $p_i = M_i/N$ et $y_i = Y_i$, chaque tirage donne $z_j = Y_i/p_i = N\,\overline{Y}_i$. La dépense moyenne s'estime par la **moyenne simple** des moyennes des districts tirés :

$$\frac{\widehat{Y}_{HH}}{N} = \frac{1}{n_I}\sum_{j=1}^{n_I} \overline{Y}_{(j)} \qquad V\Big(\frac{\widehat{Y}_{HH}}{N}\Big) = \frac{1}{n_I}\sum_{i=1}^{N_I} \frac{M_i}{N}\big(\overline{Y}_i - \overline{Y}\big)^2$$

Les tailles ont disparu

La variance ne dépend plus que des écarts entre **moyennes** de district : $\sum_i \frac{M_i}{N}\big(\overline{Y}_i - \overline{Y}\big)^2 = 2\,844\,644$, soit $18\,\%$ seulement de S^2. Pour $n_I = 5$: $2\,844\,644/5 = 568\,929$, et l'écart-type vaut $754{,}3$ dh.

Un tirage de cinq districts

Cinq nombres entre 1 et 2 000, graine 2026

Nombre a	District	Province, milieu	M_i	$\overline{Y}_i$
1 704	42	Larache, rural	43	6 845,35
358	7	Tanger-Assilah, urbain	70	10 953,29
53	1	Tanger-Assilah, urbain	71	7 014,65
1 280	30	Tétouan, rural	26	7 074,23
731	16	Tanger-Assilah, rural	47	8 046,17

L'estimation

$\frac{1}{5}(6\,845{,}35 + 10\,953{,}29 + 7\,014{,}65 + 7\,074{,}23 + 8\,046{,}17) = 7\,986{,}74$ dh, pour $\overline{Y} = 7\,911{,}44$. On a enquêté 257 ménages. Les deux plus grands districts, 1 et 7, sont tirés tous les deux : le plan les favorise.

Cinq moyennes, une variance

Écarts des $\overline{Y}_i$ à leur moyenne : $-1\,141{,}4$; $2\,966{,}5$; $-972{,}1$; $-912{,}5$; $59{,}4$. Somme des carrés $11\,884\,335$, d'où $s^2 = 11\,884\,335/4 = 2\,971\,084$ et

$$\widehat{V} = \frac{2\,971\,084}{5} = 594\,217 \qquad \text{erreur-type estimée } 770{,}9 \text{ dh}$$

Intervalle à $95\,\%$, Student à 4 degrés de liberté :
$7\,986{,}7 \pm 2{,}776 \times 770{,}9 = [5\,846{,}8\,;\,10\,126{,}6]$.

Cinq observations, pas 257

La variance se calcule sur les **cinq** moyennes de district : c'est le tirage des districts qui porte l'aléa, et les ménages d'un même district se ressemblent. L'erreur-type estimée, $770{,}9$, est proche de la vraie, $754{,}3$; l'erreur commise, $+75$ dh, est bien couverte.

Cinq districts, trois façons de faire


Cinq districts, estimateur	Ménages	Écart-type	*deff*
(aléatoire simple de 200 ménages)	200	267,3	1
Égales, Horvitz-Thompson	200	1 516,6	32,2
Égales, ratio	200	773,8	8,4
PPT, Hansen-Hurwitz	222,6	754,3	8,0

Ménages : nombre moyen de ménages enquêtés. Effet de plan rapporté à l'aléatoire simple de 200 ménages.

Aussi bon que le ratio, sans ses défauts

Le tirage PPT fait aussi bien que le ratio, mais son estimateur est **exactement sans biais**, et sa variance s'estime par une formule exacte. Le prix : les grands districts, plus souvent tirés, font enquêter en moyenne $\sum_i M_i^2/N = 44{,}5$ ménages par tirage, soit 222,6 au lieu de 200.

Vingt mille enquêtes



Trois estimateurs, cinq districts, graine 11

Horvitz-Thompson à probabilités égales se trompe de plus de $2\,000$ dh dans $18{,}6\,\%$ des enquêtes, le ratio dans $0{,}7\,\%$, Hansen-Hurwitz dans $0{,}8\,\%$. Écarts-types simulés : $1\,512{,}9$, $769{,}9$ et $761{,}7$ dh.

Sans remise : Horvitz-Thompson

Éviter les répétitions

Un district tiré deux fois

Avec remise, cinq tirages donnent cinq districts **distincts** avec la probabilité $0{,}795$ seulement : une enquête sur cinq tire deux fois le même district, et n'apprend rien de plus la seconde fois.

Des probabilités d'inclusion proportionnelles à la taille

Sans remise, on vise $\pi_i = n\,x_i/X$, ce qui exige $n\,x_i \leq X$, et l'on emploie l'estimateur de Horvitz-Thompson (chapitre 2), $\widehat{Y}_{HT} = \sum_{i \in S} y_i/\pi_i$. Pour 5 districts, $\pi_i = 5\,M_i/2\,000 = M_i/400$, de $0{,}0325$ à $0{,}1775$: $\widehat{Y}_{HT}/N$ est encore la moyenne simple des $\overline{Y}_i$ tirés.

Les unités trop grandes

Si $n\,x_i > X$, l'unité est prise d'office ($\pi_i = 1$) et l'on tire les autres parmi le reste. Avec 40 districts, $\pi_i = M_i/50$ dépasserait 1 pour les 8 districts de plus de 50 ménages.

Tailles cumulées et pas constant


1. Ranger les unités dans un ordre choisi ; calculer les tailles cumulées C_i.
2. Fixer le pas $k = X/n$; tirer un départ r au hasard entre 1 et k.
3. Retenir les unités dont l'intervalle $]C_{i-1}\,;\,C_i]$ contient l'un des points r, $r+k$, …, $r+(n-1)\,k$.

Si $x_i \leq k$, l'intervalle de l'unité i reçoit un point pour exactement x_i des k départs : $\pi_i = x_i/k = n\,x_i/X$.

Cinq districts dans l'ordre du fichier

$k = 2\,000/5 = 400$; départ tiré (graine 2026) : $r = 341$. Les points 341, 741, $1\,141$, $1\,541$ et $1\,941$ tombent dans les districts 7, 17, 26, 37 et 49.

Cinq districts sur l'axe des ménages



L'estimation et sa précision

$\frac{1}{5}\,(10\,953{,}29 + 5\,828{,}14 + 6\,146{,}35 + 7\,688{,}91 + 6\,758{,}33) = 7\,475{,}0$ dh, soit 436 dh de moins que $\overline{Y}$. Sur les 400 départs possibles, l'écart-type exact vaut $668{,}3$ dh, contre $754{,}3$ avec remise : chaque province reçoit sa part de points, une **stratification implicite** (chapitre 8).

Deux ménages, pas de 9, ordre A à E

$\pi_i = 2\,x_i/18$: $\frac{2}{9}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{4}{9}$, $\frac{2}{3}$; y_i/π_i : 18, 18, 21, $20{,}25$, 21. Les 9 départs donnent cinq échantillons :

Échantillon	AD	BD	BE	CE	DE
Probabilité	$2/9$	$1/9$	$2/9$	$3/9$	$1/9$
$\widehat{Y}_{HT}$	$38{,}25$	$38{,}25$	39	42	$41{,}25$

Sans remise, un peu mieux

$E(\widehat{Y}_{HT}) = 360/9 = 40 = Y$ et $V(\widehat{Y}_{HT}) = 2{,}75$, contre $3{,}25$ avec remise : aucun tirage n'est perdu à reprendre un ménage déjà tiré. Mais AB, AC, AE, BC et CD ne sont **jamais** tirés ensemble : $\pi_{kl} = 0$ pour cinq paires sur dix.

La forme du chapitre 2, pour un plan de taille fixe

$$V(\widehat{Y}_{HT}) = \frac{1}{2}\sum_{k}\sum_{l\neq k}(\pi_k\,\pi_l - \pi_{kl})\left(\frac{y_k}{\pi_k} - \frac{y_l}{\pi_l}\right)^2$$

Mini-population : les dix paires, multipliées par 81, donnent 54 (AC), $-50{,}625$ (AD), 108 (AE), 81 (BC), $15{,}1875$ (BD), $6{,}75$ (CD), $8{,}4375$ (DE), 0 pour les autres. Total : $222{,}75/81 = 2{,}75$, la variance de l'énumération.

Pas d'estimation sans biais

$\widehat{V}_{SYG}$ divise chaque paire par π_{kl} : il exige $\pi_{kl} > 0$. Or $1\,028$ paires de districts sur $1\,225$ ($84\,\%$) ne sont jamais tirées ensemble. On calcule alors la variance **comme avec remise**, s^2/n_I sur les $\overline{Y}_i$ tirés : erreur-type $925{,}6$ dh ici, $\sqrt{599\,512} = 774{,}3$ dh en moyenne sur les 400 départs, pour un écart-type vrai de $668{,}3$. C'est **prudent**.

Deux degrés autopondéré

Districts selon leur taille, ménages en nombre fixe

Le plan

1. Tirer n_I districts proportionnellement à leur taille : $\pi_i = n_I\, M_i/N$.
2. Dans chaque district tiré, tirer m ménages par sondage aléatoire simple, **le même nombre partout**.

Un ménage du district i est tiré avec la probabilité

$$\pi_k = \frac{n_I\, M_i}{N} \times \frac{m}{M_i} = \frac{n_I\, m}{N}$$

la même pour tous : le plan est **autopondéré**.

Vingt districts de dix ménages

$\pi_i = 20\, M_i/2\,000 = M_i/100$, de $0{,}13$ à $0{,}71$; $\pi_k = 200/2\,000 = 0{,}1$ et $d_k = 10$ pour chacun des 200 ménages. L'estimateur est la simple moyenne $\overline{y}$ des 200 ménages.

Trois avantages pratiques

1. **Une charge fixe par district** : chaque équipe réalise m entretiens, quel que soit le district.
2. **Une taille d'échantillon fixée** à $n_I\, m$ ménages, donc un budget connu.
3. **Des poids égaux** : moyennes et proportions se calculent sans pondération.

Ce que le chapitre 10 ne réunissait pas

À probabilités égales, m ménages par district donnent des poids $d_k = N_I\, M_i / (n_I\, m)$ qui varient de $3{,}25$ à $17{,}75$; des m_i proportionnels à M_i rendent le plan autopondéré, mais la charge devient inégale. Le tirage selon la taille réunit les deux avantages.

Districts tirés avec remise

Chaque tirage donne la moyenne $\overline{y}_{(j)}$ de m ménages d'un district ; l'estimateur est $\overline{y} = \frac{1}{n_I} \sum_j \overline{y}_{(j)}$, de variance

$$V(\overline{y}) = \frac{1}{n_I} \Big[\underbrace{\sum_i \frac{M_i}{N} (\overline{Y}_i - \overline{Y})^2}_{\text{entre districts}} + \underbrace{\sum_i \frac{M_i}{N} \Big(1 - \frac{m}{M_i}\Big) \frac{S_i^2}{m}}_{\text{dans les districts}} \Big]$$

où S_i^2 est la variance des dépenses dans le district i.

Une estimation qui voit les deux degrés

Les n_I moyennes $\overline{y}_{(j)}$ sont indépendantes et de même loi, d'espérance $\sum_i \frac{M_i}{N} \overline{Y}_i = \overline{Y}$.

Donc $\widehat{V}(\overline{y}) = s_b^2 / n_I$, où s_b^2 est la variance de ces n_I moyennes : les deux degrés y sont, sans calculer un seul S_i^2.

Vingt districts de dix ménages sur la population

Deux plans de 200 ménages

Districts tirés	Entre	Dans	Écart-type	$deff$
Probabilités égales	$383\,368$	$59\,169$	$665{,}2$	$6{,}20$
Selon leur taille	$142\,232$	$50\,528$	$439{,}0$	$2{,}70$


Variance de $\overline{y}$ **entre** districts et **dans** les districts. PPT : $2\,844\,644/20 = 142\,232$ et $10\,105\,597/200 = 50\,528$, où $10\,105\,597 = \sum_i \frac{M_i}{N}(1 - \frac{10}{M_i})S_i^2$.

Le premier degré reste le plus lourd

Le tirage selon la taille divise par $2{,}7$ la variance entre districts et ramène l'effet de plan de $6{,}20$ à $2{,}70$. Le premier degré fait encore $74\,\%$ de la variance. Pour le plan 10×20 du chapitre 10 ($deff = 14{,}9$), l'effet de plan tomberait à $4{,}5$ environ.

Le risque d’une mauvaise mesure de taille

Une mesure de taille, plusieurs variables



Le total estimé avec cinq districts

Ménages connectés : coefficient de variation de $11{,}6\,\%$ en PPT, contre $20{,}8\,\%$ à probabilités égales. Ménages ruraux : $71{,}5\,\%$ en PPT, contre $65{,}9\,\%$: le tirage selon la taille fait **moins bien**.

La mini-population, tailles inversées

Avec les tailles $6, 4, 3, 3, 2$ pour A à E : $z_i = y_i/p_i = 12, 27, 42, 54, 126$, et $V(z) = 20\,772/18 = 1\,154$. Avec les vraies tailles, $V(z) = 6{,}5$; à probabilités égales, 290, soit quatre fois mieux.

Une petite probabilité sur une grande valeur

$V(z) = \sum_i p_i \, (y_i/p_i - Y)^2$ explose quand une unité a une **grande valeur** y_i et une **petite probabilité** p_i : E, qui dépense le plus, n'a plus que $p_E = 2/18$ et compte, s'il est tiré, pour 126 au lieu de 40. Les ruraux sont un cas voisin : R_i/p_i vaut N pour un district rural, 0 pour un district urbain.

Un district qui a quadruplé

Un district compté 13 ménages au recensement en abrite aujourd'hui 52, après la construction d'un lotissement. Tiré avec $p_i = 13/2\,000$, il fournit à lui seul $z_j/2\,000 = 52\,\overline{Y}_i/13 = 4\,\overline{Y}_i$. L'estimateur reste sans biais, car p_i est la vraie probabilité de tirage, mais sa variance s'envole ; en deux degrés, ses m ménages devraient peser **quatre fois** plus que les autres : le plan n'est plus autopondéré.

Bien choisir la mesure de taille

1. **Liée à la variable principale** : y_i/x_i doit varier peu d'une unité à l'autre.
2. **À jour** : recensement récent, liste actualisée, ou dénombrement des districts tirés avant l'enquête.
3. **Adaptée à toutes les variables** : une taille en ménages convient aux totaux qui croissent avec la taille ; pour un groupe concentré dans certains districts, comme les ruraux, mieux vaut **stratifier** (chapitre 6).

S’entraîner

Hansen-Hurwitz sur quatre villages

Quatre villages comptent 10, 20, 30 et 40 ménages ; leurs dépenses totales sont 60, 140, 180 et 320 milliers de dh. On tire deux villages avec remise, proportionnellement au nombre de ménages.

1. Calculer les p_i, les $z_i = Y_i/p_i$, et vérifier que $E(z) = Y$.
2. Calculer $V(\widehat{Y}_{HH})$. Comparer à deux tirages avec remise à probabilités égales.
3. On tire les villages 2 et 4. Calculer $\widehat{Y}_{HH}$, son erreur-type estimée, et la dépense moyenne par ménage estimée.

Probabilités et variance

1. $p_i = 0{,}1\,;\,0{,}2\,;\,0{,}3\,;\,0{,}4$ et $z_i = 600, 700, 600, 800$.
   $E(z) = 60 + 140 + 180 + 320 = 700 = Y$.
2. $V(z) = 0{,}1 \times 100^2 + 0 + 0{,}3 \times 100^2 + 0{,}4 \times 100^2 = 8\,000$, d'où $V(\widehat{Y}_{HH}) = 4\,000$.
   À probabilités égales, $z_i = 4\,Y_i = 240, 560, 720, 1\,280$: $V(z) = 142\,000$ et $V = 71\,000$, soit $17{,}75$ fois plus.

Une estimation

3. $\widehat{Y}_{HH} = (700 + 800)/2 = 750$ milliers de dh ; $\widehat{V} = \frac{1}{2\times 1}(50^2 + 50^2) = 2\,500$, erreur-type 50. Par ménage : $750/100 = 7{,}5$ milliers de dh, pour une vraie valeur de 7.

Un tirage systématique proportionnel à la taille

Huit douars comptent, dans l'ordre de la liste, 12, 30, 18, 25, 40, 15, 35 et 25 ménages. On en tire 4 par tirage systématique proportionnel à la taille, et l'on enquête tous leurs ménages.

1. Calculer les tailles cumulées, le pas k et les π_i. Tous les π_i sont-ils inférieurs à 1 ?
2. Avec le départ $r = 37$, quels douars sont tirés ?
3. Leurs dépenses moyennes sont $6{,}2$; $7{,}5$; $5{,}8$ et $6{,}9$ milliers de dh. Estimer la dépense moyenne et le total.
4. Peut-on estimer la variance sans biais ? Que faire ?

Exercice 2 : solution

Le tirage

1. Cumuls : 12, 42, 60, 85, 125, 140, 175, 200 ; $k = 200/4 = 50$; $\pi_i = 4\,M_i/200 = M_i/50$, de $0{,}24$ à $0{,}8$: tous les douars ont $M_i \leq 50$.
2. Points 37, 87, 137, 187 : douars 2 ($]12\,;42]$), 5 ($]85\,;125]$), 6 ($]125\,;140]$) et 8 ($]175\,;200]$).

L'estimation

3. $Y_i/\pi_i = M_i\overline{Y}_i/(M_i/50) = 50\,\overline{Y}_i$: $\widehat{Y}_{HT} = 50 \times 26{,}4 = 1\,320$ milliers de dh, et la moyenne vaut $1\,320/200 = 6{,}6$, la moyenne simple des quatre $\overline{Y}_i$.
4. Non : sept paires, dont les douars 1 et 2, ne sont jamais tirées ensemble ($\pi_{kl} = 0$). On calcule comme avec remise : $s^2 = 1{,}7/3 = 0{,}5667$, $\widehat{V} = 0{,}5667/4 = 0{,}1417$, erreur-type $0{,}376$ millier de dh, une valeur prudente.

Un plan autopondéré sur la population du cours

On tire 25 districts par tirage systématique proportionnel à la taille, puis 8 ménages dans chacun ; la variance se calcule comme si les districts étaient tirés avec remise.

1. Calculer π_k et le poids des ménages, puis π_i pour les districts de 71 et de 13 ménages.
2. Avec $\sum_i \frac{M_i}{N}(\overline{Y}_i - \overline{Y})^2 = 2\,844\,644$ et $\sum_i \frac{M_i}{N}(1 - \frac{8}{M_i})S_i^2 = 10\,753\,679$, calculer $V(\overline{y})$, l'écart-type et l'effet de plan ($V_{SAS} = 71\,435{,}5$).
3. Pourquoi ne pourrait-on pas tirer ainsi 40 districts de 5 ménages ?

Probabilités et variance

1. $\pi_k = 25 \times 8/2\,000 = 0{,}1$ et $d_k = 10$ pour tous. $\pi_i = 25\,M_i/2\,000 = M_i/80$: $0{,}8875$ et $0{,}1625$.
2. $2\,844\,644/25 = 113\,786$ et $10\,753\,679/(25 \times 8) = 53\,768$: $V = 167\,554$, écart-type $409{,}3$ dh, $deff = 167\,554/71\,435{,}5 = 2{,}35$, contre $4{,}45$ si les districts sont tirés à probabilités égales.

Les grands districts

3. $\pi_i = 40\,M_i/2\,000 = M_i/50$ dépasserait 1 pour les 8 districts de plus de 50 ménages. Il faudrait les prendre d'office, et y tirer $M_i/10$ ménages pour garder $\pi_k = 0{,}1$.

Ce qu’il faut retenir

Le résumé du chapitre

Sept points

1. Tirer **proportionnellement à une taille** : $p_i = x_i/X$, par les tailles cumulées.
2. Hansen-Hurwitz : $\widehat{Y}_{HH} = \frac{1}{n}\sum_j y_{(j)}/p_{(j)}$, sans biais, et $\widehat{V} = s_z^2/n$.
3. Sa variance est faible quand y_i/x_i varie peu, nulle si y_i est proportionnel à x_i.
4. Cinq districts selon leur taille : écart-type $754{,}3$ dh, contre $1\,516{,}6$ à probabilités égales.
5. Sans remise : $\pi_i = n\,x_i/X$ et Horvitz-Thompson ; des π_{kl} nuls, une variance prudente.
6. Districts selon leur taille, puis m ménages : un plan **autopondéré** à charge fixe.
7. Une taille mal liée à y, ou périmée, peut faire **pire** que les probabilités égales.

La suite

Le chapitre 12 se sert de l'information auxiliaire pour **estimer**, non plus pour tirer : connaissant le nombre total de personnes, $X = 7\,859$, l'estimateur par le ratio corrige la moyenne de l'échantillon.