Introduction à l'économétrie

Chapitre 4 : La qualité de l'ajustement

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 octobre 2026

Plan du chapitre

La décomposition

Coefficient de détermination

L'écart-type résiduel


Sur machine

S'entraîner

Ce qu'il faut retenir

La décomposition

Couper l'écart en deux



La décomposition, terme à terme

$y_i - \overline{y} = (\widehat{y}_i - \overline{y}) + (y_i - \widehat{y}_i)$

En élevant au carré et en sommant, le double produit s'annule — c'est une propriété des moindres carrés, non une approximation :

$$\underbrace{\text{SCT}}_{\text{totale}} = \underbrace{\text{SCE}}_{\text{expliquée}} + \underbrace{\text{SCR}}_{\text{résiduelle}}$$

C'est exactement la décomposition de l'analyse de la variance, chapitre 17 du cours d'inférence. L'ANOVA découpait selon des groupes ; la régression découpe selon une droite.

D'où $R^2 = \text{SCE}/\text{SCT}$, qui n'est autre que le η^2 de l'ANOVA.

L'identité fondamentale

$$\underbrace{\sum_i (y_i - \overline{y})^2}_{\text{SCT}} = \underbrace{\sum_i (\hat{y}_i - \overline{y})^2}_{\text{SCE}} + \underbrace{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}_{\text{SCR}}$$

Totale, expliquée, résiduelle.

Le double produit s'annule exactement

En développant le carré, il apparaît un terme croisé $2\sum_i (\hat{y}_i - \overline{y})e_i$.

Il est **nul** — conséquence directe des deux propriétés algébriques du chapitre 3. Ce n'est pas une approximation : c'est une identité, et elle ne vaut que pour les moindres carrés.

Pourquoi le double produit est nul

Deux lignes

La droite passe par le point moyen : $\hat{y}_i - \overline{y} = \hat{\beta}_1 \, (x_i - \overline{x})$. Donc

$$\sum_i (\hat{y}_i - \overline{y}) \, e_i = \hat{\beta}_1 \Big(\sum_i x_i e_i - \overline{x} \sum_i e_i \Big) = \hat{\beta}_1 \, (0 - 0) = 0$$

Une conséquence utile au calcul

La même égalité donne SCE $= \hat{\beta}_1^2 \, S_{xx}$: la part expliquée se calcule **sans valeurs ajustées**, avec la pente et la somme des carrés de x.

Sur les cinq ménages : $0{,}75^2 \times 40 = 22{,}5$.

À la main, sur les cinq ménages

Les trois sommes, colonne par colonne

Ménage	C	$\widehat{C}$	$C-\overline{C}$	$\widehat{C}-\overline{C}$	e
A	3	3	-3	-3	0
B	6	4,5	0	$-1{,}5$	1,5
C	4	6	-2	0	-2
D	7	7,5	1	1,5	$-0{,}5$
E	10	9	4	3	1
Carrés			SCT $= 30$	SCE $= 22{,}5$	SCR $= 7{,}5$

Point par point, l'identité ne tient pas

Pour le ménage B : $0^2 \neq (-1{,}5)^2 + 1{,}5^2$. La décomposition ne vaut que **pour les sommes** : c'est la somme des doubles produits qui s'annule, pas chacun d'eux.

Coefficient de détermination

Le R^2

$$R^2 = \frac{\text{SCE}}{\text{SCT}} = 1 - \frac{\text{SCR}}{\text{SCT}} \qquad 0 \leq R^2 \leq 1$$

C'est la **part de la variance de y dont le modèle rend compte**.


Trois identités à connaître

En régression simple, $R^2 = r^2$: le carré du coefficient de corrélation linéaire.

C'est aussi le η^2 de l'analyse de la variance, chapitre 17 de l'inférence — même quantité, autre découpage.

Et $R^2 = 0$ signifie que la droite est **horizontale** : la meilleure prévision est alors la moyenne.


Sur nos trois terrains



Trois calculs, une même formule

Cinq ménages : $22{,}5/30 = 0{,}75$, et $r^2 = 0{,}866^2 = 0{,}75$. Salaires : $1\,366{,}4/3\,375{,}1 = 0{,}405$, et $r^2 = 0{,}6363^2 = 0{,}405$. Ménages : $597{,}4/703{,}6 = 0{,}849$.

Ce qu'il ne dit pas



Les trois droites ont la même pente. Seule change la dispersion autour d'elles.

Le R^2 mesure la *part de la variance expliquée*, non l'intensité de l'effet. Un R^2 faible avec une pente forte et significative est parfaitement possible — et c'est le cas ordinaire en économie des ménages, où l'on explique rarement plus de la moitié de la variance.

Ne jamais juger un modèle sur le seul R^2. Un R^2 de 0,30 sur des données individuelles est un bon résultat ; un R^2 de 0,99 sur une série temporelle est souvent le signe que les deux variables croissent simplement avec le temps.

Un R^2 faible n'est pas un mauvais résultat

Sur des données **individuelles**, on explique rarement plus de la moitié de la variance : les comportements humains sont irréductiblement dispersés.

Nos salaires donnent $R^2 = 0{,}40$ avec la seule ancienneté. C'est un bon résultat, et la pente est significative à $t = 18{,}4$.

Un R^2 élevé n'est pas non plus un bon résultat

Notre enquête de ménages donne $R^2 = 0{,}849$: bien plus élevé que sur les salaires, et c'est normal — le revenu détermine la consommation de façon beaucoup plus directe que l'ancienneté ne détermine le salaire.

Un R^2 ne se compare qu'entre modèles portant sur la même variable expliquée. Comparer $0{,}40$ sur les salaires et $0{,}85$ sur la consommation ne dit rien : ce ne sont pas les mêmes phénomènes.

La bonne façon de juger un modèle

Quatre questions, dans cet ordre

1. Les **signes** des coefficients sont-ils conformes à la théorie ?
2. Leurs **ordres de grandeur** sont-ils plausibles ?
3. Sont-ils **significatifs** ?
4. Enfin, quel est le R^2 ?

Le R^2 arrive en dernier, et ce n'est pas un hasard

Un modèle aux coefficients absurdes et au R^2 de $0{,}95$ ne vaut rien. Un modèle aux coefficients justes et au R^2 de $0{,}30$ enseigne quelque chose.

On ne publie pas un R^2, on publie un coefficient et son intervalle.

L’écart-type résiduel

Dans l'unité de la variable expliquée

$$\hat{\sigma}_\varepsilon = \sqrt{\frac{\text{SCR}}{n-2}}$$

C'est l'écart-type des résidus, **dans l'unité de la variable expliquée**.

Elle est souvent plus parlante que le R^2

Sur nos salaires, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 2\,008$ dirhams : le modèle se trompe typiquement de deux mille dirhams sur un salaire individuel.

Voilà une phrase qu'un directeur des ressources humaines comprend immédiatement. « $R^2 = 0{,}40$ » ne lui dit rien.

Trois écarts-types résiduels

Terrain	SCR	$n-2$	$\hat{\sigma}_\varepsilon$
Cinq ménages	$7{,}5$	3	$\sqrt{2{,}5} = 1{,}58$ millier de dh
400 ménages	$106{,}2$ millions	398	517 dh
500 salariés	$2\,008{,}6$ millions	498	$2\,008$ dh

Rapporté à la moyenne

517 dirhams sur une consommation moyenne de $2\,779$: une erreur typique de $19\,\%$. $2\,008$ sur un salaire moyen de $7\,158$: $28\,\%$. **Le classement des deux modèles est le même qu'avec le R^2, mais il se dit en dirhams.**

Pourquoi diviser par n moins 2

Deux contraintes pèsent sur les résidus

Les résidus vérifient $\sum e_i = 0$ et $\sum x_i e_i = 0$. Sur cinq ménages, trois résidus connus fixent donc les deux autres : il ne reste que $n - 2 = 3$ **résidus libres**.

C'est le n moins 1 de la variance d'échantillon

Au cours d'inférence, on divisait par $n - 1$ parce qu'on avait estimé une moyenne. Ici, deux paramètres estimés, deux degrés de liberté perdus : c'est le $n - 2$ du chapitre 20 de l'inférence. **Diviser par n sous-estimerait systématiquement σ_ε** — et d'autant plus que n est petit.

Sur machine

```r
R <- c(2, 4, 6, 8, 10)
C <- c(3, 6, 4, 7, 10)
m <- lm(C ~ R)
anova(m)                        # SCE puis SCR
# Analysis of Variance Table
#
# Response: C
#           Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
# R          1   22.5    22.5       9 0.05767
# Residuals  3    7.5     2.5
summary(m)$r.squared
# [1] 0.75
sigma(m)                        # racine de SCR / (n - 2)
# [1] 1.581139
```

```
import numpy as np, pandas as pd
import statsmodels.formula.api as smf
sal = pd.read_csv("salaires.csv")
m1 = smf.ols("salaire ~ anciennete", data=sal).fit()
sc = np.array([m1.centered_tss, m1.ess, m1.ssr])
print((sc / 1e6).round(2))           # SCT, SCE, SCR en millions
# [3375.06 1366.42 2008.64]
print(round(m1.rsquared, 4), round(np.sqrt(m1.scale), 2))
# 0.4049 2008.34
```

La table d'analyse de la variance contient tout

La sortie **anova** de R donne SCE $(22{,}5)$, SCR $(7{,}5)$ et leur rapport corrigé des degrés de liberté, $F = 9$. Ce F et sa p-value, $0{,}058$, sont l'objet du chapitre 5.

S’entraîner

Exercice 1 : décomposer à la main

Les quatre magasins, suite

On reprend $x = 1, 2, 4, 5$ et $y = 2, 4, 5, 9$, de droite $\hat{y} = 0{,}5 + 1{,}5\,x$.

1. Calculer SCT, SCE et SCR. Vérifier l'identité.
2. En déduire R^2, puis le vérifier par r^2.
3. Calculer l'écart-type résiduel.

Exercice 1 : solution

Un R^2 de 0,865

1. $\overline{y} = 5$: SCT $= 9 + 1 + 0 + 16 = 26$. Résidus 0 ; $0{,}5$; $-1{,}5$; 1 : SCR $= 3{,}5$.
   SCE $= 1{,}5^2 \times 10 = 22{,}5$, et $22{,}5 + 3{,}5 = 26$.
2. $R^2 = 22{,}5/26 = 0{,}865$. Et $r = 15/\sqrt{10 \times 26} = 0{,}930$, dont le carré vaut $0{,}865$.
3. $\hat{\sigma}_\varepsilon = \sqrt{3{,}5/2} = 1{,}32$ millier de dirhams.

Exercice 2 : lire une sortie partielle

Ce qu'on peut reconstruire

Une régression simple sur $n = 102$ observations donne SCT $= 800$ et SCR $= 600$.

1. Calculer R^2 et $\hat{\sigma}_\varepsilon$.
2. Le coefficient de corrélation vaut-il $0{,}5$ ou $-0{,}5$?
3. Un collègue obtient $R^2 = 0{,}60$ en expliquant le **logarithme** de la même variable. Son modèle est-il meilleur ?

Le signe ne se lit pas dans le R^2

1. $R^2 = 1 - 600/800 = 0{,}25$; $\hat{\sigma}_\varepsilon = \sqrt{600/100} = 2{,}45$.
2. Impossible à dire : $r^2 = 0{,}25$ donne $|r| = 0{,}5$. **Le signe est celui de la pente**, que la décomposition efface.
3. On ne peut pas conclure : les deux R^2 ne portent pas sur la même variance — celle de y et celle de $\ln y$. Le chapitre 18 y revient.

Exercice 3 : un R^2 trompeur

Deux études concurrentes

L'étude A explique la consommation **nationale** de 1990 à 2023 par le revenu national : $R^2 = 0{,}98$. L'étude B explique la consommation de 400 ménages par leur revenu : $R^2 = 0{,}85$.

1. Peut-on dire que l'étude A est meilleure ?
2. Quel phénomène, vu en introduction, peut gonfler le R^2 de A ?
3. Quelle information serait plus parlante que le R^2 pour l'étude B ?

Un R^2 se lit avec ses données

1. Non : les variables expliquées diffèrent — un agrégat, des ménages — et les structures aussi.
2. La **tendance commune** : deux séries qui montent avec le temps donnent un R^2 élevé même sans relation. C'est la régression fallacieuse ; A relève des séries temporelles, hors de ce cours.
3. L'écart-type résiduel, 517 dirhams, et surtout la **pente** avec son intervalle : c'est elle qui répond à la question de Keynes.

Ce qu’il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. SCT $=$ SCE $+$ SCR : le double produit s'annule, propriété exacte des MCO.
2. $R^2 = \text{SCE}/\text{SCT}$: la part de variance expliquée, entre 0 et 1 ; $0{,}75$ sur les cinq ménages.
3. En régression simple, $R^2 = r^2$ — et c'est le η^2 de l'ANOVA.
4. Un R^2 **faible** est normal sur données individuelles ; il ne se compare qu'à **variable expliquée identique**.
5. $\hat{\sigma}_\varepsilon = \sqrt{\text{SCR}/(n-2)}$ parle en dirhams : $2\,008$ sur les salaires.
6. On divise par $n - 2$: deux contraintes pèsent sur les résidus.

La suite

Le R^2 décrit l'échantillon. Il ne dit rien de la population — et c'est pourtant sur elle que porte la question économique. Le chapitre 5 fait le pas, avec les outils du cours d'inférence.