

Statistique descriptive

Chapitre 4 : Le regroupement en classes

Jaouad Madkour

15 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Pourquoi des classes


Combien de classes, et lesquelles

Le prix des amplitudes inégales

Le centre de classe

Ce qu'il faut retenir

Pourquoi des classes



L'obligation

Le tableau du chapitre 3 est impossible ici

Le salaire prend 381 valeurs différentes sur 500 salariés. Un tableau à 381 lignes ne résume rien : il est plus long que la question qu'il prétend traiter.

Pour une variable continue, on n'a pas le choix : il faut **regrouper les valeurs en intervalles**.

Classe

Une **classe** est un intervalle $[e_{i-1} ; e_i[$, fermé à gauche et ouvert à droite.

- e_{i-1} et e_i sont les **bornes**;
- $a_i = e_i - e_{i-1}$ est l'**amplitude**;
- $c_i = \frac{e_{i-1} + e_i}{2}$ est le **centre de classe**.

La convention d'écriture n'est pas décorative

$[4\,000 ; 6\,000[$ signifie : de 4 000 inclus à 6 000 **exclu**.

Un salarié à 6 000 dirhams appartient à la classe suivante, et à elle seule. C'est ce qui garantit que les modalités sont **incompatibles**, exigence posée au chapitre 2.

Un tableau écrit avec des classes $[4\,000 ; 6\,000]$ et $[6\,000 ; 8\,000]$ est faux.

Combien de classes, et lesquelles

Le nombre de classes

Deux règles empiriques

règle de Sturges : $k \approx 1 + 3,3 \log_{10}(n)$

règle de la racine : $k \approx \sqrt{n}$

Sur nos données

Sturges : $1 + 3,3 \times \log_{10}(500) = 1 + 3,3 \times 2,70 = 9,9$, soit une dizaine de classes.

Racine : $\sqrt{500} = 22,4$.

Les deux règles ne s'accordent pas. **Elles ne sont qu'indicatives.**

Le vrai critère est l'arbitrage

Trop peu de classes : on écrase la forme de la distribution, tout devient plat.

Trop de classes : le tableau redevient bruité, chaque classe contient trop peu d'individus pour être stable.

Le bon nombre est celui qui laisse voir la forme sans laisser voir le hasard. Il se juge sur l'histogramme, pas sur une formule — et il faut souvent essayer deux ou trois découpages.

Le choix des bornes

Trois principes



1. Des bornes **rondes** et lisibles : 4 000, 6 000, 8 000 — jamais 4 137.
2. Aucune classe **vide** à l'intérieur du tableau.
3. Des classes **plus larges là où les données sont rares** — c'est-à-dire dans les queues.

Le découpage retenu pour les salaires

Classe	n_i	f_i	a_i	N_i	F_i
[2 000 ; 4 000[	31	0,062	2 000	31	0,062
[4 000 ; 6 000[	157	0,314	2 000	188	0,376
[6 000 ; 8 000[	166	0,332	2 000	354	0,708
[8 000 ; 10 000[	79	0,158	2 000	433	0,866
[10 000 ; 14 000[	57	0,114	4 000	490	0,980
[14 000 ; 20 000[	10	0,020	6 000	500	1,000
Total	500	1,000			

Le prix des amplitudes inégales

L'erreur qu'il faut voir une fois



classes d'amplitudes inégales : 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 4 000, 6 000 dirhams

La densité

Densité de fréquence

$$d_i = \frac{n_i}{a_i} \quad \text{ou, en fréquences,} \quad \frac{f_i}{a_i}$$

Dans un histogramme, c'est la densité qui donne la hauteur du rectangle, jamais l'effectif.

La règle, en une phrase

Dans un histogramme, c'est l'aire qui représente l'effectif, pas la hauteur.

Aire du rectangle = base $\times$ hauteur = $a_i \times \frac{n_i}{a_i} = n_i$. L'amplitude se simplifie : chaque rectangle a une aire égale à son effectif, quelles que soient les largeurs choisies.

Le calcul complet sur nos classes

Classe	n_i	a_i	$d_i = n_i/a_i$
[2 000 ; 4 000[	31	2 000	0,0155
[4 000 ; 6 000[	157	2 000	0,0785
[6 000 ; 8 000[	166	2 000	0,0830

La classe ouverte

Un tableau publié se termine souvent par « 20 000 dirhams et plus » : la borne supérieure est inconnue.

On ne peut alors ni calculer la densité, ni le centre de classe, ni donc la moyenne.

Les deux solutions

1. **Fermer arbitrairement** la classe, en lui donnant l'amplitude de la précédente. C'est la convention la plus répandue.
2. **Renoncer à la moyenne** et travailler avec la médiane, qui n'a pas besoin des valeurs extrêmes.

La seconde est plus honnête. C'est aussi pourquoi les revenus se publient en médiane : la classe la plus haute est toujours ouverte.

Le centre de classe

Une hypothèse qu'on oublie

Le centre de classe

$$c_i = \frac{e_{i-1} + e_i}{2}$$

Pour tous les calculs qui suivent — moyenne, variance, moments — **on remplace chaque individu de la classe par le centre de sa classe.**

L'hypothèse d'équirépartition

On suppose que les individus sont **uniformément répartis** à l'intérieur de chaque classe. C'est faux en général, mais les erreurs se compensent partiellement d'une classe à l'autre.

Le coût de l'approximation, chiffré

Moyenne calculée sur les 500 valeurs exactes : 7 158 dirhams.

Moyenne calculée à partir du tableau en classes, avec les centres :

$$\bar{x} = \frac{3000(31) + 5000(157) + 7000(166) + 9000(79) + 12000(57) + 17000(10)}{500} = 7\,210$$

Écart : 52 dirhams, soit 0,7 %.

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. Une variable continue **doit** être regroupée en classes $[e_{i-1} ; e_i[$.
2. Sturges et la racine donnent un ordre de grandeur, pas une réponse : le nombre de classes se juge sur l'histogramme.
3. Bornes rondes, aucune classe vide, classes plus larges dans les queues.
4. **Densité** $d_i = n_i/a_i$: c'est elle qui donne la hauteur d'un histogramme, jamais l'effectif.
5. Dans un histogramme, **l'aire représente l'effectif**.
6. Le **centre de classe** remplace les individus dans tous les calculs : approximation excellente si les classes denses sont fines.

La suite

Le tableau est construit. Chacune de ses colonnes appelle maintenant sa propre représentation graphique — et le choix du graphique dépend, une fois encore, du type de la variable.

C'est le chapitre 5.