

Statistique inférentielle

Chapitre 13 : La logique d'un test

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Décider sous incertitude

Le procès

La règle de décision

Ce qu'il faut retenir

Décider sous incertitude



On ne cherche plus une valeur, on juge une affirmation

« La convention du secteur fixe un salaire moyen de 6 500 dirhams. Notre entreprise paie-t-elle davantage ? »

Ce n'est plus une demande d'estimation : c'est une **décision binaire**, et il faut une règle pour la prendre.

Test d'hypothèse

Un **test** est une règle qui, à partir d'un échantillon, conduit à rejeter ou à ne pas rejeter une affirmation portant sur la population.

Il ne démontre rien : il arbitre entre deux explications d'un écart observé — le hasard d'échantillonnage, ou une différence réelle.

Nulle et alternative

H_0 , l'hypothèse nulle : celle que l'on maintient par défaut. Elle contient toujours une égalité.

H_1 , l'hypothèse alternative : ce que l'on cherche à établir.

Sur notre question

$$H_0 : m = 6\,500 \qquad H_1 : m > 6\,500$$

H_0 est le statu quo : notre entreprise paie comme le secteur. H_1 est ce qu'il faudrait des preuves pour affirmer.

Le procès

L'analogie, et elle est exacte

Un test d'hypothèse est un procès, et il en a l'asymétrie.

	H_0 est vraie	H_0 est fausse
	l'accusé est innocent	l'accusé est coupable
On ne rejette pas H_0 acquittement	décision correcte $1 - \alpha$	erreur de 2 ^e espèce β — un coupable relâché
On rejette H_0 condamnation	erreur de 1 ^{re} espèce α — un innocent condamné	décision correcte $1 - \beta$, la puissance

H_0 est la présomption d'innocence.

On la maintient tant que les données ne la contredisent pas de façon flagrante.

On ne « prouve » jamais H_0 .

Un acquittement n'établit pas l'innocence : il constate que la preuve manque. De même, ne pas rejeter H_0 ne la démontre pas.

Le choix de H_0 n'est pas neutre.

On y met ce qu'on ne veut pas affirmer à tort — l'efficacité d'un médicament, la culpabilité, l'existence d'un effet.

C'est pourquoi l'on écrit « on ne rejette pas H_0 » et jamais « on accepte H_0 ». La nuance n'est pas de style.

Trois règles de rédaction

1. H_0 contient l'égalité, toujours.
2. On écrit « on **ne rejette pas** H_0 », jamais « on accepte H_0 ».
3. On place dans H_1 ce que l'on veut **établir**, et donc dans H_0 ce que l'on ne veut pas affirmer à tort.

Pourquoi la deuxième règle n'est pas une coquetterie

Un acquittement ne prouve pas l'innocence : il constate que la preuve manque.

De même, ne pas rejeter H_0 peut signifier deux choses très différentes : ou bien H_0 est vraie, ou bien l'échantillon était trop petit pour voir quoi que ce soit. **Le test ne permet pas de distinguer les deux.**

Le choix de H_0 est une décision de gestion

Deux formulations, deux industries

Un laboratoire teste un médicament. H_0 : « le médicament est sans effet ». On exige des preuves solides pour affirmer le contraire — la charge pèse sur l'innovation.

Un contrôle de sécurité teste une pièce. H_0 : « la pièce est défectueuse ». On exige des preuves pour la déclarer conforme — la charge pèse sur le producteur.

Le principe qui gouverne le choix

On place dans H_0 l'affirmation dont **l'acceptation erronée serait la plus coûteuse**.

Ce n'est pas une question statistique : c'est un arbitrage entre deux risques, et il relève de la direction, pas du calcul.

La règle de décision

La procédure, identique pour tous les tests du cours

1. Écrire H_0 et H_1 .
2. Choisir le risque α et la forme du test.
3. Calculer la **statistique de test**.
4. Lire le **seuil critique** dans la table de la loi correspondante.
5. Conclure, **en une phrase de gestion**.

Seule l'étape 3 change d'un test à l'autre

Moyenne, proportion, comparaison, ANOVA, khi-deux : les cinq étapes ne bougent jamais.

Ce qui change est la **statistique calculée** — et donc la loi à lire à l'étape 4. C'est exactement ce qu'annonçait la carte du chapitre 5.

Sa forme générale

$$\text{statistique} = \frac{\text{ce qu'on observe} - \text{ce que } H_0 \text{ prévoit}}{\text{erreur-type}}$$

Elle mesure l'écart **en nombre d'erreurs-types** : un écart de deux erreurs-types est rare sous H_0 , un écart d'un demi ne l'est pas.

Sur notre question

$$t = \frac{7\,005,80 - 6\,500}{2\,250,98/\sqrt{50}} = \frac{505,80}{318,34} = 1,589$$

Notre moyenne est à 1,589 erreur-type au-dessus de ce que la convention annonce.

Deux lectures équivalentes

Par le seuil : on rejette H_0 si la statistique dépasse la valeur critique.

Par la p -value : on rejette H_0 si $p < \alpha$.

Elles donnent toujours le même verdict

Ce sont deux façons de lire la même aire sous la même courbe.

La première était la seule possible à l'époque des tables imprimées; la seconde est celle des logiciels, et elle est plus informative — elle dit *de combien* on a franchi le seuil. Le chapitre 15 lui est consacré.

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. Un test **arbitre** entre hasard d'échantillonnage et différence réelle; il ne démontre pas.
2. H_0 contient l'égalité et se maintient par défaut; H_1 est ce que l'on veut établir.
3. On écrit « **on ne rejette pas H_0** » — jamais « on accepte ».
4. Le choix de H_0 est un **arbitrage entre deux risques**, donc une décision de gestion.
5. Cinq étapes, identiques pour tous les tests; seule change la statistique calculée.
6. Statistique = (observé — prévu par H_0) divisé par l'erreur-type : un **écart en nombre d'erreurs-types**.

La suite

Rejeter à tort, ou ne pas rejeter alors qu'il le fallait : deux erreurs opposées, que l'on ne peut pas réduire ensemble.

Le chapitre 14 les mesure — et montre que l'une se fixe tandis que l'autre se subit.