Introduction à l'analyse des données

Chapitre 11 : Le plan des individus

Jaouad Madkour

31 octobre 2026

Plan du chapitre

Placer les individus **2**
- Le principe . . . 2
- Le plan des trois cents clients . . . 3
- Ce que la position signifie . . . 3

Sur le fil rouge **4**
- Les cinq clients, calculés . . . 4
- Les cinq clients, dans le plan . . . 4
- Lire les deux axes . . . 4

Lire correctement le plan **5**
- La qualité de représentation . . . 5
- Qui est bien représenté, sur le fichier réel . . . 6
- Deux clients, deux statuts . . . 6
- La règle absolue . . . 6

La contribution d'un individu **7**
- La définition . . . 7
- Sur les cinq clients . . . 7
- Sur le fichier réel . . . 8
- Le contrôle à faire systématiquement . . . 8

Les variables illustratives **8**
- Actif et illustratif . . . 8
- La fréquence de visite, en illustratif . . . 9
- Les barycentres, calculés . . . 9
- Un usage très pratique . . . 10

Croiser les deux plans **10**
- Individus et variables ensemble . . . 10
- Le résultat que l'entreprise attend . . . 11

Sur machine **11**
- Avec R : les individus . . . 11

Avec R : la fréquence en illustratif . . . 11
Avec Python : les individus . . . 12
Avec Python : les barycentres . . . 12
Le plan tracé par matplotlib . . . 13

S'entraîner **13**
Exercice 1 : un nouveau client . . . 13
Exercice 1 : solution . . . 13
Exercice 2 : qualité et contribution . . . 14
Exercice 2 : solution . . . 14
Exercice 3 : une modalité illustrative . . . 14
Exercice 3 : solution . . . 14

Ce qu'il faut retenir **15**
Le résumé du chapitre . . . 15
La suite . . . 15

Placer les individus

Le principe

Les coordonnées factorielles

Chaque **individu** est placé selon ses coordonnées sur les axes retenus — c'est-à-dire sa **projection** sur ces axes. Sa coordonnée sur l'axe k est la valeur, pour lui, de la composante C_k du chapitre 7 :

$$F_{ik} = \sum_{j=1}^{p} u_{jk}\, z_{ij}$$

C'est la photographie de l'introduction, enfin tirée.

Deux propriétés déjà vues

La moyenne des coordonnées sur un axe est **nulle** — le nuage est centré. Leur variance est la **valeur propre** : $V(F_k) = \lambda_k$. Et les coordonnées sur deux axes différents sont **non corrélées**.

Démonstration : Les coordonnées ont pour variance la valeur propre, et les axes sont non corrélés

La coordonnée sur l'axe k est la combinaison $F_k = \sum_j u_{jk}\, z_j$ des variables réduites. Sa moyenne est $\sum_j u_{jk}\, \bar{z}_j = 0$: le nuage est centré. Pour deux axes k et l, la variance d'une combinaison (chapitre 3) donne

$$\operatorname{cov}(F_k, F_l) = \sum_j \sum_m u_{jk}\, u_{ml}\, r_{jm} = u_k'\, R\, u_l = \lambda_l\, u_k' u_l.$$

Les vecteurs propres sont orthonormés : $u_k' u_l = 0$ si $k \neq l$ et 1 si $k = l$. Par conséquent


$$\operatorname{cov}(F_k, F_l) = 0 \quad (k \neq l), \qquad V(F_k) = \lambda_k.$$

Les axes sont non corrélés, et la dispersion des individus le long de l'axe k est mesurée exactement par λ_k : une valeur propre est la variance de la composante qui lui correspond.

Sur les cinq clients, $V(F_1) = 9{,}5/5 = 1{,}9$ et $V(F_2) = 0{,}5/5 = 0{,}1$, et la covariance est nulle. *Sur les trois cents clients,* les huit coordonnées ont pour variances 4,535 ; 1,645 ; … ; 0,229, et toutes les covariances sont nulles à la précision du calcul.

■

Le plan des trois cents clients



Le même plan, vu du côté des clients.

Le cercle des corrélations disait ce que *signifient* les axes. Ce plan-ci dit *qui* se trouve où.

À droite : les clients satisfaits de tout. **À gauche** : les mécontents.

En haut : ceux qui louent l'offre et taisent le service. **En bas** : l'inverse.

Les quatre couleurs ne sont pas dans les données : elles viendront de la classification, étudiée au Master. Le nuage, lui, les suggérait déjà.

Ce que la position signifie

Quatre lectures

Position	Lecture
Proches l'un de l'autre	individus de profils semblables
Éloignés	profils différents
Loin du **centre**	individu atypique, fortement marqué
Près du **centre**	individu moyen, ou mal représenté

L'ambiguïté du centre

Un point proche de l'origine signifie soit un individu **moyen sur tout**, soit un individu **mal représenté** par ce plan. La figure seule ne tranche pas : d'où la **qualité de représentation**, plus bas.

Sur le fil rouge


Les cinq clients, calculés

Coordonnées sur les deux axes

$F_1 = (z_x + z_y)/\sqrt{2}$ et $F_2 = (z_x - z_y)/\sqrt{2}$ — les composantes du chapitre 7 :

Client	Accueil	Fidélité	F_1	F_2
1	8	4	-2	0
2	10	12	$-0{,}5$	$-0{,}5$
3	12	8	$-0{,}5$	$0{,}5$
4	14	16	1	0
5	16	20	2	0

Les cinq clients, dans le plan



Ce que la figure montre

Sur l'axe 1, les clients s'ordonnent du moins au plus satisfait : 1, puis 2 et 3 **à égalité**, puis 4 et 5. Les clients 2 et 3 ne se distinguent que sur le **second** axe.

Lire les deux axes

Les extrêmes, et les deux cas mixtes

Les clients 1 et 5 sont aux extrémités de l'axe 1 : l'un est faible sur les deux critères, l'autre fort sur les deux. Sur l'axe 2, ils sont à 0 : leurs deux notes réduites sont égales.
Le client 2 ($F_2 = -0{,}5$) est **plus fidèle qu'accueilli** ; le client 3 ($F_2 = +0{,}5$) l'inverse. C'est précisément l'information que porte l'axe à 5 %.

Une erreur de l'ancienne version du cours

L'ancien tableau rangeait le client 3 sous le client 2 sur le premier axe. Le calcul les donne **égaux** ($-0{,}5$) : leurs sommes de notes réduites sont les mêmes ($-0{,}707$). Ce sont les écarts entre leurs deux notes, non leur niveau, qui les distinguent.

Lire correctement le plan

La qualité de représentation

Le cosinus carré d'un individu

Elle mesure la part de l'inertie d'un individu **effectivement restituée** par le plan :

$$\cos_i^2 = \frac{F_{i1}^2 + F_{i2}^2}{d^2(i,G)}$$

Elle se lit comme un pourcentage : 0,85 signifie que le plan rend compte de 85 % de la position réelle de cet individu.

Démonstration : La qualité de représentation est un nombre entre zéro et un

Les coordonnées de l'individu i sur les p axes sont obtenues en tournant le repère : $F_i = U' z_i$ avec U orthogonale. Une rotation conserve la longueur, et z_i est la position de l'individu par rapport au centre de gravité (l'origine, sur données réduites), donc

$$\sum_{k=1}^{p} F_{ik}^2 = \|z_i\|^2 = d^2(i,G).$$

La part des deux premiers axes, $F_{i1}^2 + F_{i2}^2$, est une partie de cette somme de carrés : $0 \leq \cos_i^2 \leq 1$, avec $\cos_i^2 = 1$ seulement si l'individu est entièrement dans le plan. Le nom est justifié : $\cos_i^2$ est le carré du cosinus de l'angle entre le vecteur z_i et le plan.


Sur les cinq clients, $F_1^2 + F_2^2 = d^2(i,G)$: 4 ; 0,5 ; 0,5 ; 1 ; 4. *Sur le fichier réel,* le client 14 a $d^2(14,G) = 26{,}84$ et $F_1^2 + F_2^2 = 4{,}99^2 + 0{,}70^2 = 25{,}4$, d'où $\cos^2 = 0{,}95$; les trois cents valeurs de $\cos^2$ sont bien comprises entre 0 et 1, avec 251 clients au-dessus de 0,5 et 49 en dessous.

■

Sur les cinq clients, avec le seul axe 1

Client	1	2	3	4	5
F_1^2	4	0,25	0,25	1	4
$d^2(i,G)$	4	0,5	0,5	1	4
$\cos^2$ sur l'axe 1	1	0,5	0,5	1	1

Qui est bien représenté, sur le fichier réel



251 clients bien représentés, 49 mal

La qualité médiane vaut 0,77. Mais 49 clients sont représentés à moins de 50 %, et 18 à moins de 20 %. Les points orange se concentrent **près du centre**.

Deux clients, deux statuts

Les clients 3 et 2

Client	$\cos^2$	prix	choix	qualité	rapidité	conseil	accueil
3	0,96	15,2	16,1	17,1	11,5	11,3	12,7
2	0,14	10,2	11,0	14,9	10,4	15,9	14,9

Coordonnées : client 3 en (1,23 ; 2,21), client 2 en (0,28 ; −0,73). Moyennes de l'ensemble : 11,4 ; 13,2 ; 14,1 ; 12,3 ; 12,8 ; 13,9.

Ce qu'on peut dire de chacun

Le client 3 est représenté à 96 % : on peut affirmer qu'il **loue l'offre** (prix, choix, qualité) et juge le service moyen. Le client 2 n'est représenté qu'à 14 % : sa position, près du centre, ne dit rien — ses notes s'écartent de la moyenne de façon **désordonnée**, dans des directions que le plan ne montre pas.

La règle absolue

Ne jamais commenter un individu mal représenté

Un client dont la qualité vaut 0,12 apparaît quelque part sur la figure, mais cette position ne veut rien dire : il vit dans des dimensions qu'on n'a pas tracées.
C'est exactement la même prudence qu'au chapitre 10 pour les variables proches du centre — et elle est aussi souvent oubliée.

Le rappel du chapitre 9

Les clients 28 et 79, presque superposés sur le plan, étaient à 4,00 l'un de l'autre dans l'espace des huit notes. Leurs qualités (0,08 et 0,11) **interdisaient** de les dire semblables.

La contribution d'un individu

La définition

La part d'un individu dans un axe

$$\mathrm{ctr}_{ik} = \frac{F_{ik}^2}{n\,\lambda_k}$$

Elle mesure la part d'un individu dans la **construction** de l'axe k. Les contributions à un axe somment à 100 %, et leur moyenne vaut $1/n$.

Démonstration : Les contributions des individus somment à cent pour cent

Sur l'axe k, la moyenne des coordonnées est nulle et leur variance est λ_k (démonstration précédente) : $\frac{1}{n}\sum_i F_{ik}^2 = V(F_k) = \lambda_k$, c'est-à-dire

$$\sum_{i=1}^{n} F_{ik}^2 = n\,\lambda_k.$$

En divisant chaque terme par ce total, $\mathrm{ctr}_{ik} = F_{ik}^2/(n\,\lambda_k)$: les n contributions à un axe sont positives et leur somme vaut 1. Leur moyenne est donc $1/n$: un individu qui contribue autant que les autres a une contribution de $1/n$, et l'on compare chaque contribution à cette valeur.

Sur les cinq clients, $\sum_i F_1^2 = 9{,}5 = 5 \times 1{,}9$ et $\sum_i F_2^2 = 0{,}5 = 5 \times 0{,}1$; le client 1 contribue à l'axe 1 pour $4/9{,}5 = 42{,}1\,\%$. *Sur le fichier réel,* le client 14 contribue à l'axe 1 pour $24{,}9/(300 \times 4{,}535) = 1{,}83\,\%$, soit 5,5 fois la moyenne $1/300 = 0{,}33\,\%$; le client 246 contribue à l'axe 2 pour 2,69 %, soit 8 fois la moyenne.

■

Une autre question que la qualité

La qualité dit si **l'axe représente bien l'individu** ; la contribution dit si **l'individu a fabriqué l'axe**. Un individu peut être parfaitement représenté sans avoir rien construit — et l'inverse.

Sur les cinq clients

Les contributions aux deux axes

Client	1	2	3	4	5
axe 1	42,1 %	2,6 %	2,6 %	10,5 %	42,1 %
axe 2	0	50 %	50 %	0	0

Axe 1 : $F_1^2/(5 \times 1{,}9)$, par exemple $4/9{,}5 = 42{,}1\,\%$. Axe 2 : $F_2^2/(5 \times 0{,}1)$, soit $0{,}25/0{,}5 = 50\,\%$.

Deux clients ont fait l'axe 2 à eux seuls

Sur cinq individus, la moyenne est de 20 %. Les clients 1 et 5 font 84 % de l'axe 1 ; les clients 2 et 3 font **tout** l'axe 2. Avec si peu d'individus, chaque axe décrit quelques cas particuliers : c'est la limite du fil rouge.

Sur le fichier réel

Les plus gros contributeurs

Client	F_1	F_2	ctr axe 1	ctr axe 2
14	−4,99	−0,70	**1,83 %**	0,10 %
168	−4,80	0,48	1,70 %	0,05 %
246	0,94	3,64	0,06 %	**2,69 %**

La moyenne vaut $1/300 = 0{,}33\,\%$.

Aucun client ne domine

Le client 14, mécontent de tout (prix 6,2, conseil 8,3), pèse 5,5 fois la moyenne de l'axe 1 ; le client 246, l'amateur d'offre du chapitre 1, 8 fois la moyenne de l'axe 2. C'est beaucoup, mais **aucun** n'approche 10 % : les axes décrivent une structure partagée par l'ensemble des clients.

Le contrôle à faire systématiquement

Une contribution anormale

Si une contribution dépasse largement la moyenne $1/n$ — par exemple 10 ou 20 fois —, il faut se demander si cet individu est une **erreur de saisie** ou un cas réellement exceptionnel.

Refaire l'analyse sans lui

Dans les deux cas, refaire l'analyse **sans lui** et comparer les résultats. Si les axes changent complètement, le premier résultat ne décrivait pas la population : il décrivait un point. C'était le sixième client du chapitre 4, qui faisait tomber la corrélation de 0,9 à 0,035.

Les variables illustratives

Actif et illustratif


Deux rôles

Une variable **active** participe au calcul des axes. Une variable **illustrative** n'y participe pas : on la projette après coup, pour aider à l'interprétation.

Comment on projette

Une modalité qualitative (« client hebdomadaire ») se place au **barycentre** des individus qui la portent : la moyenne de leurs coordonnées.
Une variable quantitative (l'âge) se place, sur le cercle, selon ses corrélations avec les axes.

La fréquence de visite, en illustratif



Deux variables parlent, cinq se taisent.

La **fréquence**s'étire le long de l'axe 1, de −1,32 à +1,41 : *le client satisfait revient.* La **carte de fidélité**raconte la même histoire.

La CSP, le sexe et le motif de visite s'agglutinent au centre. Leurs coordonnées restent sous 0,6 en valeur absolue.

C'est un résultat, pas un échec. La satisfaction ne dépend pas de qui l'on est. Un service marketing qui segmente par âge et par CSP passe à côté de ce qui structure réellement sa clientèle.

Les barycentres, calculés

Les modalités de quatre variables

Variable	Modalité	Effectif	F_1	F_2
fréquence	hebdomadaire	101	1,41	−0,73
	mensuelle	87	0,06	0,07
	rare	112	−1,32	0,60
carte	oui	167	0,51	−0,29
	non	133	−0,64	0,37
sexe	femme / homme	162 / 138	∓0,03	±0,03

Ce que disent ces nombres

Les clients hebdomadaires sont en moyenne à 1,41 sur l'axe du niveau général : **le client satisfait revient**. Les deux sexes sont confondus avec l'origine : la satisfaction ne dépend pas du sexe.

Démonstration : Le barycentre d'une modalité est la projection du point moyen du groupe

Soit une modalité portée par n_m individus, et $\bar{z}_m = (\bar{z}_{m,1}, \dots, \bar{z}_{m,p})$ le **point moyen** de ces individus. La coordonnée de l'individu i sur l'axe k est une combinaison linéaire de ses

valeurs, $F_{ik} = \sum_j u_{jk}\, z_{ij}$. Or la moyenne d'une combinaison linéaire est la combinaison des moyennes (chapitre 2) :

$$\bar{F}_{m,k} = \frac{1}{n_m} \sum_{i \in m} \sum_j u_{jk}\, z_{ij} = \sum_j u_{jk}\, \bar{z}_{m,j}.$$

Le barycentre des coordonnées des individus du groupe est donc **la projection du point moyen du groupe** : placer une modalité au barycentre et projeter le profil moyen de ses membres sont une seule et même opération.

Les barycentres se compensent. Les coordonnées étant centrées, $\sum_i F_{ik} = 0$; en regroupant les individus par modalité, $\sum_m n_m \bar{F}_{m,k} = 0$: les barycentres, pondérés par les effectifs, ont pour moyenne l'origine.

Sur le fichier réel. Pour la fréquence de visite, sur l'axe 1 : $101 \times 1{,}411 = 142{,}5$, $87 \times 0{,}059 = 5{,}1$ et $112 \times (-1{,}318) = -147{,}6$, de somme nulle. Pour la carte : $167 \times 0{,}506 = 84{,}5$ et $133 \times (-0{,}635) = -84{,}5$.

■

Un usage très pratique

La structure d'abord, l'explication ensuite

On construit les axes sur les seules notes de satisfaction — variables actives. Puis on projette, en illustratif, la fréquence, la carte de fidélité, la CSP.
Si les clients hebdomadaires se groupent d'un côté du premier axe, on a trouvé un lien entre fréquence et satisfaction **sans que la fréquence ait construit les axes**. L'ordre inverse serait circulaire.

Les illustratives quantitatives

Leurs corrélations avec les deux axes : panier 0,20 et −0,14 ; ancienneté 0,14 et −0,04 ; âge −0,05 et −0,03. Trois flèches **près du centre** du cercle : aucune de ces variables n'est vraiment liée aux deux dimensions de la satisfaction.

Croiser les deux plans

Individus et variables ensemble

La règle de lecture conjointe

Un individu situé du côté où pointe une variable a une **valeur élevée** sur cette variable.
C'est ce qui permet de **nommer les groupes** : les individus placés là où pointent les critères de service sont les clients satisfaits du service.

Une précaution sur la superposition

Les deux nuages ne vivent pas dans le même espace — l'un dans $\mathbb{R}^p$, l'autre dans $\mathbb{R}^n$, comme au chapitre 5.
Les superposer sur une même figure est une **commodité de lecture**, pas une identité ma-

thématique. On lit des **directions**, jamais des distances entre un individu et une variable.

Le résultat que l'entreprise attend

Quatre profils, et une figure

Au terme de l'analyse, on sait dire : *il existe des clients satisfaits de tout, des clients déçus de tout, et, à niveau égal, des clients sensibles à l'offre et d'autres attachés au service* — et l'on sait montrer sur quelle figure cela se lit.
C'est un résultat descriptif, obtenu sans avoir posé aucune hypothèse. Le vérifier, le tester, en tirer une politique commerciale relève d'autres cours.

Sur le fichier réel

Les clients hebdomadaires et porteurs de la carte se placent du côté des satisfaits, et légèrement du côté du **service** ($F_2 < 0$) ; les clients rares, du côté des déçus et de l'**offre**.

Sur machine

Avec R : les individus


Coordonnées, qualités et contributions

```
clients <- read.csv("clients.csv", stringsAsFactors = TRUE)
acp <- PCA(clients[, c(notes, "frequence")], quali.sup = 9,
           graph = FALSE)      # colonne 9 illustrative
ind <- cbind(acp$ind$coord[, 1:2],
             cos2 = rowSums(acp$ind$cos2[, 1:2]),
             ctr1 = acp$ind$contrib[, 1])
round(ind[c(2, 14, 36, 246), ], 2)
#     Dim.1 Dim.2 cos2 ctr1
# 2    0.28  0.73 0.14 0.01
# 14  -4.99  0.70 0.95 1.83
# 36   0.91  2.15 0.90 0.06
# 246  0.94 -3.64 0.89 0.06
```

Avec R : la fréquence en illustratif

Les barycentres, puis la figure

```
round(acp$quali.sup$coord[, 1:2], 2)
#              Dim.1 Dim.2
# Hebdomadaire  1.41  0.73
# Mensuelle     0.06 -0.07
# Rare         -1.32 -0.60
plot(acp, choix = "ind", habillage = 9, label = "quali")
```



Avec Python : les individus

Coordonnées, qualités et contributions

```
X = clients[notes]
Z = ((X - X.mean()) / X.std(ddof=0)).to_numpy()
lam, U = np.linalg.eigh(np.corrcoef(Z.T))
lam, U = lam[::-1], U[:, ::-1]
U = U * np.sign(U[0])                    # prix positif sur chaque axe
F = Z @ U                                # coordonnées des individus
cos2 = (F[:, :2] ** 2).sum(axis=1) / (Z ** 2).sum(axis=1)
ctr1 = 100 * F[:, 0] ** 2 / (len(Z) * lam[0])
print(round(ctr1.max(), 2), clients.id[ctr1.argmax()])   # 1.83 14
print((cos2 < 0.5).sum())                                # 49
```

Avec Python : les barycentres


Un groupby suffit

```
bary = pd.DataFrame(F[:, :2], columns=["F1", "F2"])
print(bary.groupby(clients.frequence).mean().round(2))
#                  F1    F2
# frequence
# Hebdomadaire  1.41 -0.73
# Mensuelle     0.06  0.07
# Rare         -1.32  0.60
```

Un barycentre est une moyenne

Projeter une modalité illustrative, c'est **moyenner** les coordonnées des individus qui la portent : `groupby` puis `mean`. Avec la convention du cours, les hebdomadaires sont en bas, côté service.

Le plan tracé par matplotlib



Un nuage, trois couleurs, trois barycentres

Les carrés sont les barycentres des trois fréquences : 1,41, 0,06 et $-1{,}32$ sur l'axe 1.

S'entraîner

Exercice 1 : un nouveau client

Projeter un individu supplémentaire

Un sixième client note l'accueil 13 et la fidélité 9. On le projette sur les axes des cinq clients, sans refaire l'analyse.

1. Calculer ses valeurs réduites (moyennes 12 et 12, écarts-types 2,83 et 5,66).
2. Calculer ses coordonnées F_1 et F_2.
3. Est-il bien représenté par le seul axe 1 ? Que dit l'axe 2 de lui ?

Exercice 1 : solution

Un client mal représenté par l'axe 1

1. $z_x = 1/2{,}83 = 0{,}354$; $z_y = -3/5{,}66 = -0{,}530$.
2. $F_1 = (0{,}354 - 0{,}530)/\sqrt{2} = -0{,}125$; $F_2 = (0{,}354 + 0{,}530)/\sqrt{2} = 0{,}625$.
3. $\cos^2$ sur l'axe 1 : $0{,}0156/(0{,}0156 + 0{,}391) = 0{,}04$. **Très mal représenté** : il n'est ni satisfait ni mécontent dans l'ensemble, mais il est nettement **mieux accueilli que fidèle** ($F_2 = 0{,}625$, plus que le client 3). Il est tout entier sur l'axe à 5 %.

Exercice 2 : qualité et contribution

Trois clients du fichier réel

Client	F_1	F_2	$d^2(i,G)$
4	$-3{,}30$	$-0{,}82$	13,55
36	0,91	$-2{,}15$	6,01
246	0,94	3,64	15,88

1. Calculer la qualité de représentation de chacun sur le plan.
2. Calculer leur contribution à l'axe 2 ($n = 300$, $\lambda_2 = 1{,}645$).
3. Lequel pèse le plus dans l'axe 2 ? Est-ce inquiétant ?

Exercice 2 : solution

Bien représentés, sans dominer

1. Client 4 : $(10{,}89 + 0{,}67)/13{,}55 = 0{,}85$. Client 36 : $(0{,}83 + 4{,}62)/6{,}01 = 0{,}91$. Client 246 : $(0{,}88 + 13{,}25)/15{,}88 = 0{,}89$.
2. Dénominateur $300 \times 1{,}645 = 493{,}5$. Client 4 : $0{,}67/493{,}5 = 0{,}14\,\%$; client 36 : $4{,}62/493{,}5 = 0{,}94\,\%$; client 246 : $13{,}25/493{,}5 = \mathbf{2{,}7}\,\%$.
3. Le client 246, huit fois la moyenne (0,33 %). Ce n'est pas inquiétant : 2,7 % ne suffit pas à fabriquer un axe, et son profil (offre excellente, service médiocre) est bien celui que l'axe décrit.

Exercice 3 : une modalité illustrative

Un barycentre à la main

Parmi les cinq clients du fil rouge, les clients 1, 2 et 3 n'ont pas la carte de fidélité ; les clients 4 et 5 l'ont.

1. Calculer les barycentres des deux modalités sur les deux axes.
2. Vérifier que la moyenne pondérée des deux barycentres est nulle.
3. Interpréter.

Exercice 3 : solution

La carte du côté des satisfaits

1. Sans carte : $F_1 = (-2 - 0{,}5 - 0{,}5)/3 = -1$, $F_2 = (0 - 0{,}5 + 0{,}5)/3 = 0$. Avec carte : $F_1 = (1 + 2)/2 = 1{,}5$, $F_2 = 0$.
2. $(3 \times (-1) + 2 \times 1{,}5)/5 = 0$: les barycentres pondérés par les effectifs retombent sur le centre, puisque les coordonnées sont centrées.
3. Les porteurs de carte sont du côté **satisfait** de l'axe 1, comme sur le fichier réel (0,51 contre $-0{,}64$). La carte n'a pas servi à construire l'axe : le lien est une **découverte**, non un artefact.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Les individus sont placés selon leurs **projections** $F_{ik} = \sum_j u_{jk} z_{ij}$; sur le fil rouge, $(-2\,;0)$, $(-0{,}5\,;-0{,}5)$, $(-0{,}5\,;0{,}5)$, $(1\,;0)$, $(2\,;0)$.
2. Un point **central** est soit moyen, soit mal représenté — la figure ne tranche pas.
3. La **qualité de représentation** ($\cos^2$) décide de ce qu'on a le droit de commenter : 49 clients sur 300 sont sous 0,5.
4. La **contribution** $F_{ik}^2/(n\lambda_k)$ dit qui a construit l'axe ; au plus 1,83 % et 2,69 % sur nos axes, pour une moyenne de 0,33 %.
5. Les variables **illustratives** se projettent après coup : les clients hebdomadaires à 1,41, les rares à $-1{,}32$.
6. On lit individus et variables ensemble par **directions**, jamais par distances croisées.

La suite

Et les variables qualitatives ?

Tout ce qui précède suppose des variables **quantitatives**. Que faire d'un tableau de catégories — CSP, motif de visite, canal d'achat ?

Le chapitre 12

La réponse commence par un test que vous connaissez déjà, le khi-deux, appliqué au croisement de la CSP et du motif de visite des trois cents clients.