Introduction à l'analyse des données

Chapitre 8 : Axes, valeurs propres et inertie expliquée

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 22 octobre 2026

Plan du chapitre

La solution du problème

Le calcul sur le fil rouge

Ce qui rend tout lisible

Le fichier réel

Ce que valent les valeurs

Sur machine

S'entraîner

Ce qu'il faut retenir

La solution du problème

Le théorème central de l'ACP

Les **axes principaux** sont les **vecteurs propres** de la matrice des corrélations R.

L'**inertie portée** par chaque axe est la **valeur propre** associée.

Un résultat du cours d'Algèbre linéaire

C'est le chapitre « Diagonalisation des matrices carrées » du cours d'*Algèbre linéaire*. L'ACP n'est donc pas une méthode statistique nouvelle : **c'est une diagonalisation**. Le problème d'optimisation du chapitre 7 se ramène exactement à ce calcul.

La définition

Un vecteur u non nul est **vecteur propre** de la matrice R, de **valeur propre** λ, si


$$R\,u = \lambda\,u$$

La matrice ne fait pas **tourner** u : elle se contente de l'étirer (ou de le contracter) d'un facteur λ.

Sur la matrice du fil rouge

$$\begin{pmatrix} 1 & 0{,}9 \\ 0{,}9 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}9 \\ 1{,}9 \end{pmatrix} = 1{,}9 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0{,}9 \\ 0{,}9 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0{,}1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ce que fait la matrice, en image



Le cercle devient une ellipse

R transforme le cercle unité en une **ellipse** dont les axes sont les deux bissectrices, de demi-longueurs $1{,}9$ et $0{,}1$. Un vecteur quelconque, comme $v = (1\,;\,0)$, est **tourné** vers la diagonale ; les deux vecteurs propres, eux, gardent leur direction.

La forme du nuage est dans R

La matrice des corrélations décrit la forme du nuage. Ses directions propres sont celles selon lesquelles il s'étire, et les valeurs propres mesurent de combien.

Chercher la direction d'allongement maximal, c'est donc chercher le vecteur propre de plus grande valeur propre. **Le problème du photographe a une solution exacte, et elle se calcule.**

Le lien avec le chapitre 7

L'inertie projetée sur une direction u de longueur 1 s'écrit $I(u) = u' R\, u$ — c'est la formule $a^2 + b^2 + 2ab\, r$ du chapitre 7, écrite avec la matrice. Si u est vecteur propre, $u' R u = \lambda\, u' u = \lambda$: **l'inertie portée par l'axe est sa valeur propre**.

Le calcul sur le fil rouge

Trouver les valeurs propres

$Ru = \lambda u$ avec $u \neq 0$ exige que $R - \lambda I$ ne soit pas inversible :

$$\det(R - \lambda I) = 0$$

Sur la matrice du fil rouge

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0{,}9 \\ 0{,}9 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2 - 0{,}81 = 0 \iff 1 - \lambda = \pm 0{,}9$$

$$\lambda_1 = 1 + 0{,}9 = \mathbf{1{,}9} \qquad \lambda_2 = 1 - 0{,}9 = \mathbf{0{,}1}$$

Résoudre $Ru = \lambda u$

Pour $\lambda_1 = 1{,}9$: $u_1 + 0{,}9\,u_2 = 1{,}9\,u_1$ donne $u_2 = u_1$. Normé à 1 : $u_1 = (1\,;\,1)/\sqrt{2}$.

Pour $\lambda_2 = 0{,}1$: $u_1 + 0{,}9\,u_2 = 0{,}1\,u_1$ donne $u_2 = -u_1$. Normé : $u_2 = (1\,;\,-1)/\sqrt{2}$.

Axe	Valeur propre	Direction	Sens
1	1,9	$(1\,;\,1)/\sqrt{2}$	les deux critères **ensemble**
2	0,1	$(1\,;\,-1)/\sqrt{2}$	les deux critères **en opposition**

Deux axes, deux sens

Le **premier axe** porte les deux variables dans le même sens : c'est la **satisfaction globale**. Un client qui monte sur cet axe juge bien l'accueil *et* se montre fidèle.

Le **deuxième** les oppose : il distingue les clients dont les deux notes s'écartent l'une de l'autre. Comme il ne porte que $0{,}1$ d'inertie, ces cas sont rares — ce que le $r = 0{,}9$ laissait prévoir.

Ce sont les axes trouvés en faisant tourner

La diagonale du chapitre 7, qui conservait $1{,}9$, et l'anti-diagonale, qui conservait $0{,}1$. **Le calcul algébrique retrouve, sans essayer aucun angle, ce que l'expérience avait trouvé à tâtons.**

Trace et déterminant

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_p = \mathrm{trace}(R) = p \qquad \lambda_1 \times \lambda_2 \times \cdots \times \lambda_p = \det(R)$$

Sur le fil rouge

$\lambda_1+\lambda_2 = 1{,}9+0{,}1 = 2 = p$ ✓ $\qquad$ $\lambda_1\lambda_2 = 1{,}9\times0{,}1 = 0{,}19 = 1-0{,}81 = \det R$ ✓

Si la somme ne tombe pas sur p, le calcul est faux.

Les cinq clients sans réduction

On diagonalise la matrice des **covariances** du chapitre 3 :

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 8 & 14{,}4 \\ 14{,}4 & 32 \end{pmatrix} \qquad \lambda_1 = 38{,}75, \quad \lambda_2 = 1{,}26 \qquad (96{,}9\,\% \text{ et } 3{,}1\,\%)$$

Le premier axe a pour direction $(0{,}42\,;\ 0{,}91)$: il suit **presque uniquement la fidélité**.

Un résultat trompeur

$96{,}9\,\%$ semble mieux que $95\,\%$. C'est une illusion : l'axe colle à la fidélité parce qu'elle a la plus grande variance, non parce qu'il résume mieux les deux critères. Avec un panier en dirhams, il collerait au panier. **L'ACP normée, sur R, est la règle** dès que les unités ou les dispersions diffèrent.

Ce qui rend tout lisible

Le résultat

$$\sum_{k=1}^{p} \lambda_k = I = p$$

La somme des valeurs propres est l'inertie totale, donc le nombre de variables. C'est le contrôle de la trace, et c'est le chapitre 6 : chaque variable réduite apporte une unité d'inertie.

L'inertie expliquée

$$\text{part de l'axe } k = \frac{\lambda_k}{p}$$

Deux axes

Axe	Valeur propre	Part	Cumul
1	1,9	**95** %	95 %
2	0,1	5 %	100 %

Un seul axe conserve 95 % de l'information du tableau. Représenter les cinq clients sur cette unique droite ne perd que 5 % — et fait passer de deux dimensions à une.

Le chameau, résolu

C'est la réponse chiffrée à l'introduction. Le « bon angle » existe, il se calcule, et l'on sait **exactement** ce qu'il conserve.

Le photographe n'avait que son œil. L'analyse des données a un nombre.

Le fichier réel

Les huit valeurs propres

L'ACP normée des huit notes des 300 clients

Axe	λ_k	Part	Cumul
1	4,535	56,69 %	56,69 %
2	1,645	20,57 %	77,26 %
3	0,382	4,77 %	82,03 %
4	0,349	4,37 %	86,40 %
5	0,327	4,09 %	90,49 %
6	0,283	3,54 %	94,02 %
7	0,249	3,11 %	97,14 %
8	0,229	2,86 %	100 %

Les contrôles

$4{,}535 + 1{,}645 + 0{,}382 + 0{,}349 + 0{,}327 + 0{,}283 + 0{,}249 + 0{,}229 = 8{,}000$: la somme vaut bien p. Et chaque part est $\lambda_k / 8$: $4{,}535 / 8 = 56{,}69\,\%$.

Deux dimensions, puis du bruit

Le premier axe porte à lui seul plus de la moitié de l'information : c'est le **niveau général** de satisfaction du chapitre 7. Le deuxième en ajoute un cinquième : l'**offre contre le service**. Les six suivants se partagent les $23\,\%$ restants presque également, **sans structure** : c'est la signature du bruit, que le chapitre 9 apprendra à reconnaître.

Les coefficients : longueur 1, axes orthogonaux

Note	u_1	u_2
prix	$0{,}295$	$0{,}486$
choix	$0{,}362$	$0{,}342$
qualité	$0{,}377$	$0{,}296$
agencement	$0{,}389$	$0{,}189$
propreté	$0{,}389$	$-0{,}099$
rapidité	$0{,}349$	$-0{,}371$
conseil	$0{,}334$	$-0{,}414$
accueil	$0{,}323$	$-0{,}453$

Ce que valent les valeurs

Trois configurations

Lire le spectre des valeurs propres

Configuration	Ce qu'elle signifie
λ_1 très grande, les autres faibles	une **dimension dominante**
décroissance régulière	plusieurs dimensions utiles
toutes proches de 1	variables **non corrélées** : rien à résumer

Le dernier cas mérite d'être reconnu tout de suite

Si toutes les valeurs propres avoisinent 1, la matrice des corrélations est proche de l'identité : chaque variable porte une information propre. Il n'y a alors **rien à résumer** — et le constater est un résultat, pas un échec. Sur les huit variables simulées du chapitre 7, elles allaient de $0{,}81$ à $1{,}26$.

Le seuil de 1

Sur données réduites, une valeur propre supérieure à 1 signifie que l'axe porte **plus d'inertie qu'une variable seule**.

Un axe sous ce seuil résume donc moins bien qu'une variable isolée : c'est le fondement du critère de Kaiser.

Sur nos deux tableaux

Cinq clients : $\lambda_1 = 1{,}9 > 1$, $\lambda_2 = 0{,}1 < 1$ — un axe. Trois cents clients : $4{,}535$ et $1{,}645$ dépassent 1, la troisième ($0{,}382$) en est loin — deux axes.

Sur machine

Le code et sa sortie

```
library(FactoMineR)
# clients et notes : lus et définis comme au chapitre 6
acp <- PCA(clients[, notes], graph = FALSE)   # normée par défaut
e <- acp$eig
colnames(e) <- c("valeur", "pct", "cumul")
round(e, 2)
#        valeur   pct  cumul
# comp 1   4.54 56.69  56.69
# comp 2   1.65 20.57  77.26
# comp 3   0.38  4.77  82.03
#   ...    (cinq lignes de plus, jusqu'à 100.00)
sum(e[, "valeur"])                              # [1] 8
```

Les deux premiers axes

```
round(acp$svd$V[, 1:2], 3)
#       [,1]   [,2]
# [1,] 0.295 -0.486
# [2,] 0.362 -0.342
# [3,] 0.377 -0.296
# [4,] 0.389 -0.189
# [5,] 0.389  0.099
# [6,] 0.349  0.371
# [7,] 0.334  0.414
# [8,] 0.323  0.453
```

Le signe d'un axe est arbitraire

FactoMineR retourne le second axe

`FactoMineR` donne le second axe avec le **signe opposé** au nôtre : le prix à $-0{,}486$, l'accueil à $+0{,}453$. Si u est vecteur propre, $-u$ l'est aussi, avec la même valeur propre : **les deux réponses sont justes**.

Ce que cela change, et ce que cela ne change pas

	Ce cours	FactoMineR
coefficient du prix sur l'axe 2	$0{,}486$	$-0{,}486$
client 36 sur l'axe 2	$-2{,}15$	$2{,}15$
inertie de l'axe 2	$1{,}645$	$1{,}645$

Retourner un axe échange seulement le haut et le bas de la figure. On garde ici la convention des figures du cours : **l'offre en haut**.

eigh diagonalise une matrice symétrique, par ordre croissant

```
import numpy as np
import pandas as pd
clients = pd.read_csv("clients.csv")
notes = ["prix", "choix", "qualite", "agencement",
         "proprete", "rapidite", "conseil", "accueil"]
R = clients[notes].corr().to_numpy()
lam, U = np.linalg.eigh(R)            # ordre croissant
lam = lam[::-1]
print(lam.round(3), lam.sum().round(3))
# [4.535 1.645 0.382 0.349 0.327 0.283 0.249 0.229] 8.0
print((100 * lam / 8).round(2))
# [56.69 20.57  4.77  4.37  4.09  3.54  3.11  2.86]
```

La classe PCA

```
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
Z = StandardScaler().fit_transform(clients[notes])
acp = PCA().fit(Z)
print(acp.explained_variance_[:2].round(3))          # [4.55  1.651]
print((100 * acp.explained_variance_ratio_[:2]).round(2))
# [56.69 20.57]
```

Le diviseur, une dernière fois

`scikit-learn` réduit en n, mais calcule la variance des composantes en $n-1$: $4{,}535 \times 300/299 = 4{,}550$. Les **pourcentages**, eux, sont identiques. C'est la raison de lire une ACP en parts d'inertie plutôt qu'en valeurs brutes.

S’entraîner

Diagonaliser à la main

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}6 \\ 0{,}6 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Écrire et résoudre l'équation caractéristique.
2. Donner les vecteurs propres normés.
3. Vérifier la somme et le produit des valeurs propres ; donner la part de chaque axe.

1,6 et 0,4

1. $(1-\lambda)^2 - 0{,}36 = 0$, donc $1-\lambda = \pm 0{,}6$: $\lambda_1 = 1{,}6$ et $\lambda_2 = 0{,}4$.
2. Les mêmes bissectrices : $(1\,;\,1)/\sqrt{2}$ et $(1\,;\,-1)/\sqrt{2}$. Pour **toute** matrice 2×2 de corrélation, les axes sont les bissectrices ; seules les valeurs propres changent.
3. Somme $2 = p$; produit $0{,}64 = 1 - 0{,}36 = \det R$. Parts : $80\,\%$ et $20\,\%$ — ce que l'exercice 1 du chapitre 7 avait trouvé en maximisant.

Un bloc et une variable isolée

Trois notes ont pour matrice des corrélations

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}8 & 0 \\ 0{,}8 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que $(1;1;0)$, $(0;0;1)$ et $(1;-1;0)$ sont vecteurs propres, et donner leurs valeurs propres.
2. Donner la part de chaque axe. Combien d'axes dépassent 1 ?
3. Interpréter.

1,8 ; 1 ; 0,2

1. $R(1;1;0) = (1{,}8;1{,}8;0) : \lambda = 1{,}8$. $R(0;0;1) = (0;0;1) : \lambda = 1$. $R(1;-1;0) = (0{,}2;-0{,}2;0) : \lambda = 0{,}2$. Somme $3 = p$.
2. $60\,\%$, $33{,}3\,\%$, $6{,}7\,\%$. Un seul axe **dépasse** 1 ; le deuxième est exactement à 1.
3. Le premier axe résume le **bloc** des deux notes liées ; le deuxième est la troisième note **seule**, qui n'est liée à rien et ne peut être résumée par personne.

Une ligne a été effacée

Une ACP normée sur cinq variables affiche les valeurs propres $2{,}60$; $1{,}20$; ? ; $0{,}30$; $0{,}15$.

1. Retrouver la valeur manquante.
2. Calculer les parts et les parts cumulées.
3. Le logiciel affiche une première valeur propre de $2{,}613$ au lieu de $2{,}60$ et a été lancé sur 200 individus. Que s'est-il passé ?

La somme vaut p

1. La somme vaut $p = 5 : 5 - (2{,}60 + 1{,}20 + 0{,}30 + 0{,}15) = 0{,}75$.
2. Parts : 52 ; 24 ; 15 ; 6 ; $3\,\%$. Cumul : 52 ; 76 ; 91 ; 97 ; $100\,\%$.
3. Le logiciel divise par $n - 1$: $2{,}60 \times 200/199 = 2{,}613$. Les parts ne changent pas.

Ce qu’il faut retenir

Six points

1. Les axes principaux sont les **vecteurs propres** de R ; l'inertie portée par un axe est sa **valeur propre** ($u'Ru = \lambda$).
2. Sur le fil rouge : $\det(R - \lambda I) = (1-\lambda)^2 - 0{,}81 = 0$, d'où $\lambda_1 = 1{,}9$ et $\lambda_2 = 0{,}1$, de directions $(1\,;\,1)$ et $(1\,;\,-1)$.
3. **Somme des valeurs propres** $= p$, produit $= \det R$: deux contrôles systématiques.
4. Le premier axe conserve $1{,}9/2 = \mathbf{95}\,\%$; sans réduction, l'axe suivrait la fidélité seule.
5. Sur les 300 clients : $4{,}535$ et $1{,}645$, soit $56{,}7\,\%$ et $20{,}6\,\% - 77{,}3\,\%$ sur deux axes.
6. Le signe d'un axe est arbitraire ; R et `scikit-learn` peuvent différer en signe ou en diviseur, jamais en parts.

Combien d'axes garder

Avec deux variables, le choix était simple. Avec huit, il faut décider **combien d'axes retenir** — et c'est le chapitre 9.

Ce qu'on y fera

On appliquera trois critères aux huit valeurs propres du fichier réel — Kaiser, le coude, le pourcentage cumulé — et l'on verra s'ils s'accordent sur deux axes.