Statistique inférentielle

Chapitre 15 : Tester une moyenne, tester une proportion

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 31 octobre 2026

Plan du chapitre

Le test d'une moyenne

Lien avec l'intervalle

Le test d'une proportion

Choisir le bon test

S'entraîner

Ce qu'il faut retenir

Le test d’une moyenne

Une valeur de référence, un échantillon

La convention collective fixe un salaire de référence de $6\,500$ dirhams. Un délégué soutient que le salaire moyen de l'entreprise le dépasse.

On dispose de l'échantillon de 50 salariés : $\overline{x} = 7\,005{,}80$, $s = 2\,250{,}98$.


La question type de ce chapitre

Un paramètre inconnu, une valeur annoncée m_0 ou p_0, et une question : **l'écart observé dépasse-t-il ce que le hasard explique ?**

C'est la situation la plus simple, et elle reprend tout ce que les chapitres 12 à 14 ont construit.

Le cas limite, en entier

la convention du secteur annonce 6 500 dirhams : notre entreprise paie-t-elle davantage ?



loi de Student à 49 degrés de liberté

Les cinq étapes, sur nos données

1. $H_0 : m = 6\,500$ contre $H_1 : m > 6\,500$
2. $\alpha = 5\,\%$, unilatéral à droite
3. $t = \dfrac{7\,005{,}80 - 6\,500}{2\,250{,}98/\sqrt{50}} = 1{,}589$
4. seuil $t_{0{,}95\,;49} = 1{,}677$
5. $1{,}589 < 1{,}677$: **on ne rejette pas**

Le cas le plus instructif du cours.
$p = 0{,}059$. À 5 % on ne conclut pas ; à 10 % on conclurait. Le seuil n'est pas une frontière naturelle, c'est une convention.

La bonne conclusion n'est pas « les salaires sont égaux à 6 500 », mais « les données ne suffisent pas à établir qu'ils sont supérieurs ».

Le test de la moyenne

$$t = \frac{\overline{x} - m_0}{s/\sqrt{n}} \sim \text{Student à } n-1 \text{ degrés de liberté}$$

Si σ était connu, on lirait la table normale — mais ce n'est jamais le cas.

Les cinq étapes appliquées

1. $H_0 : m = 6\,500$ contre $H_1 : m > 6\,500$.
2. $\alpha = 5\,\%$, test unilatéral à droite.
3. $t = (7\,005{,}80 - 6\,500)/318{,}34 = 1{,}589$.
4. Seuil : $t_{0{,}95\,;49} = 1{,}677$.
5. $1{,}589 < 1{,}677$: on ne rejette pas H_0 ($p = 0{,}059$).

Quand la loi de Student est-elle juste ?

1. Les observations sont **indépendantes** : tirage aléatoire, avec remise ou à faible taux de sondage.
2. La population est **normale**, ou n est assez grand pour que le théorème central limite joue.

Sur nos salaires

La population est étirée à droite. À $n = 50$, la simulation du chapitre 14 donne un risque réel de $3{,}5\,\%$ pour un risque affiché de $5\,\%$: le test est un peu **prudent**, sans plus.

Avec $n = 5$, l'écart serait bien plus grand (chapitre 4). On regarde toujours l'histogramme avant de tester.

La conclusion, rédigée

La phrase à écrire

« Au seuil de $5\,\%$, les données ne permettent pas d'affirmer que le salaire moyen de l'entreprise dépasse celui de la convention. »

Et non : « le salaire moyen est de $6\,500$ dirhams », qui serait une acceptation de H_0.

Ce que le gestionnaire doit ajouter

$p = 0{,}059$: on est passé tout près. Et l'écart estimé, $+506$ dirhams, est loin d'être négligeable économiquement.

La bonne recommandation n'est pas de clore le dossier, c'est d'élargir l'échantillon.

Ce qu'apporterait un échantillon de cent

Deux calculs

Si l'on retrouvait la même moyenne et le même écart-type avec $n = 100$: erreur-type $2\,251/10 = 225$, $t = 506/225 = 2{,}25$ et $p = 0{,}013$. On rejetterait.

Plus solidement, le chapitre 13 donne la puissance à $n = 100$ face à l'écart réel : $0{,}81$, contre $0{,}55$ à $n = 50$.

Le premier calcul ne suffit pas

Rien ne garantit qu'un nouvel échantillon donnerait encore $7\,006$: il pourrait donner moins, ou plus.

C'est pourquoi on raisonne en **puissance** : elle tient compte de la variabilité du futur échantillon, ce que ne fait pas le « même écart, plus d'observations ».

Trois questions, trois p-values

Question posée	H_1	p-value	à $5\,\%$
le salaire dépasse-t-il $6\,500$?	$m > 6\,500$	$0{,}059$	non-rejet
diffère-t-il de $6\,500$?	$m \neq 6\,500$	$0{,}119$	non-rejet
diffère-t-il de $6\,000$?	$m \neq 6\,000$	$0{,}003$	rejet
diffère-t-il de $8\,000$?	$m \neq 8\,000$	$0{,}003$	rejet

Ce que l'on peut dire de m

Les données excluent nettement $6\,000$ et $8\,000$; elles ne permettent pas d'exclure $6\,500$.

Tester une à une des valeurs de m_0, c'est reconstruire, morceau par morceau, un intervalle de confiance.

Lien avec l’intervalle

L'équivalence

Pour un test **bilatéral** au seuil α :

$$\text{rejeter } H_0 : m = m_0 \quad \Longleftrightarrow \quad m_0 \notin \mathrm{IC}_{1-\alpha}$$

La démonstration tient en une ligne

On ne rejette pas si $|\overline{x} - m_0| \leq t_{1-\alpha/2}\, s/\sqrt{n}$, c'est-à-dire si

$$\overline{x} - t_{1-\alpha/2}\,\frac{s}{\sqrt{n}} \;\leq\; m_0 \;\leq\; \overline{x} + t_{1-\alpha/2}\,\frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Ce sont exactement les bornes de l'intervalle de Student du chapitre 9.

L'intervalle et les tests

$\text{IC}_{95\,\%} = [\,6\,365{,}94\,;\,7\,645{,}66\,]$.

$6\,500$ est **dedans** : le test bilatéral ne rejette pas. Et de fait, $p_{\text{bilatéral}} = 0{,}119 > 0{,}05$.


$6\,000$ et $8\,000$ sont **dehors** : le test les rejette, avec $p = 0{,}003$.

Et la vraie moyenne

$m = 7\,158$ est dans l'intervalle : le test de $H_0 : m = 7\,158$ ne la rejetterait pas ($p = 0{,}63$).

Heureusement : un test qui rejetterait la vraie valeur commettrait une erreur de première espèce.

Un test pour chaque valeur



L'intervalle contient tous les tests à la fois

Un intervalle de confiance est l'ensemble des valeurs de m_0 que le test **ne rejetterait pas**.

Il répond donc à une infinité de questions en une seule lecture, là où un test n'en traite qu'une.

Pourquoi les revues demandent l'intervalle

Il donne le verdict du test **et** l'ampleur de l'effet **et** sa précision, en trois nombres.

La p-value seule n'en donne qu'un, et le moins informatif des trois. C'est pourquoi de nombreuses revues demandent désormais de publier les intervalles, et pas seulement les p-values.

Un test unilatéral, une borne

Le test unilatéral à droite au seuil α rejette $H_0 : m = m_0$ si et seulement si m_0 est **sous la borne basse**

$$\overline{x} - t_{1-\alpha}\, s/\sqrt{n}.$$

Sur nos données

Borne basse à $95\,\%$: $7\,005{,}80 - 1{,}677 \times 318{,}34 = 6\,472{,}1$ (chapitre 12).

$6\,500$ est au-dessus : non-rejet. Toute valeur de référence inférieure à $6\,472$ aurait été rejetée.

Le test d’une proportion

Le test de la proportion

$$z = \frac{f - p_0}{\sqrt{\dfrac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0\,;1)$$

valable si $np_0 \geq 5$ et $n(1-p_0) \geq 5$.

Un détail qui compte

Au dénominateur figure p_0, la valeur de H_0 — pas f.

Sous H_0, la vraie proportion vaut p_0 : c'est donc elle qui donne l'écart-type. C'est la différence avec l'intervalle de Wald du chapitre 10, où l'on utilisait f faute de mieux.

La direction annonce quinze pour cent de Bac+5

1. $H_0 : p = 0{,}15$ contre $H_1 : p \neq 0{,}15$.
2. $\alpha = 5\,\%$, bilatéral. Conditions : $50 \times 0{,}15 = 7{,}5 \geq 5$ et $50 \times 0{,}85 = 42{,}5 \geq 5$.
3. $f = 13/50 = 0{,}26$ et $z = \dfrac{0{,}26 - 0{,}15}{\sqrt{0{,}15 \times 0{,}85/50}} = \dfrac{0{,}11}{0{,}0505} = 2{,}178$.
4. Seuil : $1{,}96$.
5. $2{,}178 > 1{,}96$: **on rejette** H_0, avec $p = 0{,}029$.

La conclusion de gestion

« Au seuil de $5\,\%$, la part de diplômés Bac+5 diffère significativement du chiffre annoncé par la direction. »


L'échantillon suggère $26\,\%$ contre $15\,\%$ annoncés. La vraie valeur, que ce cours seul permet de connaître, est $21{,}4\,\%$: le test avait raison de rejeter $0{,}15$.

Deux tests, deux issues, même échantillon

Sur la moyenne, on ne rejette pas ; sur la proportion, on rejette.

Il n'y a là aucune contradiction : ce sont deux questions différentes, sur deux paramètres différents. **Un test ne juge que ce qu'on lui demande de juger.**

Le dénominateur change la conclusion



Ce que montre la figure

Deux tests pour la même question

Avec f au dénominateur (test de Wald), $z = 0{,}11/0{,}0620 = 1{,}77$ et $p = 0{,}076$: on **ne rejetterait pas** $0{,}15$.

C'est cohérent avec l'intervalle de Wald $[0{,}138\,;\ 0{,}382]$, qui contient $0{,}15$.

Le bon couple : test du score et intervalle de Wilson

L'ensemble des p_0 que le test du cours ne rejette pas est **l'intervalle de Wilson** $[0{,}159\,;\ 0{,}396]$ du chapitre 10 : il exclut $0{,}15$.

L'équivalence test–intervalle est donc exacte pour une proportion à condition d'utiliser Wilson.

Le chapitre 10 l'avait préféré pour sa couverture ; voici une seconde raison.

Quand n est petit : la loi binomiale

Sous H_0, le nombre de Bac+5 suit $\mathcal{B}(50\,;\,0{,}15)$. La p-value unilatérale se calcule directement :

$$P(X \geq 13) = 0{,}030.$$

En bilatéral, le test binomial exact donne $p = 0{,}044$.

L'approximation normale est optimiste

z donnait $0{,}015$ en unilatéral, environ deux fois moins que le calcul exact ($0{,}030$), et $0{,}029$ en bilatéral, contre $0{,}044$ pour le test exact.

Avec $np_0 = 7{,}5$, on est près de la limite des conditions. La conclusion à $5\,\%$ reste la même, mais **de justesse** : un logiciel propose toujours le test exact.

Dix échantillons, un seul rejet

Le test de p = 0,15 sur les dix échantillons systématiques

Nombre de Bac+5 sur 50	9	10	11	12	13
échantillons	2	2	4	1	1
p-value bilatérale	0,55	0,32	0,17	0,075	0,029

Notre échantillon était le plus favorable

Seul notre échantillon ($r = 0$, avec 13 Bac+5) rejette H_0, alors qu'elle est fausse dans tous les cas ($p = 0{,}214$).

La puissance du test vaut environ $0{,}26$: **la bonne décision a été prise, mais avec un instrument peu fiable**.

Choisir le bon test

Un paramètre, une valeur de référence

Paramètre	Situation	Statistique	Loi
moyenne	σ inconnu (usuel)	$(\overline{x} - m_0)/(s/\sqrt{n})$	t_{n-1}
moyenne	σ connu	$(\overline{x} - m_0)/(\sigma/\sqrt{n})$	normale
proportion	$np_0, n(1-p_0) \geq 5$	$(f - p_0)/\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$	normale
proportion	petits effectifs	nombre de succès	binomiale

Toujours la même architecture

Un écart entre l'observé et la valeur de H_0, divisé par l'erreur-type **calculée sous** H_0, et comparé à une loi connue.

Seuls changent le paramètre et la loi de référence.

S’entraîner

Un test bilatéral, puis son intervalle

Une enseigne affirme que le panier moyen de ses clients est de 250 dirhams. Sur 64 tickets tirés au hasard : $\overline{x} = 262$ dirhams et $s = 40$ dirhams. ($t_{0,975\,;63} = 1{,}998$.)

1. Tester l'affirmation au seuil de $5\,\%$.
2. Calculer l'intervalle de confiance à $95\,\%$ et vérifier la cohérence.

Le test et l'intervalle disent la même chose

1. $H_0 : m = 250$ contre $H_1 : m \neq 250$.
   $t = (262 - 250)/(40/8) = 12/5 = 2{,}40 > 1{,}998$: on rejette H_0, $p = 0{,}019$.
2. $262 \pm 1{,}998 \times 5 = [252{,}0\,;\ 272{,}0]$. 250 est en dehors : cohérent avec le rejet.

L'intervalle ajoute ce que le test tait : le panier réel dépasse l'annonce de 2 à 22 dirhams.

Un test unilatéral sur une proportion

Un transporteur garantit que $95\,\%$ de ses livraisons arrivent à l'heure. Sur 200 livraisons contrôlées, 182 sont à l'heure.

1. Peut-on affirmer, au seuil de $5\,\%$, que la garantie n'est pas tenue ?
2. Les conditions de l'approximation normale sont-elles réunies ?

Le dénominateur sous H_0

1. $H_0 : p = 0{,}95$ contre $H_1 : p < 0{,}95$. $f = 0{,}91$ et $z = -0{,}04/\sqrt{0{,}95 \times 0{,}05/200} = -0{,}04/0{,}0154 = -2{,}60$. Seuil $-1{,}645$: on rejette H_0, $p = 0{,}005$. **La garantie n'est pas tenue.**
2. $n(1 - p_0) = 10 \geq 5$: tout juste. Le test exact donne $P(X \leq 182) = 0{,}012$: même conclusion, avec une p-value plus grande.

Sans refaire de calcul

Une étude publie un intervalle de confiance à $95\,\%$ pour une durée moyenne : $[12{,}4\,;\,15{,}8]$ minutes.

1. Au seuil de $5\,\%$ en bilatéral, rejette-t-on $m_0 = 12$? $m_0 = 13$? $m_0 = 16$?
2. Peut-on conclure pour $m_0 = 12$ au seuil de $10\,\%$? Pour $m_0 = 13$?

Intervalle à 95 et intervalle à 90

1. 12 et 16 sont hors de l'intervalle : rejet. 13 est dedans : non-rejet.
2. L'intervalle à $90\,\%$ est **plus étroit** et contenu dans celui à $95\,\%$. 12, déjà dehors, reste dehors : rejet à $10\,\%$ aussi. Pour 13, on ne peut pas savoir sans l'intervalle à $90\,\%$: il pourrait exclure 13.

Ce qu’il faut retenir

Six points

1. Moyenne : $t = (\overline{x} - m_0)/(s/\sqrt{n})$, loi de Student à $n - 1$ ddl. Sur nos données, $t = 1{,}589$, $p = 0{,}059$: non-rejet.
2. La conclusion se rédige en « les données ne permettent pas d'affirmer », jamais en « c'est égal ».
3. **Test bilatéral et intervalle de confiance sont équivalents** : rejeter, c'est être hors de l'intervalle.
4. Proportion : $z = (f - p_0)/\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$ – avec p_0 au dénominateur ; l'intervalle associé est celui de Wilson.
5. Sur nos données, $z = 2{,}178$, $p = 0{,}029$: on rejette l'annonce de $15\,\%$; le test exact donne $0{,}044$.
6. Une bonne décision n'est pas un bon test : ici, une puissance de $0{,}26$ seulement.

De la valeur fixe au second groupe

Un paramètre a été confronté à une valeur fixe. La question suivante est plus fréquente encore en gestion : **deux groupes diffèrent-ils entre eux ?**

Le prochain chapitre

Le chapitre 16 compare les salaires des hommes et des femmes, et les taux de conversion de deux agences — et montre ce qu'un non-rejet permet, ou non, d'écrire.