

tb d

tb d

tb d

tb d

Definiciones básicas

[

Producto tensorial] Dado $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{C}^{p \times q}$, el producto tensorial $A \otimes B$ es la matriz $D \in \mathbb{C}^{pm \times nq}$ tal que:

$$D := A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix}$$

$$x \otimes y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Inicialización

El primer paso es el de *inicializar* nuestro sistema. Para ello se hace uso del principio de superposición, es decir, en lugar de buscar en un único lugar, buscamos en varios al mismo tiempo.

Inicialización

El primer paso es el de *inicializar* nuestro sistema. Para ello se hace uso del principio de superposición, es decir, en lugar de buscar en un único lugar, buscamos en varios al mismo tiempo.

$$\begin{aligned}(I^{\otimes n} \otimes X) |0\rangle_{n+1} &= |0\rangle_n \otimes |1\rangle \\ H^{\otimes(n+1)} [(I^{\otimes n} \otimes X) |0\rangle_{n+1}] &= H^{\otimes n} |0\rangle_n \otimes H |1\rangle \\ &= \sum_{j \in \{0,1\}^n} \frac{1}{\sqrt{2^n}} |j\rangle_n \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \\ &= \sum_{j \in \{0,1\}^n} \alpha_j |j\rangle_n \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \\ &= \psi_n \times \psi_1 = \psi\end{aligned}$$

Definiciones básicas

Inicialización

$$(I^{\otimes 3} \otimes X) |0\rangle_{3+1} = I^{\otimes 3} |0\rangle_3 \otimes X |0\rangle \quad (1)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$= |0\rangle \otimes |1\rangle \quad (3)$$

$$H^{\otimes(3+1)} [(I^{\otimes 3} \otimes X) |0\rangle_{n+1}] \quad (4)$$

$$= H^{\otimes 3} |0\rangle \otimes H |1\rangle \quad (5)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (7)$$

(8)

$$= \frac{1}{\sqrt{2^3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (9)$$

$$= \left[\frac{1}{2\sqrt{2}} |000\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |001\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |010\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |011\rangle \right. \quad (10)$$

$$\left. + \frac{1}{2\sqrt{2}} |100\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |101\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |110\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |111\rangle \right] \quad (11)$$

$$\otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \quad (12)$$

$$\begin{aligned}
& H^{\otimes(3+1)} [(I^{\otimes 3} \otimes X) |0\rangle_{n+1}] \\
&= \left[\frac{1}{2\sqrt{2}} |000\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |001\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |010\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |011\rangle \right] \frac{1}{2\sqrt{2}} |100\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |101\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |110\rangle \\
&\otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \\
&= \sum_{j \in \{0,1\}^n} \frac{1}{\sqrt{2^n}} |j\rangle_n \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) = \psi_n \times \psi_1
\end{aligned}$$

Cambio de signo

Quantum Oracle

Se define el operador U_f tal que

$$U_f : |j\rangle_n \otimes |y\rangle_1 \rightarrow |j\rangle_n \otimes |y \oplus f(j)\rangle_1$$

, donde \oplus es el operador suma en modulo 2, y $f(j) = \begin{cases} 1 & j = l \\ 0 & j \neq l \end{cases}$

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$\begin{aligned}
U_f \psi &= U_f \left(\sum_{j \in \{0,1\}^n} \alpha_j |j\rangle_n \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \right) \\
&= U_f \left(\alpha_l |l\rangle_n \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) + \sum_{\substack{j \in \{0,1\}^n \\ j \neq l}} \alpha_j |j\rangle_n \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \right) \\
&= \left(-\alpha_l |l\rangle_n + \sum_{\substack{j \in \{0,1\}^n \\ j \neq l}} \alpha_j |j\rangle_n \right) \otimes -\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 U_f \psi &= U_f \left(\sum_{j \in \{0,1\}^n} \alpha_j |j\rangle_n \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \right) \\
 &= U_f \left(\alpha_l |l\rangle_n \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) + \sum_{\substack{j \in \{0,1\}^n \\ j \neq l}} \alpha_j |j\rangle_n \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \right) \\
 &= \left(-\alpha_l |l\rangle_n + \sum_{\substack{j \in \{0,1\}^n \\ j \neq l}} \alpha_j |j\rangle_n \right) \otimes -\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle)
 \end{aligned}$$

Amplitud cambiada de signo!

$$\begin{aligned}
 U_f \psi &= U_f \left(\sum_{j \in \{0,1\}^n} \alpha_j |j\rangle_n \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \right) \\
 &= U_f \left(\alpha_l |l\rangle_n \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) + \sum_{\substack{j \in \{0,1\}^n \\ j \neq l}} \alpha_j |j\rangle_n \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \right) \\
 &= \left(-\alpha_l |l\rangle_n + \sum_{\substack{j \in \{0,1\}^n \\ j \neq l}} \alpha_j |j\rangle_n \right) \otimes \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \right)
 \end{aligned}$$

Amplitud cambiada de signo!

Extra qubit intacto!