


Pregunta 1 | Correcta Se puntúa 5,00 sobre 5,00

El coeficiente de rozamiento para que el cuerpo de la figura de masa 10 Kgr no se mueva es:




Seleccione una:

- ☐ a. $\mu=0,35$
- ☐ b. $\mu=0,37$
- ☒ c. $\mu=0,36$
- ☐ d. ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: $\mu=0,36$

Para el sistema de Poléas idénticas que se indica en la figura, La $M_1 = 8 \text{ Kgr}$, la aceleración de la masa 2 ($M_2 = 12 \text{ Kgr}$) es:




Seleccione una:

- ☐ a. $a_2 = 0,88 \text{ m/seg}^2$
- ☒ b. $a_2 = 0,89 \text{ m/seg}^2$
- ☐ c. $a_2 = 0,87 \text{ m/seg}^2$
- ☐ d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
 $a_2 = 0,89 \text{ m/seg}^2$

Un pequeño bloque de masa= 500 gr se encuentra en reposo en la parte superior de una superficie cilíndrica. Si se le da al bloque una velocidad inicial V_0 a la derecha y el bloque dejó la superficie cuando $\theta = 30$, despreciando la fricción, el valor de la V_0 es:



Seleccione una:


- ☒ a. $V_0 = 3,46 \text{ m/seg}$
- ☐ b. $V_0 = 3,47 \text{ m/seg}$
- ☐ c. $V_0 = 3,45 \text{ m/seg}$
- ☐ d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

$V_0 = 3,46 \text{ m/seg}$

El bloque B de masa $m_B = 15 \text{ Kgr}$, está soportado por el bloque A de $m_A = 25 \text{ Kgr}$ y está sujeto a una cuerda a la que se aplica una fuerza $F = 225 \text{ N}$. Despreciando la fricción, la aceleración del bloque A es



Seleccione una:

- ☐ a. $a_A = 2,82 \text{ m/seg}^2$
- ☒ b. $a_A = 2,80 \text{ m/seg}^2$
- ☐ c. $a_A = 2,81 \text{ m/seg}^2$
- ☐ d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

$a_A = 2,80 \text{ m/seg}^2$