


TREMFYA® è disponibile in penne preriempite (PushPen) da 100 mg e 200 mg[1]



Clicchi qui sotto per visualizzare il video sulla modalità d'uso di TREMFYA® 200 mg penna preriempita (PushPen)




Salva in My.IBJ


Prenda visione di seguito della guida sulla modalità d'uso di TREMFYA® in penne preriempite (PushPen) nei dosaggi da 100 mg e 200 mg

Come usare TREMFYA® 100 mg penna preriempita (PushPen)[2]


Preparazione per l'iniezione



Iniezione di TREMFYA® usando la penna preriempita (PushPen)



Dopo l'iniezione



Per le informazioni complete sulla somministrazione fare riferimento al Foglio Illustrativo.

Come usare TREMFYA® 200 mg penna preriempita (PushPen)[3]

Preparazione per l'iniezione

Iniezione di TREMFYA® usando la penna preriempita

Dopo l'iniezione

Per le informazioni complete sulla somministrazione fare riferimento al foglio illustrativo.

Bibliografia

[1] TREMFYA®. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

[2] TREMFYA® 100 mg - Foglio illustrativo - soluzione iniettabile in penna preriempita (PushPen).

[3] TREMFYA® 200 mg - Foglio illustrativo - soluzione iniettabile in penna preriempita (PushPen).

TREMFYA 200 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita in penna preriempita (PushPen) - 2 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita - AIC 045772086 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

TREMFYA 200 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita in penna preriempita (PushPen) - 2 ml (100 mg/ml) - 2 (2 x 1) penne preriempite (confezione multipla) - AIC 045772098 - Prezzo al pubblico: € 7.545,14*

* Sono fatte salve eventuali riduzioni e/o modifiche imposte dall'Autorità Sanitaria competente.

Classe di rimborsabilità: H

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, gastroenterologo (RRL).

Le confezioni di Tremfya sopraciitate sono rimborsate dal SSN per le indicazioni malattia di Crohn e colite ulcerosa come da scheda di prescrizione cartacea.

L'induzione sottocute è al momento rimborsata solo in malattia di Crohn.

TREMFYA 100 mg - soluzione iniettabile - via sottocutanea - siringa preriempita in penna preriempita (PushPen) - 1 ml (100 mg/ml) - 1 penna preriempita - AIC 045772100 - Prezzo al pubblico: € 3.772,57*

* Sono fatte salve eventuali riduzioni e/o modifiche imposte dall'Autorità Sanitaria competente.

Classe di rimborsabilità: H

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo, reumatologo, internista, gastroenterologo (RRL).

Le confezioni di Tremfya sopraciitate sono rimborsate dal SSN per le indicazioni psoriasi a placche, artrite psoriasica, malattia di Crohn e colite ulcerosa.

Rimborsabilità delle indicazioni psoriasi a placche, malattia di Crohn e colite ulcerosa come da scheda di prescrizione cartacea.

RCP TREMFYA 100 mg OnePress e PushPen	RCP TREMFYA 100 mg Siringa	RCP TREMFYA 200 mg PFS/PFP	RCP TREMFYA 200 mg EV
SCARICA	SCARICA	SCARICA	SCARICA

Codice AIFA CP-603524
Pubblicità rivolta ai medici depositata in AIFA il: xx/xx/2026.
VIETATA LA DISTRIBUZIONE/ESPOSIZIONE AL PUBBLICO

Tremfya® (guselkumab)

Come usare
TREMFYA® 200 mg penna preriempita (PushPen)

Riferimenti bibliografici: TREMFYA® 200 mg - Foglio illustrativo - soluzione iniettabile in penna preriempita (PushPen).

Per il RCP di TREMFYA®, classe, prezzo e regime di fornitura fare riferimento alle informazioni presenti nella pagina web.
Pubblicità rivolta ai medici depositata in AIFA il: gg/mm/aaaa.
VIETATA LA DISTRIBUZIONE/ESPOSIZIONE AL PUBBLICO.

Codice AIFA: CP-603524

Si ricordi



Conservare in frigorifero a una temperatura compresa tra 2°C e 8°C.

Conservi la penna preriempita nella confezione originale per proteggerla dalla luce e da danni fisici.

Non agitare la penna preriempita.


Non congelare.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Preparazione per l’iniezione

01

Passaggio 1: Preparazione per l’iniezione



Conosciamo meglio la penna preriempita (PushPen).

Qui c'è la finestra di osservazione.

Protezione dell'ago di colore giallo

e il cappuccio.



Avrà bisogno dei seguenti materiali: 1 o 2 penne preriempite in base alla dose prescritta. Non forniti nella confezione:

Tamponi imbevuti di alcol

Batuffoli di cotone o garze

Cerotti

Contenitore per oggetti taglienti.




Rimuova la confezione (o le confezioni) con la penna preriempita dal frigorifero.

Controlli la data di scadenza ("Scad.") sulla scatola


Non utilizzi la penna preriempita se è stata superata la data di scadenza

o se il sigillo sulla scatola è rotto.



Appoggi la/le confezione/i su una superficie piana a temperatura ambiente per circa 30 minuti prima dell'uso.

Non riscaldi la penna preriempita (o le penne preriempite) in nessun altro modo.




Rimuova la penna preriempita dalla scatola.

Controlli il liquido attraverso la finestra di osservazione.


Deve avere un colore da chiaro a giallo pallido

e può contenere piccole particelle bianche o chiare.

Potrà inoltre vedere una o più bollicine d'aria. Questo è normale.



Non esegua l'iniezione se il liquido è opaco o ha cambiato colore o presenta particelle di grandi dimensioni.




Ora, scelga il sito per l'iniezione.

Scelga una delle seguenti aree per l'iniezione:

Parte anteriore delle cosce

Addome inferiore Non utilizzi l'area di 5 centimetri attorno all'ombelico.


Parte posteriore delle braccia.




Se è necessario effettuare 2 iniezioni per completare la dose, scelga aree diverse o lasci almeno 5 centimetri tra le sedi di iniezione.

Non eseguire l'iniezione in aree della pelle dolenti, con lividi, arrossate, screpolate, spesse o indurite.

Evitare aree con cicatrici o smagliature.



Si lavi bene le mani con sapone e acqua tiepida.



Pulisca il sito di iniezione scelto con un tampone imbevuto di alcol


e faccia asciugare.

Non tocchi, ventili o soffi sul sito di iniezione dopo averlo pulito.

Utilizzo della penna preriempita (PushPen)

02


Passaggio 2: Come utilizzare la penna preriempita (PushPen)



Rimuova il cappuccio inferiore quando è pronto/a per l'iniezione.

É normale vedere alcune gocce di liquido.


Non tocchi la protezione dell'ago gialla!



Inietti TREMFYA® entro 5 minuti dalla rimozione del cappuccio.

Non usi la penna preriempita se è caduta dopo la rimozione del cappuccio.


Non rimetta il cappuccio copriago.



Posizioni la penna preriempita direttamente sul sito di iniezione

con la protezione gialla contro la pelle

e la finestra di osservazione rivolta verso di sé.




Non sollevi la penna preriempita durante l'iniezione!

Se viene sollevata, la protezione gialla dell'ago si bloccherà


e non sarà somministrata la dose completa.

Prema sulla penna preriempita

e la tenga premuta contro la pelle.




Si sentirà il primo clic.



Continui a tenere saldamente la penna preriempita contro la pelle per circa 10 secondi per sentire un secondo clic.



L'iniezione è completa quando l'asta dello stantuffo smette di muoversi e riempie la finestra di osservazione.




Sollevi verso l’alto.

Se la dose prescritta richiede due iniezioni, ripeta i passaggi descritti con la seconda penna preriempita.

Dopo l’iniezione

03

Passaggio 3: Dopo l’iniezione




Controlli il sito di iniezione.


Può essere presente una piccola quantità di sangue o liquido in corrispondenza del sito di iniezione.

Eserciti delicatamente una pressione sul sito di iniezione con un batuffolo di cotone o una garza fino a quando il sanguinamento non si interrompe.


Non strofini il sito di iniezione.



Se necessario, copra il sito di iniezione con un cerotto.



Getti via la penna preriempita e il cappuccio usati.



Metta la penna preriempita e il cappuccio usati in un contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti immediatamente dopo l’uso.

Non getti (smaltisca) la penna preriempita nei rifiuti domestici.

Non riciclì il contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti usato.

L’iniezione è ora completata!

Per le informazioni complete sulla somministrazione del medicinale
fare riferimento al Foglio illustrativo del medicinale.

Johnson&Johnson
Innovative Medicine

L’iniezione è ora completata!

Bibliografia:

1. TREMFYA® Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
2. Sachen KL et al. Front Immunol. 2025 Mar 12:16:1532852. doi: 10.3389/fimmu.2025.1532852. eCollection 2025)

Per RCP di Tremfya®, classe, prezzo e regime di fornitura fare riferimento alle informazioni presenti nella pagina
Codice AIFA CP-603524- Pubblicità rivolta ai medici depositata in AIFA il xx/xx/2026. VIETATA LA DISTRIBUZIONE/ESPOSIZIONE AL PUBBLICO.