

# Estudi de la ocupació de les aules de la FIB

Arnau Canyadell Miquel

Joan Marcè Igual

Daniel Ferro González

2 de juny de 2015

# Índex

# 1 Introducció

A la FIB és molt comú anar en busca d'una aula d'informàtica per tal de fer un treball o altre. A nosaltres ens va picar la curiositat per saber quina era la ocupació mitjana d'aquestes aules i a quines hores i quins dies estaven menys ocupades per tal de poder trobar-ne una lliure amb facilitat. Evidentment aquestes dades només serviran per aquest quadrimestre ja que cada quadrimestre les assignatures que es fan a la FIB canvien el seu nombre d'alumnes matriculats i les aules on es realitzen.

## 1.1 Objectiu

El nostre treball consisteix en analitzar la ocupació de les aules d'ordinadors de la *Facultat d'Informàtica de Barcelona*. Volem saber quant ocupades estan les aules i com es distribueix aquesta ocupació al llarg dia.

La nostra hipòtesi és que *En les aules on hi ha classe la disponibilitat és superior que en les que hi ha classe*. Per demostrar-ho, compararem el percentatge de disponibilitat d'ordinadors en les aules on es fa classe i les aules on no se n'hi fa.

# 2 Metodologia

## 2.1 Recollida de dades

Per a fer la recollida de dades, hem programat un servidor perquè es connecti a l'API de la FIB cada minut des del dimarts 5 de maig fins el divendres 29 del mateix mes i des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre (horari d'obertura de la facultat). Degut a un error en l'execució del programa, entre els dies 5 i XX, només disposem de dades a partir de les 11:44. L'API del racó ens proporciona la informació següent:

- L'horari de classes de cada aula.
- El nombre d'ordinadors lliures per cada aula en l'instant en què es demana.

## 2.2 Variables d'estudi

Per tal de fer-nos una idea de com és la disponibilitat de les aules, hem decidit treballar amb les variables següents:

$X$  = proporció d'ordinadors lliures en les aules on *hi ha classe*.

$Y$  = proporció d'ordinadors lliures en les aules on *no hi ha classe*.

## 2.3 Contrast d'hipòtesis

$$H0 : \mu_x = \mu_y$$

$$H1 : \mu_x \neq \mu_y$$


## 2.4 Estadístic utilitzat

$$\hat{z} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s_x^2/n_x + s_y^2/n_y}}$$
$$\hat{z} \sim N(0, 1)$$

## 3 Resultats

### 3.1 Descripció de les dades

Les dades obtingudes han estat les següents:



### 3.2 Comparació de la disponibilitat

Com a premisses fem les següents suposicions:

1. Les variables aleatòries  $X$  i  $Y$  es poden aproximar a una normal degut a la seva grandària (11934 i 11951, respectivament).
2. Les diverses mostres preses de  $X$  i  $Y$  són consecutives i per tant no independents. Tanmateix, sí que podem suposar que al cap d'una hora d'haver pres una mostra, la nova mostra ja serà independent de l'anterior (suposem que hi ha prou moviment a les aules). Així doncs, si agaféssim només una de cada 60 mostres (1 cada hora), tindríem poblacions mostrals de, aproximadament, 200 individus, que són prou grans com per poder dir que  $X$  i  $Y$  s'aproximen a una normal (vegeu figures 1 i 2).

Analitzant les dades obtingudes hem arribat als següents valors:

$$\bar{x} = 0.77083, s_x^2 = 0.01459139, n_x = 11934$$

$$\bar{y} = 0.8503347, s_y^2 = 0.009507904, n_y = 11950$$

I per tant:

$$\hat{z} = -55.96263$$

El valor de  $\hat{z}$  és extremament petit. De fet, calculant el p-valor amb  $R$  per aquesta  $\hat{z}$  el resultat és 0. Per tant, queda clar que s'ha de rebutjar la hipòtesi nul·la. És més, degut a que  $\hat{z}$  ha resultat ser negativa, podem afirmar que  $\mu_Y > \mu_X$ .




Figura 1




Figura 2

## 4 Discussió

### 4.1 Prefaci

El comportament de les variables  $X$  o  $Y$  pot dependre de molts factors. Tot seguit n'enumerem uns quants:

**Hora:** els hàbits rutinaris dels estudiants i els horaris de classe fan que en certes hores hi hagi més gent utilitzant els ordinadors.

**Ocupació de les aules per fer classe:** com més aules estiguin reservades per fer-hi classe, menys ordinadors lliures hi haurà pels estudiants que no tenen classe i en volen fer servir un.

**Exàmens:** els exàmens amb ordinador, a part d'ocupar moltes aules, poden provocar que hi hagi molts estudiants repassant a l'últim moment i que l'ocupació en les hores abans sigui anormalment alta.

### 4.2 Conclusió principal

Hem obtingut que la mitjana de disponibilitat de les aules amb classe és inferior a la mitjana de les aules sense classe. Això contradiu la nostra hipòtesis inicial del treball ja que creïem que les aules amb classe tindrien una disponibilitat superior a les sense classe.