

姓名: 陈雷

学号: 2017E8017761124

成绩: \_\_\_\_\_

本试题共六题, 满分 100, 要求全做, 答案请写在答题纸上。

10.5

一、判断下面说法是否正确。(15 分)

- ☒ 1.  $A, B$  和  $C$  为  $n \times n$  的矩阵, 如果  $AB=AC$ , 那么  $B=C$ ;
- ☒ 2.  $A$  为  $m \times n$  的矩阵, 如果  $\text{trace}(A^T A) = 0$ , 那么  $A$  一定为零矩阵;
- ☒ 3. 对于  $n \times n$  的矩阵  $A$ , 存在矩阵  $X$ , 使得  $AX-XA=I$ ;
- ☒ 4.  $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ ;
- ☒ 5.  $A$  为  $n \times n$  非奇异矩阵, 那么  $A$  与  $A^{-1}$  等价;
- ☒ 6. 矩阵  $U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i & -1+i \\ 1+i & 1-i \end{pmatrix}$  为酉矩阵;
- ☒ 7.  $A$  为  $m \times n$  的矩阵, 且满足  $A^T A = 0$ , 那么矩阵  $A = 0$ ;
- ☒ 8.  $A$  为  $n \times n$  矩阵,  $N(A) = N(A^2)$ ;
- ☒ 9. 设  $A$  为  $n \times n$  的反对称矩阵, 当  $n$  为奇数时,  $A$  为奇异矩阵 (singular);
- ☒ 10.  $A$  为  $n \times n$  的可逆矩阵,  $A \sim A^{-1}$ ;
- ☒ 11. 高斯消去法求解  $n \times n$  线性方程组时, 使用乘法次数为  $\frac{n^3}{3} + n^2 + \frac{n}{3}$ , Gauss-Jordan 乘法次数为  $\frac{n^3}{2} + \frac{n^2}{2}$ ;
- ☒ 12. Hermitian 矩阵不一定是对称矩阵, 但对称矩阵一定是 Hermitian 矩阵;
- ☒ 13. Givens reduction 算法复杂度大约为  $\frac{2n^3}{3}$ ;
- ☒ 14.  $A, B$  为  $m \times n$  的矩阵, 且  $A \sim B$ , 那么  $A$  与  $B$  行等价;
- ☒ 15. 如果  $\lambda \in \sigma(A), \mu \in \sigma(B)$ , 那么  $\lambda + \mu \in \sigma(A+B)$ ;
- ☒ 16.  $A = \begin{pmatrix} 5+i & -2i \\ 2 & 4+2i \end{pmatrix}$  为 Normal matrix;
- ☒ 17. 实数对称矩阵都可以对角化;
- ☒ 18. 如果矩阵  $A$  和  $B$  都为对称矩阵, 那么两个矩阵的乘积  $AB$  也为对称矩阵;
- ☒ 19. 对于  $n \times n$  的矩阵  $A$ ,  $\det(A^* A) \geq 0$ ;
- ☒ 20. 矩阵  $A = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & \sqrt{8} \end{pmatrix}$ ,  $\|A\|_2 = 2$ ;

21. 如果  $\sigma(A) = \sigma(B)$ , 那么矩阵  $A$  和  $B$  有相同的特征多项式 (Characteristic Polynomial);

22.  $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$ ;

23. 矩阵  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$  可逆;

24. 对于  $n \times n$  的矩阵  $A$ , 有  $R(A) \oplus N(A) = R^n$ ;

25. 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1/2 & \alpha \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$ , 那么  $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = 0$ ;

26. 如果  $\lambda \in \sigma(A), \mu \in \sigma(B)$ , 那么  $\lambda\mu \in \sigma(AB)$ ;

27.  $A, B$  为  $m \times n$  的矩阵, 如果对于任意的  $n \times 1$  的向量, 都有  $Ax = Bx$ , 那么  $A = B$ ;

28. 设  $A$  为  $m \times n$  的矩阵,  $R(A^T A) = R(A)$ ;

29.  $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD) - \det(BC)$ ;

30. 矩阵  $\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} \\ 0 & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$  为正交矩阵.

二、(1) 写出  $\text{Rank}(A) = r$  等价定义; (5 分)

(2) 写出矩阵 1-Norm, 2-Norm 和  $\infty$ -Norm 的定义, 并对矩阵

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 4 \\ -2 & 1 & -2 \\ 4 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

分别计算它的 1-Norm, 2-Norm 和  $\infty$ -Norm; (6 分)

三、(1) 简要说明所有实矩阵  $A_{n \times n}$  构成实数域  $R$  上的向量空间  $V$ ; (10 分)

(2) 说明其中零元素的唯一性; (5 分)

(3) 对于向量空间  $V$ , 定义内积为  $\langle A | B \rangle = \text{trace}(A^T B)$ , 说明所有实对称矩阵组成的集合  $S_n$  为向量空间  $V$  的子空间, 并给出  $S_n^\perp$ . (7 分)

四、试用旋转矩阵构造  $R^4$  中一组标准正交基包含向量  $x = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$  (10分)

4

1/3

五、对于矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

计算  $A^{300}$  (12分)

六、设

③ 4

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 4 \\ 2 & -14 & -3 \\ -2 & 14 & 0 \\ 1 & -7 & 15 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ -15 \\ 0 \\ 30 \end{pmatrix}$$

(1) 使用 Householder reduction 方法，找出  $R(A)$  的一组标准正交基；(15分)

(2) 使用 Householder reduction 方法计算  $Ax = b$  的最小二乘解。(5分)

七、设  $A, B$  为  $n \times n$  的矩阵，证明：

(1)  $\text{trace}(AB) = \text{trace}(BA)$ ；(4分)

(2) 如果  $A$  为对称矩阵 (symmetric matrix),  $\text{index}(A) \leq 1$ 。(6分)

AB $\pi$