

姓名_____学号_____成绩_____

本试题共七题, 满分 100, 要求全做, 答案请写在答题纸上。

一、判断下面说法是否正确。(20 分)

- ~~X~~ 1. 高斯消去法求解 $n \times n$ 线性方程组时, 使用乘法次数为 $\frac{n^3}{3} + n^2 + \frac{n}{3}$, Gauss-Jordan 乘法次数为 $\frac{n^3}{2} + \frac{n^2}{2}$;
- \checkmark 2. A 为 $m \times n$ 的矩阵, 如果 $\text{trace}(A^T A) = 0$, 那么 A 一定为零矩阵;
- ~~X~~ 3. Hermitian 矩阵不一定是对称矩阵, 但对称矩阵一定是 Hermitian 矩阵;
- \checkmark 4. $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$;
- \checkmark 5. A 为 $n \times n$ 非奇异矩阵, 那么 A 与 A^{-1} 等价;
- ~~X~~ 6. 矩阵 $U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i & -1+i \\ 1+i & 1-i \end{pmatrix}$ 为酉矩阵;
- \checkmark 7. A 为 $m \times n$ 的矩阵, 且满足 $A^T A = 0$, 那么矩阵 $A = 0$;
- ~~X~~ 8. A 为 $n \times n$ 矩阵, $N(A) = N(A^2)$;
- \checkmark 9. 设 A 为 $n \times n$ 的反对称矩阵, 当 n 为奇数时, A 为奇异矩阵 (singular);
- ~~X~~ 10. Givens reduction 算法复杂度大约为 $\frac{2n^3}{3}$;
- ~~X~~ 11. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} \\ 0 & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}$ 为正交矩阵;
- \checkmark 12. 实数对称矩阵都可以对角化;
- ~~X~~ 13. 如果矩阵 A 和 B 都为对称矩阵, 那么两个矩阵的乘积 AB 也为对称矩阵;
- \checkmark 14. 对于 $n \times n$ 的矩阵 A , $\det(A^* A) \geq 0$;
- ~~X~~ 15. 如果 $\lambda \in \sigma(A), \mu \in \sigma(B)$, $\lambda + \mu \in \sigma(A+B)$;
- ~~X~~ 16. 矩阵 $A = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & \sqrt{8} \end{pmatrix}$, $\|A\|_2 = 2$;
- ~~X~~ 17. 如果 $\sigma(A) = \sigma(B)$, 那么矩阵 A 和 B 有相同的特征多项式 (Characteristic Polynomial);
- ~~X~~ 18. $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$;
- ~~X~~ 19. 对于 $n \times n$ 的矩阵 A , 有 $R(A) \oplus N(A) = R^n$;
- ~~X~~ 20. $\text{trace}(ABC) = \text{trace}(CAB) = \text{trace}(BAC)$;

二、(1) 写出 $\text{Rank}(A) = r$ 等价定义; (5分)

(2) 写出矩阵 1-Norm, 2-Norm 和 ∞ -Norm 的定义; (3分)

三、(1) 简要说明所有实矩阵 $A_{n \times n}$ 构成实数域 \mathbb{R} 上的向量空间 V ; (10分)

(2) 并说明其中零元素的唯一性; (2分)

(3) 对于向量空间 V , 定义内积为 $\langle A | B \rangle = \text{trace}(A^T B)$. 试说明所有实对称矩阵组成的集合 S_n 为向量空间 V 的子空间, 并给出 S_n^\perp . (10分)

四、设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.4 & 0.5 & 0.6 \\ 0.7 & 0.8 & 0.901 \end{pmatrix}$$

使用高斯消去法分别在精确和 3-digit floating-point 意义下计算 $\text{rank}(A)$. (10分)

五、设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 4 & 8 & 12 & -8 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

(1) 求矩阵 A 的 LU 分解 $PA = LU$; (10分)

(2) 使用 LU 分解求解线性方程组 $Ax = b$, 其中 $b = (3, 60, 1, 5)^T$. (5分)

六、设

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 4 \\ 2 & -14 & -3 \\ -2 & 14 & 0 \\ 1 & -7 & 15 \end{pmatrix}$$

使用 Householder reduction 方法, 找出 $R(A)$ 的一组标准正交基. (15分)

七、设 A 为 $n \times n$ 的矩阵, 证明: (1) $|\text{trace}(A)|^2 \leq n \text{trace}(A^* A)$; (4分)

(2) 如果 A 为对称矩阵 (symmetric matrix), $\text{index}(A) \leq 1$. (6分)