

Repasando Estadística Descriptiva con Datos Cualitativos - Solución

Pregunta 1

Da la instrucción que defina la tabla de frecuencias absolutas de un vector llamado `alumnos`.

Solución

```
table(alumnos)
```

Pregunta 2

Con una sola instrucción, define la tabla de frecuencias relativas de un vector llamado `edades`.

Solución

```
prop.table(table(edades)) # Forma 1  
table(edades) / length(edades) # Forma 2
```

Pregunta 3

Con una sola instrucción, define la tabla bidimensional conjunta de frecuencias absolutas de dos vectores llamados `altura` y `peso`, de forma que las filas correspondan a `altura` y las columnas a `peso`.

Solución

```
table(altura, peso)
```

Pregunta 4

Con una sola instrucción, define la tabla bidimensional conjunta de frecuencias relativas calculadas dentro del total, de dos vectores llamados `edad` y `altura`, de forma que las filas correspondan a `altura` y las columnas a `edad`.

Solución

```
prop.table(table(altura, edad))
```

Pregunta 5

Con una sola instrucción, dibuja un diagrama de barras básico de un vector llamado `edad`.

Solución

```
barplot(table(edad))
```

Pregunta 6

Con una sola instrucción, dibuja un diagrama circular básico de un vector llamado `alumnos`.

Solución

```
pie(table(alumnos))
```

Pregunta 7

La tabla `DNase` es uno de los data frames que tiene predefinidos R. Da la instrucción que dibuje un diagrama de barras básico de la variable `density` de este mismo data frame.

Solución

```
barplot(table(DNase$density))
```