

---

# Lliurament 1:

## Matrius i determinants


Com s'empren les matrius per al processament d'imatges?

---

## Matemàtiques II

Josep Mulet Pol

*Àmbit científic*


$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$



<https://iedib.net/>

Aquesta obra està subjecta a les condicions de llicència CREATIVE COMMONS no comercial i compartir igual.

**Edició ~~ETX~~:** © Josep Mulet Pol

**Versió:** 05-09-2026

[Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)



## Índex

|          |                                                |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducció</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Matrius</b>                                 | <b>4</b>  |
| 2.1      | Operacions amb matrius . . . . .               | 6         |
| 2.2      | La matriu inversa . . . . .                    | 12        |
| <b>3</b> | <b>Determinants</b>                            | <b>15</b> |
| 3.1      | Propietats dels determinants . . . . .         | 17        |
| <b>4</b> | <b>Menors i adjunts</b>                        | <b>22</b> |
| <b>5</b> | <b>Càlcul de la matriu inversa per adjunts</b> | <b>25</b> |
|          | <b>Conceptes clau i errades freqüents</b>      | <b>32</b> |
|          | <b>Solucions als exercicis proposats</b>       | <b>34</b> |

## 1. Introducció

### Què són les matrius?

Les matrius són una de les eines més usades dins de l'àlgebra lineal i estan associades a un conjunt de dades numèriques ordenades. Trobem les matrius en moltes ciències: Sociologia, Economia, Física, Biologia ... La idea intuïtiva de matriu és molt senzilla. Una matriu es pot definir com un taula de nombres ordenats en files i columnes, nombres que poden provenir d'experiments, enquestes, anàlisis econòmiques, etc.

Considereu dues comunitats autònomes, la comunitat  $A$  té 2 aeroports  $A_1$  i  $A_2$  i la comunitat  $B$  té 3 aeroports  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$ . Cada fletxa en aquest diagrama representa un vol diari entre els aeroports. El sentit de la fletxa indica la ciutat origen i destí.

Aquesta informació es pot descriure perfectament amb una matriu

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} B_1 & B_2 & B_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad (1)$$




Figura 1: Cada fletxa representa un vol entre aeroports.

## 2. Matrius

### ■ Definicions

Es defineix una matriu de  $n$  files i  $m$  columnes ( $n \times m$ ) com

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Les matrius es representen per lletres majúscules A, B, C,... Els **elements** de la matriu (els números) es representen en general per  $a_{ij}$ , on els subíndexs (i, j) ens donen la posició que ocupa el terme. Per exemple l'element  $a_{32}$  és el que es troba a la tercera fila i segona columna.

### Dimensió

El nombre de files ( $n$ ) i el nombre de columnes ( $m$ ) ens dona la **dimensió de la matriu** que expressam com  $n \times m$ .

Per exemple, la matriu  $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 1 & 5 & -9 \end{pmatrix}$  té dimensió  $2 \times 3$ . L'element  $b_{22} = 5$  i  $b_{13} = 4$ .

### Igualtat de matrius

Dues matrius són iguals si tenen la mateixa dimensió i si els elements que ocupen la mateixa posició són iguals.

### Tipus de matrius


Si el nombre de files és **diferent** del nombre de columnes, la matriu es diu **rectangular**. Dins de les matrius rectangulars tenim els següents tipus:

- **Matriu o vector fila:** És aquella que només té una fila. Per exemple, la matriu  $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}$  és un vector fila de dimensió  $1 \times 3$
- **Matriu o vector columna:** És la que només té una columna. Per exemple, la matriu  $D = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$  és un vector columna de

dimensió  $2 \times 1$

Si el número de files és igual al nombre de columnes ( $n = m$ ) s'anomena una **matriu quadrada**. Anomenam  $n$  a l'ordre de la matriu.

Dins de les matrius quadrades és important destacar que els elements  $a_{ij}$  en què els dos subíndexs són iguals formen la **diagonal principal**. Aquells elements en què  $i + j = n + 1$  (on  $n$  és l'ordre de la matriu) formen la **diagonal secundària**.



En el conjunt  $M_n$  de les matrius quadrades d'ordre  $n$ , cal destacar els següents tipus de matrius:

- **Matriu triangular:** És aquella matriu en la qual els elements situats per damunt o per davall de la diagonal principal són zero.

#### Exemple 1

Matriu Triangular Inferior  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Triangular Superior  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

- **Matriu Diagonal:** És aquella matriu en la qual els elements que no estan en la diagonal principal són zero:

#### Exemple 2

Són exemples de matrius diagonals  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$  i  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$

- **Matriu Escalar:** És aquella matriu diagonal en la qual els elements de la diagonal principal són tots iguals.  $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
- **Matriu Identitat (Unitat):** És la matriu escalar en la qual els elements no nuls són iguals a 1. Es representa per  $I$ .

**Exemple 3**

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Les matrius escalars es poden escriure com un múltiple de la identitat  $k I$ .

- **Matriu Nul·la:** És aquella en la qual tots els seus elements són zero.

**Exemple 4**

Matriu nul·la d'ordre 3.  $O_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

No confoneu el nombre zero amb la matriu zero.

## 2.1 Operacions amb matrius

### ■ Vídeo explicacions



**Vídeo 1.1:** Matrius: Definició i operacions

<https://www.youtube.com/watch?v=O6Ya7GrySXw>

### ■ Suma o resta

Donades dues matrius  $A$  i  $B$  de la mateixa dimensió  $n \times m$ , es defineix la suma de matrius  $(A + B)$  com aquella matriu de la mateixa dimensió, els elements de la qual són la suma dels elements que ocupen la mateixa posició.



#### Exemple 5

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -2 & 3 & 4 \\ -3 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$
$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 7 \\ -3 & 6 & 6 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

### ■ Producte per un escalar (nombre real)

El producte d'un nombre real  $k$  per una matriu  $A = (a_{ij})$  és una altra matriu de la mateixa dimensió els elements de la qual són els productes dels elements de la matriu pel número  $k$ .

El producte d'un nombre per una matriu té les següents propietats:

- Propietat distributiva respecte de la suma de matrius.  $k(A+B) = kA + kB$
- Propietat distributiva respecte de la suma de nombres:  $(k+l)A = kA + lA$
- Propietat associativa mixta:  $k(lA) = (kl)A$
- Element neutre:  $1A = A$
- $-A = -1A$  és la **matriu oposada** que compleix que  $A + (-A) = O$  on  $O$  és la matriu nul·la de la mateixa dimensió que  $A$ .

### ■ Producte de matrius

El producte de matrius no és una operació tan senzilla com la suma de matrius o el producte d'una matriu per un nombre real. No sempre és possible realitzar el producte. Per a poder multiplicar dues matrius, les seves dimensions han de complir unes determinades condicions.

Considerem les matrius  $A$  i  $B$  de dimensions  $n_1 \times m_1$  i  $n_2 \times m_2$ . Per poder efectuar el producte de les dues matrius ha de passar que  $m_1 = n_2$ . És a dir, el nombre de columnes de la matriu  $A$  és igual al nombre de files de la matriu  $B$ . En aquest cas, la dimensió de la matriu producte és  $n_1 \times m_2$ .




Figura 2: Condició per poder multiplicar dues matrius

Es defineix el producte  $A \cdot B$ , i en aquest ordre, com una matriu  $C$  de dimensions  $n_1 \times m_2$  els elements de les quals s'obtenen de:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{m_1} a_{ik} b_{kj} \quad (3)$$

Anem a entendre millor aquesta fórmula amb un exemple:

Volem efectuar el producte de les matrius  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$   $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ . Veim que és possible fer el producte  $A \cdot B$  i que la dimensió del producte serà  $2 \times 2$ . Aleshores, anem ara a calcular els 4 elements de la matriu producte:

$$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \\ 4 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot 4 & 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 8 \\ 47 & 20 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Per exemple, per calcular l'element  $c_{12}$  agafam la primera fila de la matriu  $A$  i la segona columna de la matriu  $B$ . Multiplicam element a element i efectuem la suma de tots els productes.

$$c_{12} = \sum_{k=1}^3 a_{1k} b_{k2} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} = \quad (5)$$

$$= 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 8$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 8 \\ 47 & 20 \end{pmatrix}$$

Anam repetint aquest càlcul per la resta d'elements de la matriu producte.

Notau que, en aquest exemple, el producte  $B \cdot A$  també és possible però dóna una matriu  $3 \times 3$

Aleshores, el producte de matrius **no és commutatiu**  $A \cdot B \neq B \cdot A$

Si donades dues matrius es compleix que  $A \cdot B = B \cdot A$ , direm que les matrius  $A$  i  $B$  **commuten**. Podeu raonar que perquè això passi les matrius han d'ésser quadrades i del mateix ordre.

Si les matrius són quadrades, el producte de matrius té les següents propietats:

- **Propietat Associativa:**  $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$  però seria diferent a  $C \cdot (A \cdot B)$  pel fet que el producte de matrius no és commutatiu.
- **Element neutre ( $I$ ):** Si  $I$  és la matriu identitat,  $I \cdot A = A \cdot I = A$
- **Propietat distributiva respecte de la suma de matrius:**  $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$  i també  $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$ . Però notau que mai canviem l'ordre dels productes.

**Producte d'un vector fila per un vector columna** El producte d'un vector fila per un vector columna dóna un escalar (un nombre real). Per exemple:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} = 2 \cdot 0 + 1 \cdot (-2) - 3 \cdot 5 = -17 \quad (6)$$

#### ■ Potència de matrius $A^n$

Si a  $A$  és una **matriu quadrada** d'ordre qualsevol, podem definir la potència d'aquesta matriu com:

- $A^0 = I$
- $A^1 = A$
- $A^2 = A \cdot A$
- ...
- $A^n = A \cdot \dots \cdot A$  ( $n$  vegades)

### ■ **Matriu transposada** $A^t$

Donada una matriu  $A$  de dimensions  $n \times m$ , es diu matriu transposada  $A^t$  a la matriu que s'obté en canviar les files per les seves columnes, per la qual cosa la matriu  $A^t$  tindrà dimensió  $m \times n$ .

Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow A^t = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \quad (7)$$

Una matriu quadrada es diu que és **simètrica** quan coincideix amb la seva transposada:  $A^t = A$

Exemple:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow A^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

Si una matriu quadrada és igual a l'oposada de la seva transposada,  $A^t = -A$  es diu que és **antisimètrica**.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & -4 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow A^t = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \\ -3 & -4 & 0 \end{pmatrix} \quad (8)$$

La transposició de matrius compleix les següents propietats:

- La transposada de la transposada és la mateixa matriu:  $(A^t)^t = A$
- La transposada d'una suma de matrius és igual a la suma de les matrius transposades:  $(A + B)^t = A^t + B^t$
- La transposada d'un producte de matrius és igual al producte **en ordre invers** de les matrius transposades:  $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$

#### **Exemple 6**

Donada la matriu  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ , el producte de la matriu pel

nombre 5 és

$$5A = \begin{pmatrix} 5 & 10 & 20 \\ -5 & 15 & 10 \\ 0 & -10 & 5 \end{pmatrix}$$

**Exemple 7**

Calculau el producte  $B \cdot A$  per a les matrius anteriors.

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 & 12 \\ 11 & 16 & 21 \\ 8 & 13 & 18 \end{pmatrix} \quad (9)$$

**Exemple 8**

Donada la matriu  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$  calcula  $A^n$ .

Calculam  $A^2, A^3, A^4, \dots$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \quad (10)$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} \quad (11)$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -8 \\ -8 & 8 \end{pmatrix} \quad (12)$$

En general deduïm que els elements de la matriu són potències de 2

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & -2^{n-1} \\ -2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix} \quad (13)$$

que també es pot escriure com

$$A^n = 2^{n-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (14)$$

### Exercicis

1. Donades les matrius  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ -3 & 4 & 7 \\ -1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$  i  $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & -4 \end{pmatrix}$ ,

calculau:

a)  $A + B =$

b)  $5 \cdot A - B =$

c)  $A^t \cdot A =$

2. Donades les matrius  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$  i  $B = \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$  calcula tots els productes possibles.

## 2.2 La matriu inversa

### Vídeo explicacions



**Vídeo 1.2:** La matriu inversa

<https://www.youtube.com/watch?v=SDKv-u7DqUQ>

Imagina't que et donen un nombre, per exemple 2 i et demanen quin nombre  $x$  multiplicat per 2 dóna 1? És a dir,  $2x = 1$ , fàcilment  $x = \frac{1}{2}$ .

Efectivament, el nombre  $\frac{1}{2}$  s'anomena la inversa de 2 perquè  $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$ .

Ara ens feim la mateixa pregunta amb matrius quadrades. Si  $A$  és una matriu quadrada  $n \times n$ , ens demanem quina és la matriu inversa  $A^{-1}$

$A$  i  $A^{-1}$  són matrius inverses si compleixen que

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

on  $I$  és la matriu identitat de dimensió  $n$ . Si la matriu  $A^{-1}$  existeix, l'anomenem la **inversa de la matriu**  $A$ .

En aquest apartat ens limitam a calcular la inversa de matrius  $2 \times 2$  senzilles mitjançant sistemes d'equacions. Quan haguem après el concepte de determinant, tindrem una forma més ràpida de calcular inverses.

No totes les matrius quadrades tenen inversa. Més endavant veurem que els determinants ens ajuden a saber si en tenen.

### Exemple 9

Sigui la matriu  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ . Calcula la inversa  $A^{-1}$  mitjançant un sistema d'equacions

Plantejam la matriu inversa com  $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  i trobem el producte:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ 2a & 2b \end{pmatrix}$$

Ha de complir-se que  $A \cdot A^{-1} = I$ , per tant,  $\Rightarrow \begin{pmatrix} c & d \\ 2a & 2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Recordem que dues matrius són iguals i ho són tots els seus elements

$$\begin{cases} c = 1 & d = 0 \\ 2a = 0 & 2b = 1 \end{cases}$$

Resolent per a  $a, b, c$  i  $d$ :  $\begin{cases} a = 0 & b = 1/2 \\ c = 1 & d = 0 \end{cases} \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

 **Exemple 10**

Comprova que la matriu

$$\begin{pmatrix} 0 & -1/4 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix}$$

és la inversa de

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$$

Si ja ens donen la inversa basta comprova que  $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$ . S'han de comprovar els dos productes perquè el producte de matrius no és en general commutatiu.

Efectivament:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1/4 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (15)$$

i també

$$\begin{pmatrix} 0 & -1/4 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (16)$$

Per tant són inverses una de l'altra.

 **Exercicis**

3. Comprovau si la matriu  $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  és la inversa de la matriu

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

4. Calculau la matriu inversa de  $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

### 3. Determinants

#### ■ Video explicacions



**Vídeo 1.3: Determinants 2x2 i 3x3**

[https://www.youtube.com/watch?v=xM0\\_-wvVrRs](https://www.youtube.com/watch?v=xM0_-wvVrRs)

#### Quin ús tenen els determinants?

Com la mateixa paraula indica, un determinant ajuda a determinar. Però, a determinar què? Doncs, com veurem al llarg d'aquest i proper lliuraments, els determinants ajuden a saber

- Si una matriu té inversa i com calcular-la
- Si un sistema d'equacions té solució
- Si un conjunt de vectors tenen alguna relació de dependència

Abans de començar cal tenir molt clar que només es poden calcular determinants de matrius quadrades.

#### ■ Determinants de matrius 2x2

Donada una matriu quadrada d'ordre 2,  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ , es diu **de-**

**terminant de la matriu**  $A$ , i s'indica com  $\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

al número:  $|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

És a dir, es multipliquen els elements de la diagonal principal i se li resta el producte dels elements de la diagonal secundària.

**Exemple 11**

Calcula el determinant de les matrius  $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$  i  $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 - 5 \cdot 1 = 8 - 5 = 3 \quad (17)$$

$$|B| = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = -1 \cdot 3 - (-2) \cdot (-4) = -3 - 8 = -11 \quad (18)$$

**Determinants de matrius 3x3**

Donada una matriu quadrada d'ordre 3,  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$  es

diu determinant de la matriu A al número:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ -a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} \end{matrix} \quad (19)$$

Aquest desenvolupament pot recordar-se fàcilment amb aquest diagrama, conegut com la **regla de Sarrus**:




Figura 3: Productes en la regla de Sarrus

Per exemple: 
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 3 \cdot 6$$

$$-3 \cdot 5 \cdot 3 - 1 \cdot 6 \cdot 1 - 2(-2) \cdot (-1) = -10 + 6 - 18 - 45 - 6 - 4 = -77$$

### Exercicis

5. Calculau  $\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} =$

6. Calculau  $\begin{vmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 4 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} =$

## 3.1 Propietats dels determinants

### ■ Vídeo explicacions



**Vídeo 1.4:** Propietats dels determinants

<https://www.youtube.com/watch?v=vSeu-8R0r3U>

Tot seguit donam una sèrie de propietats dels determinants que són certes per qualsevol ordre però, per simplicitat, donarem exemples per a matrius  $2 \times 2$ . Mostrem les propietats per columnes tot i que també són certes per files.

**0a)** El determinant de la matriu identitat és 1:  $|I| = 1$

Exemple:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - (0 \cdot 0) = 1 \quad (20)$$

**1a)** El determinant d'una matriu  $A$  és igual al determinant de la seva transposada  $|A^t| = |A|$ :

Exemple:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - (1 \cdot (-4)) = 10 \quad (21)$$

i també

$$|A^t| = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - ((-4) \cdot 1) = 10 \quad (22)$$

**2a)** Si els elements d'una fila o d'una columna es multipliquen tots per un número, el determinant queda multiplicat per aquest número:

Exemple:

$$\begin{vmatrix} 2k & 1 \\ -4k & 3 \end{vmatrix} = 2k \cdot 3 - (1 \cdot (-4k)) = 10k \quad (23)$$

i també

$$k \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = k [2 \cdot 3 - (1 \cdot (-4))] = 10k \quad (24)$$

**3a)** Si els elements d'una línia es poden descompondre en suma de dos o més sumands, el determinant serà igual a la suma de dos (o més) determinants que tenen totes les restants línies iguals i en aquesta línia tenen els primers, segons, etc. sumands:

Exemple:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6-4 & 1 \\ -1-3 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} = 19 - 9 = 10 \quad (25)$$

**4a)** Si en un determinant els elements d'una línia o columna són nuls, el determinant és nul:

Exemple:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 0 \cdot 3 - (1 \cdot 0) = 0 \quad (26)$$

**5a)** Si en una matriu es permuten dues files (o dues columnes), el determinant canvia de signe.

Exemple:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-4) - (2 \cdot (3)) = -10 \quad (27)$$

**6a)** Si un determinant té dues files o columnes paral·leles iguals, el determinant és nul:

Exemple:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 - (1 \cdot 3) = 0 \quad (28)$$

**7a)** Si una matriu quadrada té dues files o dues columnes proporcionals, el seu determinant és nul.

Exemple:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \cdot k \\ 3 & 3 \cdot k \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 \cdot k - (1 \cdot 3 \cdot k) = 0 \quad (29)$$

**8a)** Si els elements d'una línia són combinació lineal de les restants línies paral·leles, el determinant és nul.

Exemple:

Aquesta propietat per matrius  $2 \times 2$  és igual que la propietat 7a). Per això, veurem un exemple amb matrius d'ordre 3. Si a la matriu

$\begin{pmatrix} 2 & 1 & ? \\ -4 & 3 & ? \\ 5 & 2 & ? \end{pmatrix}$  construïm la tercera columna com una combinació de les altre dues, per exemple:  $C_3 \rightarrow C_2 - 2C_1$  trobam el determinant

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -4 & 3 & 11 \\ 5 & 2 & -8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -4 & 3 & 11 \\ 5 & 2 & -8 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot (-8) + (-4) \cdot 2 \cdot (-3) + 1 \cdot 11 \cdot 5 - 5 \cdot 3 \cdot (-3) - (-4) \cdot 1 \cdot (-8) - 2 \cdot 2 \cdot 11 = 0 \quad (30)$$

que comprovam que és nul així com assegura la propietat.

**9a)** Si als elements d'una línia se li suma una combinació lineal de les restants línies, el determinant no varia:

Exemple: Si a la matriu  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$  a la segona columna li sumam 3 vegades la primera  $C_2 \rightarrow C_2 + 3C_1$  trobam

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 \\ -4 & -9 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-9) - 7 \cdot (-4) = -18 + 28 = 10 \quad (31)$$

comprovam que el valor del determinant no canvia així com assegura la propietat.

**10a)** El determinant del producte de dues matrius quadrades és igual al producte dels determinants de les matrius:  $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$

Exemple:  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$  tenen determinant  $|A| = 10$  i  $|B| = -5$ . El producte de les dues matrius és  $A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 3 & -23 \end{pmatrix}$  que té determinant  $|A \cdot B| = -50$  que coincideix amb  $|A| \cdot |B| = 10 \cdot (-5) = -50$ .

D'aquesta darrera propietat deduïm una propietat molt important. Si prenem la matriu  $B$  com la inversa de  $A$  i recordam que per condició d'inversa  $A \cdot A^{-1} = I$  i aplicam la propietat 10a)

#### Condició d'existència de la inversa

$$A \cdot A^{-1} = I \rightarrow |A| \cdot |A^{-1}| = |I| = 1$$

Tenim el producte de dos determinant igualat a 1. Per força, cap dels dos termes pot ésser igual a zero.

Una matriu té inversa (és regular o invertible) si i només si el seu determinant és diferent de zero  $|A| \neq 0$ .

### Exemple 12

Cadascun dels següents determinants és nul

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} 1 & -1 & a \\ 1 & 0 & a \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}$$

$$\text{c) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

$$\text{d) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1+a & 2+a & 3+a & 4+a \\ a & a & a & a \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{vmatrix}$$

Justifica, sense desenvolupar els determinants, el motiu o motius que fan que siguin nuls.

a) Un determinant amb una línia de zeros és nul.

b) La tercera columna és proporcional a la primera. Si treim  $a$  defora del determinant, queda el determinant  $a \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$  amb dues columnes iguals que també és zero.

c) La tercera fila és una combinació lineal de les dues primeres, per això el determinant és nul. La combinació és  $(7 \ 8 \ 9) = -(1 \ 2 \ 3) + 2 \cdot (4 \ 5 \ 6)$ , és a dir  $F_3 = 2F_2 - F_1$ .

d) La segona fila és una combinació lineal de la primera i la tercera, per això el determinant és nul. La combinació és  $F_2 = F_1 + F_3$ .

## 4. Menors i adjunts

### ■ Video explicacions



**Vídeo 1.5:** Menors i adjunts d'una matriu

<https://www.youtube.com/watch?v=7WGnW0l-oKk>



**Vídeo 1.6:** Càlcul de determinants desenvolupant per files o columnes

<https://www.youtube.com/watch?v=tBjLFXRx8EE>

Hem calculat determinants d'ordre 2 i 3 emprant la definició de determinant (regla de Sarrus). Intentar aplicar aquestes tècniques a determinants d'ordre major que 3 és molt complicat, per la qual cosa s'han dissenyat altres mètodes. Començam definint una sèrie de conceptes que necessitem.

### ■ Menor complementari

Donada una matriu quadrada  $A$ , d'ordre  $n$ , es diu **menor complementari de l'element**  $a_{ij}$ , al determinant d'ordre  $(n - 1)$  que s'obté d'eliminar la fila  $i$  i la columna  $j$ .



#### Exemple 13

La matriu  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 5 & 7 & 2 \end{pmatrix}$  té com element  $a_{21} = 2$ , el seu menor complementari s'indica com  $\alpha_{21}$  és el determinant d'ordre 2 que s'obté eliminar la fila 2 i columna 1

$$\alpha_{21} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = -33 \quad (32)$$

Podeu comprovar que el menor  $\alpha_{22} = -19$  i  $\alpha_{13} = 14$ .

### ■ Adjunt d'un element

Donada una matriu quadrada  $A$ , anomenam **adjunt de l'element**  $a_{ij}$ , escrit com  $A_{ij}$ , al menor complementari  $\alpha_{ij}$ , precedit del signe  $+$  o  $-$  segons que la suma de els subíndexs  $(i + j)$  sigui parell o imparell:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \alpha_{ij} \quad (33)$$

Una forma senzilla de recordar-se dels signes és escriure una matriu començant amb  $+$  en el primer element i anar alternant els signes com es mostra en aquesta imatge:

$$\begin{bmatrix} + & - \\ - & + \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix} \quad \dots$$

Figura 4: Signe dels adjunts

El signe  $+$  significa que no canviem el signe del menor, mentre que  $-$  vol dir que n'hem de canviar el signe per tal d'obtenir l'adjunt.



#### Exemple 14

La matriu  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 5 & 7 & 2 \end{pmatrix}$  té com element  $a_{21} = 2$ .

Podeu comprovar els adjunts  $A_{21} = -\alpha_{21} = -(-33) = 33$ ,  $A_{22} = +\alpha_{22} = -19$  i  $A_{13} = +\alpha_{13} = 14$ .

### ■ Desenvolupament d'un determinant per files o columnes

El determinant d'una matriu és igual a la suma dels productes dels elements d'una fila o columna pels seus adjunts corresponents.

Aquesta tècnica permet reduir un determinant d'ordre  $n$  a  $n$  determinants d'ordre  $n - 1$ . Anem a veure com s'aplica amb un exemple en concret.

Si desenvolupam pels adjunts de la primera fila:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 5 & 7 & 2 \end{vmatrix} = +3 \cdot$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = 18$$

Però també podem desenvolupar pel adjunts de la segona fila i obtenir el mateix resultat

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 5 & 7 & 2 \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = 18$$

L'avantatge d'agafar la segona fila és que un element és zero i per tant ens simplifica els càlculs. Aleshores,

A l'hora de desenvolupar un determinant per files o columnes triarem aquella línia que contingui més zeros.



### Exemple 15

Ens demanen calcular el determinant  $3 \times 3$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} \quad (34)$$

Triam desenvolupar per la darrera fila perquè té el màxim de zeros.

$$= 5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} \quad (35)$$

Ara calculam el determinant  $2 \times 2$ :

$$= 5 \cdot (1 \cdot (-1) - 2 \cdot 4) = 5 \cdot (-1 - 8) = 5 \cdot (-9) = -45 \quad (36)$$

De la tècnica de desenvolupament d'un determinant per línies deduïm:

- Si una matriu és diagonal o triangular, el determinant és simplement multiplicar els elements de la diagonal.

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot 5 = 30 \quad (37)$$



### Exercicis

7. Calculeu el determinant  $\begin{vmatrix} a^2 & a & a \\ a & 1 & 2 \\ a & 3 & 4 \end{vmatrix}$  emprant les propietats dels determinants.

*Indicació: Treu un factor  $a$  de la primera fila i columna.*

8. Calculeu el determinant  $\begin{vmatrix} x & x+1 & x+2 \\ x & x+4 & x+6 \\ x & x+8 & x+10 \end{vmatrix}$  emprant les propietats dels determinants.

*Indicació: A la segona i tercera columnes resta-li la primera. Després treu el factor  $x$  de la primera columna.*

## 5. Càlcul de la matriu inversa per adjunts

### ■ Vídeo explicacions



**Vídeo 1.7:** Càlcul de la matriu inversa per determinants  
<https://www.youtube.com/watch?v=VmvMA4yCrcg>



**Vídeo 1.8:** Resolució d'equacions amb matrius  
<https://www.youtube.com/watch?v=-HNGxgTjk3U>

### ■ Matriu d'adjunts

Donada una matriu quadrada  $A$ , es defineix **matriu d'adjunts**  $\text{adj}(A)$  com la matriu formada per tots els adjunts dels elements de la matriu  $A$ .

**Exemple 16**

Començarem trobant tots els menors de la matriu  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 5 & 7 & 2 \end{pmatrix}$ .

$$\begin{aligned} \alpha_{11} &= \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = -21 & \alpha_{12} &= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -11 & \alpha_{13} &= \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = 14 \\ \alpha_{21} &= \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = -33 & \alpha_{22} &= \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -19 & \alpha_{23} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} = 16 \\ \alpha_{31} &= \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3 & \alpha_{32} &= \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1 & \alpha_{33} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2 \end{aligned}$$

Finalment, formant els adjunts corregim el signe dels menors i donam la

resposta en forma de matriu  $\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} -21 & 11 & 14 \\ 33 & -19 & -16 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ .

Els elements que estan acolorits en la matriu són els que s'ha hagut de canviar el signe del menor.

### ■ Càlcul de la matriu inversa

Definim la inversa d'una matriu quadrada  $A$  com la matriu d'adjunts de la transposada de  $A$  dividit pel determinant de  $A$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A^t \quad (38)$$

Una condició necessària i suficient perquè la matriu tingui inversa és que  $|A| \neq 0$

Nota: És indiferent calcular primer la matriu d'adjunts i després transposar o fer-ho al revés.

 Exemple 17

Calcula la inversa de  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Començam cercant el determinant,  $|A| = -1 \neq 0$ , aleshores existeix la inversa.

Transponemos la matriu  $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Calculam la matriu d'adjunts  $\text{adj}(A^t) =$

$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$  i finalment, dividim tot pel valor del determinant  $|A| = -1$   $A^{-1} =$   
 $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

 Exemple 18

Calcula la inversa de  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & -2 \end{pmatrix}$

Començam calculant el determinant de  $|B| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & -2 \end{vmatrix} =$

$= -10 - 18 + 6 - 45 - 4 - 6 = -77$ . Atès que el determinant és diferent de zero, la matriu  $B$  té inversa.

Transponemos la matriu  $B^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

Cercam la matriu d'adjunts  $\text{adj}(B^t) = \begin{pmatrix} -16 & 22 & -13 \\ 1 & -11 & -4 \\ -21 & 0 & 7 \end{pmatrix}$

Finalment, dividim pel determinant de  $B$

$$B^{-1} = \frac{1}{-77} \begin{pmatrix} -16 & +22 & -13 \\ +1 & -11 & -4 \\ -21 & 0 & +7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16/77 & -2/7 & 13/77 \\ -1/77 & 1/7 & 4/77 \\ 3/11 & 0 & -1/11 \end{pmatrix} \quad (39)$$

Es deixa pel lector comprovar que efectivament  $B \cdot B^{-1} = B^{-1} \cdot B = I$ .

**Exemple 19**

Determina la matriu  $X$  que verifica  $A \cdot X \cdot A - B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Essent les matrius  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$  i  $B = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

En primer lloc comprovem si la matriu  $A$  té inversa. El seu determinant  $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$ , llavors té inversa.

$$A^t = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{adj}(A^t) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{La inversa de } A \text{ és } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

A l'equació  $A \cdot X \cdot A = B$ , multiplicam per la dreta i per l'esquerra per la inversa de  $A$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X \cdot A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot B \cdot A^{-1}, \text{ és a dir } X = A^{-1} \cdot B \cdot A^{-1}$$

Nomes queda efectuar els productes de matrius

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

En determinats problemes és més important conèixer la definició i propietats de la matriu inversa que no pas saber-la calcular. En l'exercici següent veurem un exemple d'aplicació de les propietats de la inversa.

 **Exemple 20**

$A$  i  $B$  són dues matrius quadrades que compleixen la següent propietat.

$$A^2 - A \cdot B = I$$

Demostra que  $A$  té inversa i expressa  $A^{-1}$  en funció de  $A$  i  $B$ .

**Demostració que  $A$  té inversa:**

Partim de la propietat de l'enunciat

$$A^2 - A \cdot B = I$$

Si treim factor comú  $A$  al membre de l'esquerra obtenim

$$A \cdot (A - B) = I$$

Si prenem determinats als dos membres tenim (recorda que  $\det(X \cdot Y) = \det(X) \cdot \det(Y)$ )

$$\det(A) \cdot \det(A - B) = \det(I)$$

Com  $I$  és la matriu identitat, el seu determinant és 1. Per tant

$$\det(A) \cdot \det(A - B) = 1$$

D'aquí deduïm que el determinant de  $A$  no pot ser zero, i per tant,  $A$  és invertible.

**Càlcul de  $A^{-1}$ :**

Com que sabem que  $A^{-1}$  existeix, podem multiplicar per  $A^{-1}$  per l'esquerra els dos membres de l'equació  $A \cdot (A - B) = I$

$$A^{-1} \cdot A \cdot A - A^{-1} \cdot A \cdot B = A^{-1} \cdot I$$

Aplicam la definició d'inversa ( $X \cdot X^{-1} = X^{-1} \cdot X = I$ )

$$I \cdot A - I \cdot B = A^{-1}$$

És a dir, arribam a la conclusió que  $A^{-1} = A - B$

 **Exercicis**

9.  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 5 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

- a) Trobau el menor de l'element  $a_{2,3} =$
- b) Trobau l'adjunt de l'element  $a_{3,1} =$
- c) Trobau l'adjunt de l'element  $a_{3,2} =$

10. D'una matriu quadrada  $A$  sabem que compleix la propietat  $A^2 = I$ . Demostra que aquesta matriu té inversa i digues quina n'és la inversa.

11. Considerau la matriu  $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

- a) Calculau el seu determinant.
- b) Calculau la matriu d'adjunts.
- c) Calculau la inversa de la matriu  $M$ .

## Conceptes clau i errades freqüents

### 1 Es poden multiplicar dues matrius qualssevol?

No. Per poder multiplicar dues matrius  $A \cdot B$ , el nombre de columnes de la primera ( $A$ ) ha de coincidir exactament amb el nombre de files de la segona ( $B$ ). I recorda, el producte no és commutatiu!

### 2 Totes les matrius tenen inversa? Com podem saber-ho ràpidament?

Només les matrius quadrades poden tenir inversa, però no totes en tenen. La forma més ràpida de saber-ho és calculant el seu determinant: una matriu té inversa si i només si el seu determinant és diferent de zero ( $|A| \neq 0$ ).

### 3 Si $A$ i $B$ són matrius quadrades del mateix ordre. Se li demana a un alumne que aïlli la matriu $X$ en $A \cdot X = B$ . Diu que $X = \frac{B}{A}$ . Quina equivocació greu ha comès?

Aquesta és una equivocació comuna. En matrius no existeix la divisió. Per resoldre l'equació, primer hauríem d'estar segurs que la matriu  $A$  té inversa. Si en té, hauríem de multiplicar els dos costats per la dreta per la inversa de  $A$ , és a dir,  $A^{-1}$  i així obtenir  $X = A^{-1} \cdot B$ .

- 4** Un alumne ha calculat el següent determinant d'una matriu  $3 \times 3$

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot 0 \cdot 7 + 5 \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot 0 \cdot 4 - (1 \cdot 0 \cdot 3 + 2 \cdot 0 \cdot 4 + 5 \cdot 0 \cdot 7) = 14$$

L'alumne diu que el determinant val 14. Quina gran pífia ha comès?

L'alumne s'ha equivocat operant, segurament inventant-se un producte on no hi ha un zero. La propietat fonamental ens diu que **si una fila o columna té tot zeros, el determinant és automàticament zero**. No cal ni fer els càlculs per la regla de Sarrus! L'alumne podria haver escrit  $= 0$  directament argumentant aquesta propietat.

- 5** Un alumne ha calculat la inversa d'aquesta matriu

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ i li ha sortit } M^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 1 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \text{ Quina errada ha comès?}$$

Per obtenir la matriu inversa, no es fa l'inversa de cada element. Cal seguir el procés  $M^{-1} = \frac{1}{|M|}(\text{adj}(M))^t$ .

De fet, si l'alumne hagués fet la comprovació s'hauria adonat que  $M \cdot M^{-1} \neq I$ .

## Solucions als exercicis proposats

$$1. \text{ a) } A + B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ -3 & 4 & 7 \\ -1 & 0 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 5 \\ -6 & 4 & 8 \\ -1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } 5 \cdot A - B = 5A + (-B) = \begin{pmatrix} 10 & -5 & 25 \\ -15 & 20 & 35 \\ -5 & 0 & 40 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \\ 0 & -5 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 8 & -6 & 25 \\ -12 & 20 & 34 \\ -5 & -5 & 44 \end{pmatrix}$$

c) Atenció l'ordre del producte és important.

$$A^t \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ -1 & 4 & 0 \\ 5 & 7 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ -3 & 4 & 7 \\ -1 & 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 + 9 + 1 & -2 - 12 + 0 & 10 - 21 - 8 \\ -2 - 12 + 0 & 1 + 16 + 0 & -5 + 28 + 0 \\ 10 - 21 - 8 & -5 + 28 + 0 & 25 + 49 + 64 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 14 & -14 & -19 \\ -14 & 17 & 23 \\ -19 & 23 & 138 \end{pmatrix}$$

2. En primer lloc, les dimensions de les matrius són  $A_{3 \times 2}$  i  $B_{2 \times 2}$ . Es poden calcular els següents productes

$$A_{3 \times 2} \cdot B_{2 \times 2} = M_{3 \times 2}$$

$$B_{2 \times 2} \cdot B_{2 \times 2} = M_{2 \times 2}$$

Si, a més, es pogués emprar la transposada també es podria calcular

$$A_{3 \times 2} \cdot A_{2 \times 3}^t = M_{3 \times 3}$$

$$A_{2 \times 3}^t \cdot A_{3 \times 2} = M_{2 \times 2}$$

$$B_{2 \times 2} \cdot A_{2 \times 3}^t = M_{2 \times 3}$$

En aquesta activitat calcularem només els dos primers productes:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 + 0 & 7 + 0 \\ 12 - 6 & 14 + 3 \\ -6 - 10 & -7 + 5 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 6 & 17 \\ -16 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot B = \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 - 14 & 42 + 7 \\ -12 - 2 & -14 + 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 22 & 49 \\ -14 & -13 \end{pmatrix}$$

3. Cal comprovar si es compleix  $M \cdot N = N \cdot M = I$ . Calculam els dos productes:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \neq I$$

Atès que aquest producte és diferent a la matriu identitat, es conclou que les matrius  $M$  i  $N$  no són inverses una de l'altra.

4. Escrivim la condició  $M \cdot M^{-1} = I$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

i plantejam el sistema d'equacions:

$$\begin{cases} a + c = 1 \\ c = 0 \\ b + d = 0 \\ d = 1 \end{cases}$$

que té solució  $a = 1, b = -1, c = 0, d = 1$ . Llavors, la matriu inversa és  $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

5.  $\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 5 \cdot 3 - (-2) \cdot 4 = 23$

6. Utilitzam la regla de Sarrus:  $\begin{vmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 4 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = + \begin{cases} 5 \cdot 3 \cdot 2 \\ 4 \cdot 1 \cdot (-1) \\ (-2) \cdot 0 \cdot 1 \end{cases} - \begin{cases} 1 \cdot 1 \cdot 3 \\ 4 \cdot (-2) \cdot 2 \\ 5 \cdot 0 \cdot (-1) \end{cases} = 26 - (-13) = 39$

7. De la primera fila treim factor  $a$  defora del determinant:  $a \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ a & 1 & 2 \\ a & 3 & 4 \end{vmatrix}$

De la primera columna treim factor  $a$  defora del determinant:

$$a^2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

A la segona i tercera files, li restam la primera fila:  $a^2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}$

Desenvolupam pels adjunts de la primera columna:  $a^2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -2a^2$

8. A la segona i tercera columnes li restam la primera columna:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ x & 4 & 6 \\ x & 8 & 10 \end{vmatrix}$$

De la primera columna treim factor  $x$  defora del determinant:

$$x \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 6 \\ 1 & 8 & 10 \end{vmatrix}$$

A la segona i tercera files, li restam la primera fila:  $x \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 7 & 8 \end{vmatrix}$

Desenvolupam pels adjunts de la primera columna:  $x \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -4x$

9. a) Determinant format d'eliminar la fila 2 i columna 3:  $\alpha_{2,3} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = -10$

b) Determinant format d'eliminar la fila 3 i columna 1 corregit per un signe  $A_{3,1} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = +7$

c) Determinant format d'eliminar la fila 3 i columna 2 corregit per un signe  $A_{3,2} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -3$

10. Partim de la propietat  $A^2 = I$ . I expressam la potència com un producte de matrius.  $A \cdot A = I$ .

Prenem determinants als dos membres de la igualtat:

$$\det(A \cdot A) = \det(I)$$

Sabem que  $\det(A \cdot A) = \det(A) \cdot \det(A)$  i que  $\det(I) = 1$ . Per tant

$$\det(A) \cdot \det(A) = 1$$

D'aquí deduïm que el determinant de  $A$  no pot ser zero, i per tant,  $A$  té inversa.

Per obtenir la matriu inversa, multiplicam per  $A^{-1}$  a l'esquerra

$$A^{-1} \cdot A \cdot A = A^{-1} \cdot I$$

Com que  $A^{-1} \cdot A = I$  i  $A^{-1} \cdot I = A^{-1}$  obtenim que

$$A^{-1} = A$$

És a dir, la matriu  $A$  és la seva pròpia inversa.

$$11. \text{ a) } |M| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \cdot (-1) \cdot 2 \\ 0 \\ -2 \cdot 1 \cdot 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 \cdot (-1) \cdot (-2) \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = -4 - 4 = -8$$

$$\text{b) } \text{adj } M = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & 6 & -2 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } M^{-1} = \frac{1}{-8} (\text{adj } M)^t = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 & -3/8 \\ 1/4 & -3/4 & 1/8 \\ 1/4 & 1/4 & 1/8 \end{pmatrix}$$