


**(D)**

| | Holdout N/events | ΔAUC (95% CI) |
|---|---|---|
| **Primary analysis** | | |
| M2 − M1, imaging (primary) | 30/9 | +0.079 (−0.013 to +0.216) |
| **Updated anatomy** | | |
| M4 − M3, second-MRI anatomy | 30/9 | +0.069 (−0.011 to +0.199) |
| **Clinical adjustment** | | |
| Five covariates | 30/9 | +0.085 (+0.002 to +0.210) |
| Five covariates, complete MMSE | 25/8 | +0.059 (−0.035 to +0.167) |
| Five covariates + APOE ε4 | 30/9 | +0.101 (+0.012 to +0.230) |
| **Timing and acquisition** | | |
| Excluding AD ≤ 30 days after MRI | 29/8 | +0.077 (0.000 to +0.185) |
| Field strength added | 30/9 | +0.063 (−0.011 to +0.158) |
| **Interval** | | |
| Minimum interval 6 months | 21/7 | −0.020 (−0.250 to +0.175) |
| Interval added to both arms | 30/9 | +0.063 (−0.011 to +0.176) |
| **Cohort definition** | | |
| Broader, no range or direction filter | 33/9 | +0.102 (−0.023 to +0.251) |
| All 121, flagged ICV imputed | 37/10 | +0.093 (+0.011 to +0.199) |
| Original 121, imaging | 37/10 | +0.067 (−0.013 to +0.165) |