# 모바일 앱「토닥」콘텐츠 내용타당도 평가지

유방암 환자 부작용 자가관리 애플리케이션 콘텐츠 전문가 평가

## 평가 안내

- 본 평가지는 유방암 치료 부작용 자가관리 앱「토닥」에 담긴 건강정보 콘텐츠의 내용타당도를 평가하기 위한 것입니다.
- 각 항목을 읽으신 뒤 타당한 정도에 V 표시해 주십시오. 1 = 전혀 타당하지 않다 · 2 = 타당하지 않다 · 3 = 타당하다 · 4 = 매우 타당하다
- 1 점 또는 2 점으로 평가하신 항목은 의견란에 이유나 수정 방향을 간단히 적어 주시면 반영에 큰 도움이 됩니다.
- 앱 화면 전체는 함께 보내드린 파일(화면 모음)에서 확인하실 수 있습니다.
- 산출 기준: 항목별 내용타당도지수(I-CVI)는 3~4 점 응답 비율로 계산하며, 0.78 미만 항목은 수정 후 재평가합니다.

## 평가자 정보

| | | | |
|---|---|---|---|
| **성명** | | **평가일** | 2026년 월 일 |
| **소속** | | **직위** | |
| **전문 분야** | | **관련 경력** | 년 |

## 평가 항목

| 번호 | 평가 내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 의견 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. 위험 신호·응급 안내** | | | | | | |
| 1 | 발열 기준(귀 38.0도 / 겨드랑이 37.5도 / 구강 38.3도 또는 38.0도 1시간 지속) 제시가 임상적으로 타당하다 | | | | | |
| 2 | "열이 나면 해열제를 임의로 먹지 말고 치료받는 병원에 먼저 연락"하도록 한 안내가 타당하다 | | | | | |
| 3 | 119 안내 기준(안정 시 호흡곤란, 흉통, 의식 저하)과 병원 연락 기준의 구분이 타당하다 | | | | | |
| 4 | 항암 후 7~14일(백혈구 최저점) 시기의 감염 주의 안내가 타당하다 | | | | | |
| 5 | 자살 위험 관련 안내(자살예방 상담전화 109, 즉시 위험 시 119)의 구분 기준이 타당하다 | | | | | |

| 번호 | 평가 내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 의견 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B. 부작용 상세 정보 (18종)** | | | | | | |
| 6 | 오심·구토: 원인 설명, 식이 요령, 의료진 연락 기준이 타당하다 | | | | | |
| 7 | 피로: 활동-휴식 균형, 운동(요가·기공) 안내, 낮잠 제한(30분·오후 3시 전)이 타당하다 | | | | | |
| 8 | 탈모: 두피 냉각 효과 수준 표현("안 빠지게"가 아닌 "덜 빠지게")이 타당하다 | | | | | |
| 9 | 관절통(아로마타제 억제제): 운동 권고(주 150분 걷기+근력 주 2회)와 임의 중단 금지 안내가 타당하다 | | | | | |
| 10 | 안면홍조·열감: 생활 요령과 침·보충제의 근거 수준 표현이 타당하다 | | | | | |
| 11 | 구내염: 베이킹소다 가글 배합(따뜻한 물 1컵에 베이킹소다 1/4작은술+소금 1/8작은술)이 타당하다 | | | | | |
| 12 | 골수억제·감염: 발열 대응과 개인위생 안내가 타당하다 | | | | | |
| 13 | 설사: 지사제 주의 조건(발열·혈변 시 임의 복용 금지)이 타당하다 | | | | | |
| 14 | 방사선 피부염: 세안·보습제·데오도란트 허용 등 안내가 타당하다 | | | | | |
| 15 | 림프부종: 관리 요령과 감염 징후 안내가 타당하다 | | | | | |
| 16 | 심장 독성(표적치료): 정기 심장검사 강조와 빈도 표현(100명 중 3명 아래)이 타당하다 | | | | | |
| 17 | 표적치료 피부발진: 보습·자외선 차단·짜지 않기 안내가 타당하다 | | | | | |
| 18 | 질 건조·성 건강: 보습제·윤활제 안내가 타당하다 | | | | | |
| 19 | 뼈 건강: 아로마타제 억제제 사용 중 T값 -2.0 기준(일반 -2.5와 구분)이 타당하다 | | | | | |
| 20 | 변비: 식이·수분·활동 안내와 연락 기준이 타당하다 | | | | | |
| 21 | 수면 문제: 기상시각 고정, 침대 제한, 낮잠 30분 안내가 타당하다 | | | | | |
| 22 | 불안·우울: 마음챙김(MBSR)·운동 권고, 109 연계가 타당하다 | | | | | |
| 23 | 인지 변화, 손발 저림, 손발증후군, 미각 변화, 체중 변화 화면의 안내가 타당하다 | | | | | |
| **C. 음식·건강기능식품** | | | | | | |
| 24 | 자몽-치료제 상호작용 안내(자몽주스·자몽맛 음료 포함)가 타당하다 | | | | | |

| 번호 | 평가 내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 의견 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 콩 식품 허용과 고농축 이소플라본 보충제 주의의 구분이 타당하다 | | | | | |
| 26 | 음주 안내("몇 잔까지"가 아닌 "안 마시는 쪽 권고")가 타당하다 | | | | | |
| 27 | 건강기능식품 확인 흐름(안전성을 판정하지 않고 진료 질문으로 연결)이 타당하다 | | | | | |
| 28 | 성분 미확인 제품 대응(새로 시작하지 말고 담당팀·약사 확인)이 타당하다 | | | | | |
| 29 | 증상별 식사 카드(오심·식욕부진·구내염·설사·변비·미각변화·면역·뼈·체중) 내용이 타당하다 | | | | | |
| **D. 복약 관리** | | | | | | |
| 30 | 복약을 놓쳤을 때 안내(임의로 2회분 금지, 약별 확인)가 타당하다 | | | | | |
| 31 | 호르몬치료 임의 중단 방지 메시지(힘들면 끊지 말고 상의)가 타당하다 | | | | | |
| 32 | 약별 부작용 빈도 표기(허가사항의 "매우 흔하게/흔하게" 구간화)가 타당하다 | | | | | |
| **E. AI 상담·기록 안전장치** | | | | | | |
| 33 | AI 상담 하단 고지(교육·자가관리 정보, 응급 시 119·의료진)가 타당하다 | | | | | |
| 34 | 앱 전반의 의료기기 비해당 고지(질병 유무 판단 불가)가 충분하다 | | | | | |
| 35 | 전화 걸기 확인 팝업(실수 방지)이 사용자 안전 관점에서 타당하다 | | | | | |
| 36 | 증상 기록(기분 5단계·증상·강도 버튼)의 구성이 자가관찰 목적에 타당하다 | | | | | |

## 종합 의견

내용이 부족하거나 수정이 필요하다고 생각하시는 화면·주제가 있다면 자유롭게 적어 주십시오.

평가에 귀한 시간을 내어 주셔서 감사합니다. · 연구책임자: 대전대학교 보건의료경영학과 윤보영