

Lathund för cytotatitikantering

Använd handskar och rock med muddar vid all cytotatitikantering. Vid stänk på huden skölj med stora mängder kall vatten. Nedanstående riktlinjer gäller under 48 timmar efter avslutad cytotatitikantering om inte annat anges. Om cytotatitika eller dess aktiva metaboliter utsöndras i urinen vänta alltid tills den blir kall innan fortsatt omhändertagande sker.

cytotatitikagrupp/preparat	urin	kräkning	avföring
Alkylarener			
Nitrogen Mustard (Mustine [®])	normalavfall	normalavfall	normalavfall
Alkylarener			
Cyklofosamid (Sendoxan [®])	riskavfall	normalavfall	normalavfall
• Ifosfamid (Holozan [®])			
Meftalen (Alkeran [®])			
Thiotepa (Thiotepa [®])			
Busulfan i.v.			
Alkylarener			
Busulfan (Myleran [®]) p.o.	riskavfall	riskavfall - 4 tim efter dos	normalavfall
Antimetaboliter			
5-Fluoro-Uracil (Fluoro-Uracil [®])	normalavfall	normalavfall	normalavfall
Antimetaboliter			
Meotrexat (Meotrexate [®])	riskavfall	normalavfall	normalavfall
Cytarabin, ARA-C (Cytosar [®])			
Fludauridin (Fludaur [®])			
CCl ₄ , cladribin (Leustatin [®] , Biotidin [®])			
Gemcitabine (Gemzar [®])			
Antitumörantibiotika			
Doxorubicin (Cardidin [®])			
Doxorubicin (Adriamycin [®])			
Epirubicin (Epirubicin [®])			
Idarubicin (Zavedos [®])	riskavfall	riskavfall	riskavfall
Ameskin (Ameskin [®])			
Bleomycin (Bleomycin [®])			
Mitoxantrone (Noventrone [®])			
Mitomycin (Mitomycin [®])			

Lathund för cytotatitkahandtering

Använd handskar och rock med muddar vid all cytotatitkahandtering. Vid stick på huden skölj med stora mängder kallt vatten. Nedanstående riktlinjer gäller under 48 timmar efter avslutad cytotatitkahandtering om inte annat anges. Om cytotatitka eller dess aktiva metaboliter utsködas i urinen vänta alltid tills den blir kall innan fortsatt omhändertagande sker.

cytotatitkagrupp/preparat	urin	kräkning	avföring
Mitoshlammare (Vinkalkaloider)			
Vinkristin (Oncovin)	normalavfall	riskavfall - 72 tim efter dos	riskavfall - 72 tim efter dos
Vinblastin (Velbo)			
Mitoshlammare (Vinkalkaloider)	riskavfall	riskavfall - 72 tim efter dos	riskavfall - 72 tim efter dos
Vinorelbine (Navelbine)			
Mitoshlammare (Taxaner)	riskavfall - 24 tim efter dos	riskavfall - 24 tim efter dos	riskavfall - 24 tim efter dos
Paclitaxel (Taxo)			
Docetaxel (Taxotere)			
Topoisomeras II-hämmare (Podofylotoxiner)	normalavfall	riskavfall - 72 tim efter dos	riskavfall - 72 tim efter dos
Etoposid (Vepesid, Etopos)			
Teniposid (Vumon)			
Topoisomeras I-hämmare (Camptothecin)			
Irinotecan (Campio)	riskavfall - 24 tim efter dos	normalavfall	normalavfall
Övriga cytotatitka (Alkylare m. alkyl grupp)			
Procarbazon (Natalan)	normalavfall	normalavfall	normalavfall
Övriga cytotatitka (Alkylare m. alkyl grupp)	riskavfall - 24 tim efter dos	normalavfall	normalavfall
Decarbazine (DTIC)			
Övriga cytotatitka (Platinföreningar)	riskavfall	riskavfall	riskavfall
Cisplatin (Platinol)			
Karboplatin (Paraplatin)			
Oxaliplatin (Eloxatine)			
Övriga cytotatitka (Nitrosureaföreningar)	riskavfall	normalavfall	normalavfall
Karmustin, BCNU (Becemu)			
Övriga cytotatitka	riskavfall - 72 tim efter dos	riskavfall - 72 tim efter dos	riskavfall - 72 tim efter dos
Melengeston (Meyl-Gag)			