MolProbity Ramachandran analysis

7d00.H.pdb, model 1



87.9% (3328/3786) of all residues were in favored (98%) regions.
98.2% (3716/3786) of all residues were in allowed (>99.8%) regions.
This list is truncated; use the MolProbity multi-chart.html for complete list.
There were 70 outliers (phi, psi):

A 331 Asn (-68.2, -152.7)
A 336 Cys (66.1, 127.4)
A 337 Pro (-99.2, 73.9)
A 339 Gly (-51.4, 22.7)
A 349 Ser (-52.6, 174.1)
A 484 Glu (-66.0, -151.9)
A 518 Leu (-62.2, -105.2)
A 520 Ala (-77.3, -162.2)
A 522 Ala (164.4, -179.1)
A 526 Gly (-64.0, -147.4)
B 88 Asp (-162.9, 0.2)
C 331 Asn (-57.7, -157.4)
C 336 Cys (66.1, 139.5)
C 349 Ser (-52.6, 174.1)
C 484 Glu (-66.0, -151.9)
C 518 Leu (-62.2, -105.3)
C 520 Ala (-77.3, -162.2)
C 522 Ala (164.4, -179.1)
C 591 Ser (-21.7, 137.3)
C 810 Ser (-173.1, 39.2)
C 811 Lys (-148.2, -162.2)
C 812 Pro (-51.6, 99.8)
C 813 Ser (67.7, -85.0)
C 814 Lys (172.6, 74.1)
H 16 Gly (-64.5, -130.1)
H 17 Ser (166.0, 173.2)
H 18 Leu (174.3, 133.7)
H 86 Arg (-62.2, 10.3)
H 90 Thr (-34.1, 99.2)
H 102 Phe (169.8, -110.2)
H 103 Asp (53.0, -179.0)
H 106 Gly (-60.8, -156.1)
H 117 Ser (-68.6, -85.0)
K 49 Tyr (-64.6, -149.5)
K 51 Ala (168.3, -78.0)
K 81 Glu (170.5, 19.1)
K 90 Gln (169.7, 77.3)
K 91 Leu (-53.0, -177.1)
K 92 Asn (82.3, -73.0)
K 94 Tyr (-50.4, -98.2)
K 95 Pro (-53.9, 103.6)
K 109 Thr (172.9, -92.8)
K 110 Val (-157.4, 86.5)
K 138 Asn (42.0, 129.2)
K 139 Phe (176.1, 129.5)
K 140 Tyr (-68.9, -80.5)
K 143 Glu (-67.4, 46.7)
J 16 Gly (-64.5, -130.1)
J 17 Ser (165.9, 173.2)
J 18 Leu (174.3, 133.7)
J 86 Arg (-62.1, 10.2)
J 90 Thr (-34.1, 99.2)
J 102 Phe (169.8, -110.3)
J 103 Asp (53.0, -179.0)
J 106 Gly (-60.8, -156.1)
J 117 Ser (-68.6, -85.1)
N 49 Tyr (-64.6, -149.5)
N 51 Ala (168.3, -78.1)
N 81 Glu (170.6, 19.2)
N 90 Gln (169.7, 77.3)
N 91 Leu (-53.0, -177.1)
N 92 Asn (82.4, -73.1)
N 94 Tyr (-50.4, -98.2)
N 95 Pro (-53.8, 103.6)

Lovell, Davis, et al. Proteins 50:437 (2003)