

1 \mathbb{R} und \mathbb{C}

Ordnungsvollständigkeit: Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ s. d.

(i) $A \neq \emptyset$ (ii) $\forall a \in A \forall b \in B \ a \leq b$

Dann: $\exists c \in \mathbb{R}$ s.d. $\forall a \in A \ a \leq c \leq b \ \forall b \in B$

Korollar 1.1.7 (Archimedisches Prinzip)

Sei $x > 0, y \in \mathbb{R}$ Dann: $\exists n \in \mathbb{N} \ y \leq n \cdot x$

Satz 1.1.8 $\forall t \geq 0, t \in \mathbb{R}$ hat $x^2 = t$ eine Lösung in \mathbb{R}

Satz 1.1.10 $\forall x, y \in \mathbb{R}$

(i) $|x| \geq 0$

(iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$

(ii) $|xy| = |x||y|$

(iv) $|x + y| \geq ||x| - |y||$

Satz 1.1.11 (Young'sche Ungleichung)

$\forall \varepsilon > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}$ gilt: $2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$

Definition 1.1.12 Sei $A \subset \mathbb{R}$

(i) / (ii) $c \in \mathbb{R}$ ist eine **obere/untere Schranke** von A wenn $\forall a \in A \ a \leq / \geq c$. A ist **nach oben/unten beschränkt**, wenn es eine obere/untere Schranke gibt.

(iii) / (iv) $m \in \mathbb{R}$ ist ein **Maximum/Minimum** von A wenn $m \in A$ und m **obere/untere Schranke** von A ist.

Satz 1.1.15 Sei $A \subseteq \mathbb{R}, A \neq \emptyset$ Sei A nach oben/unten beschränkt. Dann gibt es eine kleinste obere / grösste untere Schranke von A : $c := \sup A / c := \inf A$ genannt **Supremum/Infimum** von A

Korollar 1.1.16 Seien $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$ Wenn B **nach oben/unten beschränkt** ist, folgt $\sup A \leq \sup B / \inf B \leq \inf A$

Konvention: Wenn A **nicht beschränkt** ist, definieren wir $\sup A = +\infty$ bzw. $\inf A = -\infty$

Satz 1.3.4 (Fundamentalsatz der Algebra) Sei $n \geq 1, n \in \mathbb{N}, a_j \in \mathbb{C}$ und

$$P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0$$

Dann

$$\exists z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C},$$

so dass

$$P(z) = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n)$$

2 Folgen und Reihen

2.1 Grenzwert einer Folge

Definition 2.1.1 Eine **Folge (reeller Zahlen)** ist eine Abbildung $a : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben a_n statt $a(n)$ und bezeichnen eine Folge mit $(a_n)_{n \geq 1}$

Lemma 2.1.3 Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ eine Folge. Dann gibt es **höchstens eine reelle Zahl $l \in \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft:** $\forall \varepsilon > 0$ ist die Menge $\{n \in \mathbb{N} : a_n \notin [l - \varepsilon, l + \varepsilon]\}$ **endlich**.

Definition 2.1.4 Eine Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ ist **konvergent**, wenn es $l \in \mathbb{R}$ gibt, so dass $\forall \varepsilon > 0$ die Menge $\{n \in \mathbb{N} : a_n \notin [l - \varepsilon, l + \varepsilon]\}$ **endlich** ist.

Lemma 2.1.6 Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ eine Folge. Folgende Aussagen sind äquivalent

(1) $(a_n)_{n \geq 1}$ **konvergiert gegen $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$**

(2) $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$, so dass $|a_n - l| < \varepsilon \ \forall n \geq N$

Satz 2.1.8 Seien $(a_n)_{n \geq 1}, (b_n)_{n \geq 1}$ **konvergent** mit $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

(1) $(a_n + b_n)_{n \geq 1}$ ist **konvergent**: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$

(2) $(a_n \cdot b_n)_{n \geq 1}$ ist **konvergent**: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$

(3) Sei $\forall n \geq 1 \ b_n \neq 0$ und $b \neq 0$. Dann ist $(\frac{a_n}{b_n})_{n \geq 1}$ **konvergent** und $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{a_n}{b_n})_{n \geq 1} = \frac{a}{b}$

(4) Wenn $\exists K \geq 1$ mit $\forall n \geq K : a_n \leq b_n$, folgt $a \leq b$

Beispiel 2.1.9 $b \in \mathbb{Z} : \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^b = 1$. Das folgt aus $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n}) = 1$ und wiederholter Anwendung von **Satz 2.1.8 (2) und (3)**.

2.2 Satz von Weierstrass

Definition 2.2.1 (1)[(2)] $(a_n)_{n \geq 1}$ ist **monoton wachsend [fallend]** wenn: $a_n \leq [\geq] a_{n+1} \ \forall n \geq 1$

Satz 2.2.2 (Weierstrass) Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ **monoton wachsend [fallend]** und **nach oben [unten] beschränkt**. Dann **konvergiert $(a_n)_{n \geq 1}$ mit**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n : n \geq 1\}$$

$$[\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n : n \geq 1\}]$$

Beispiel 2.2.3 Sei $a \in \mathbb{Z}$ und $0 \leq q < 1$. Dann gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^a q^n = 0.$$

Wir können annehmen, dass $q > 0$. Sei $x_n = n^a q^n$, dann folgt:

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= (n+1)^a q^{n+1} \\ &= \left(\frac{n+1}{n}\right)^a q \cdot n^a q^n \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^a \cdot q \cdot x_n. \end{aligned}$$

Also:

$$x_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^a \cdot q \cdot x_n.$$

Da $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^a = 1$ (**Beispiel 2.1.9**), gibt es ein n_0 , so dass

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^a < \frac{1}{q} \ \forall n \geq n_0.$$

Es folgt:

$$x_{n+1} < x_n \ \forall n \geq n_0.$$

Da für $x_n > 0 \ \forall n \geq 1$ die Folge nach **unten beschränkt** ist und für $n \geq n_0$ **monoton fallend** ist.

Sei

$$\begin{aligned} l &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^a \cdot q x^n \\ &= q \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = q \cdot l. \end{aligned}$$

Also $(1 - q) \cdot l = 0$ woraus $l = 0$ folgt.

Bemerkung 2.2.24 In **Beispiel 2.2.3** wird zweimal die folgende einfache Tatsache verwendet: Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ eine **konvergente** Folge mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $k \in \mathbb{N}$. Dann ist die durch

$$b_n := a_{n+k} \ n \geq 1$$

definierte Folge **konvergent** und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a.$$

Lemma 2.2.7 (Bernoulli Ungleichung)

$$(1 + x)^n \geq 1 + n \cdot x \ \forall n \in \mathbb{N}, x > -1$$

2.3 Limes superior und Limes inferior

Limes inferior/ superior: Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ eine beschränkte Folge. Sei $\forall n \geq 1$:

$$b_n = \inf\{a_k : k \geq n\}$$

$$c_n = \sup\{a_k : k \geq n\}$$

Dann folgt $\forall n \geq 1$ $b_n \leq b_{n+1}$ (monoton wachsend) und $c_n \geq c_{n+1}$ (monoton fallend) und beide Folgen beschränkt. Wir definieren:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$$

2.4 Cauchy Kriterium

Lemma 2.4.1 $(a_n)_{n \geq 1}$ konvergiert genau dann, wenn $(a_n)_{n \geq 1}$ beschränkt und $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$

Satz 2.4.2 (Cauchy Kriterium) $(a_n)_{n \geq 1}$ ist genau dann konvergent, wenn $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$,

$$|a_n - a_m| < \varepsilon \quad \forall n, m \geq N$$

2.5 Satz von Bolzano-Weierstrass

Definition 2.5.1 Ein abgeschlossenes Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ ist von der Form

$$(1) [a, b] \quad a \leq b \in \mathbb{R}$$

$$(3)]-\infty, a] \quad a \in \mathbb{R}$$

$$(2) [a, +\infty[\quad a \in \mathbb{R}$$

$$(4)]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

Bemerkung 2.5.2 Ein Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ ist genau dann abgeschlossen, wenn für jede konvergente Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ mit $a_n \in I$ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in I$.

Bemerkung 2.5.3 Seien $I = [a, b]$, $J = [c, d]$ mit $a \leq b$, $c \leq d$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Dann ist $I \subseteq J$ genau dann, wenn $c \leq a$, $b \leq d$

Satz 2.5.5.5 (Cauchy-Cantor) Sei

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots \supseteq I_n \supseteq I_{n+1} \supseteq \dots$$

eine Folge abgeschlossener Intervalle mit

$$\mathcal{L}(I_1) < +\infty$$

Dann gilt

$$\bigcap_{n \geq 1} I_n \neq \emptyset.$$

Falls zudem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{L}(I_n) = 0$$

gilt, enthält

$$\bigcap_{n \geq 1} I_n$$

genau einen Punkt.

Definition 2.5.7 Eine Teilfolge einer Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ ist eine Folge $(b_n)_{n \geq 1}$, wobei

$$b_n = a_{l(n)}$$

und

$$l : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$$

eine Abbildung mit der Eigenschaft

$$l(n) < l(n+1) \quad \forall n \geq 1$$

Satz 2.5.9 (Bolzano-Weierstrass) Jede beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

2.6 Folgen in \mathbb{R}^d und \mathbb{C}

Definition 2.6.1 Eine Folge in \mathbb{R}^d ist eine Abbildung $a : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}^d$. Wir schreiben a_n statt $a(n)$ und bezeichnen die Folge mit $(a_n)_{n \geq 1}$

Definition 2.6.2 Eine Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ in \mathbb{R}^d ist konvergent, wenn $\exists a \in \mathbb{R}^d$, so dass $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$ mit

$$\|a_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n \geq N$$

Satz 2.6.3 Sei $b = (b_1, \dots, b_d)$. Folgende Aussagen sind äquivalent:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} a_{nj} = b_j \quad \forall 1 \leq j \leq d$$

Bemerkung 2.6.4 Sei $x = (x_1, \dots, x_d)$.

Dann ist $\forall 1 \leq j \leq d$

$$x_j^2 \leq \sum_{i=1}^d x_i^2 = \|x\|^2 \leq d \cdot \max_{1 \leq i \leq d} x_i^2$$

woraus

$$|x_j| \leq \|x\| \leq \sqrt{d} \cdot \max_{1 \leq i \leq d} |x_i|$$

folgt.

Bemerkung 2.6.5 Eine konvergente Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ in \mathbb{R}^d ist beschränkt. Das heisst: $\exists R \geq 0$ mit $\|a_n\| \leq R \quad \forall n \geq 1$

Satz 2.6.6 (1) Eine Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ konvergiert genau dann, wenn sie eine Cauchy Folge ist: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$ mit $\|a_n - a_m\| < \varepsilon \quad \forall n, m \geq N$.

(2) Jede beschränkte Folge hat eine konvergente Teilfolge.

2.7 Reihen

Definition 2.7.1 Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ist konvergent, wenn die Folge $(S_n)_{n \geq 1}$ der Partialsummen konvergiert. In diesem Fall definieren wir: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

Beispiel 2.7.2 (Geometrische Reihe) Sei $q \in \mathbb{C}$ mit $|q| < 1$. Dann konvergiert

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$$

Sei

$$S_n = \sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + \dots + q^n.$$

$$q \cdot S_n = q + \dots + q^n + q^{n+1}$$

woraus

$$(1-q)S_n = 1 - q^{n+1}$$

folgt. Es gilt also:

$$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Nun zeigen wir die Konvergenz:

$$|S_n - \frac{1}{1-q}| = \left| \frac{-q^{n+1}}{1-q} \right| = \frac{|q|^{n+1}}{|1-q|}.$$

Es folgt aus **Beispiel 2.2.3** und $0 \leq |q| < 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |S_n - \frac{1}{1-q}| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|q|^{n+1}}{|1-q|} = 0.$$

Somit konvergiert $(S_n)_{n \geq 1}$ gegen $\frac{1}{1-q}$.

Beispiel 2.7.3 (Harmonische Reihe) Die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

divergiert.

Satz 2.7.4 Seien $\sum_{k=1}^{\infty} a_k, \sum_{j=1}^{\infty} b_j$ konvergent sowie $\alpha \in \mathbb{C}$. Dann ist:

(1) $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)$ konvergent und

$$\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k \right) + \left(\sum_{j=1}^{\infty} b_j \right)$$

(2) $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha \cdot a_k)$ konvergent und

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha \cdot a_k) = \alpha \cdot \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Satz 2.7.5 (Cauchy Kriterium) Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ist genau dann konvergent, wenn: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$ mit $|\sum_{k=n}^m a_k| < \varepsilon \quad \forall m \geq n \geq N$.

Satz 2.7.6 Eine Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ mit $a_k \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}^*$

konvergiert genau dann, wenn die Folge $(S_n)_{n \geq 1}$

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

der Partialsummen nach oben beschränkt ist.

Korollar 2.7.7 (Vergleichssatz) Seien $\sum_{k=1}^{\infty} a_k, \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ Reihen mit: $0 \leq a_k \leq b_k \quad \forall k \geq 1$. Dann gelten:

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{ konvergent} \implies \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ konvergent}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ divergent} \implies \sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{ divergent}$$

Die Implikationen treffen auch zu, wenn $\exists K \geq 1$ mit $0 \leq a_k \leq b_k \quad \forall k \geq K$

Definition 2.7.9 Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ist absolut konvergent, wenn $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ konvergiert.

Satz 2.7.10 Eine absolut konvergente Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ist auch konvergent und es gilt: $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$

Satz 2.7.12 (Leibniz 1682) Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ monoton fallend mit $a_n \geq 0 \quad \forall n \geq 1$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Dann konvergiert

$$S := \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$$

und es gilt:

$$a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$$

Definition 2.7.14 Eine Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n$ ist eine Umordnung der Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ wenn es eine bijektive Abbildung $\phi: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ gibt, so dass $a'_n = a_{\phi(n)}$

Satz 2.7.16 (Dichlet 1837) Wenn $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergiert, dann konvergiert jede Umordnung der Reihe mit demselben Grenzwert.

Satz 2.7.17 (Quotientenkriterium, Cauchy 1821) Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ mit $a_n \neq 0 \quad \forall n \geq 1$ und $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ eine Reihe.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1 \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ konvergiert absolut}$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} > 1 \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ divergiert}$$

Beispiel 2.7.18 (Exponentialfunktion)

Für $z \in \mathbb{C}$ betrachten wir die Reihe:

$$1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots$$

mit allgemeinem Glied

$$a_n = \frac{z^n}{n!}.$$

Dann folgt für $z \neq 0$:

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \left| \frac{z^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{z^n} \right| = \frac{|z|}{n+1}.$$

Also gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = 0$$

und die Reihe konvergiert für alle $z \in \mathbb{C}$. Wir definieren die Exponentialfunktion:

$$\exp z := 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

Bemerkung 2.7.19 Das Quotientenkriterium versagt, wenn z. B. unendlich viele Glieder a_n der Reihe verschwinden (= 0 sind)

Satz 2.7.20 (Wurzelkriterium, Cauchy 1821)

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ konvergiert absolut}$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1 \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ und } \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ divergieren}$$

Konvergenzradius

Sei $(c_k)_{k \geq 0}$ eine Folge (in \mathbb{R} oder \mathbb{C}). Wenn

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}$$

existiert, definieren wir:

$$\rho = +\infty \quad \text{wenn } \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = 0$$

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}} \quad \text{wenn } \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} > 0$$

Riemann Zeta Funktion Sei $s > 1$ und

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

Wir wissen, dass $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konvergiert. Die Reihe konvergiert $\forall s > 1$

Korollar 2.7.21 Die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ konvergiert absolut $\forall |z| < \rho$ und divergiert $\forall |z| > \rho$.

Definition 2.7.22 $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ ist eine lineare Anordnung der Doppelreihe $\sum_{i,j \geq 0} a_{ij}$, wenn es eine Bijektion $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ gibt, mit $b_k = a_{\sigma(k)}$.

Satz 2.7.23 (Cauchy 1821) Wir nehmen an, dass es $B \geq 0$ gibt, so dass $\sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^m |a_{ij}| \leq B \quad \forall m \geq 0$. Dann konvergieren die folgenden Reihen absolut:

$$S_i := \sum_{j=0}^{\infty} a_{ij} \quad \forall i \geq 0 \text{ und } U_j := \sum_{i=0}^{\infty} a_{ij} \quad \forall j \geq 0$$

sowie

$$\sum_{i=0}^{\infty} S_i \text{ und } \sum_{j=0}^{\infty} U_j$$

und es gilt:

$$\sum_{i=0}^{\infty} S_i = \sum_{j=0}^{\infty} U_j$$

Und jede lineare Anordnung der Doppelreihe konvergiert absolut mit gleichem Grenzwert.

Definition 2.7.24 Das Cauchy Produkt der Reihen $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$, $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$ ist die Reihe:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{\infty} a_{n-j} b_j \right) \\ = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) + \dots \end{aligned}$$

Satz 2.7.26 Falls die Reihen $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$, $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$ absolut konvergieren, konvergiert ihr Cauchy Produkt und es gilt:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{\infty} a_{n-j} b_j \right) = \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j \right)$$

Anwendung 2.7.27 (Exponentialfunktion) $\forall z, w \in \mathbb{C}$
 $\exp(w+z) = \exp(w) \exp(z)$.

Wir berechnen das Cauchy Produkt der Reihen: $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{w^i}{i!}$, $\sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^j}{j!}$. Dieses ist: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^n \frac{w^{n-j}}{(n-j)!} \frac{z^j}{j!} \right)$. Woraus die Behauptung folgt.

Satz 2.7.28 Sei $f_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge. Wir nehmen an, dass:

(1) $f(j) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(j) \quad \forall j \in \mathbb{N}$ existiert

(2) es eine Funktion $g : \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty[$ gibt, so dass

2.1 $|f_n(j)| \leq g(j) \quad \forall j \geq 0, \forall n \geq 0$

2.2 $\sum_{j=0}^{\infty} g(j)$ konvergiert.

Dann folgt:

$$\sum_{j=0}^{\infty} f(j) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^{\infty} f_n(j)$$

Korollar 2.7.29 (Exponentialfunktion) $\forall z \in \mathbb{C}$ konvergiert die Folge $\left(1 + \frac{z}{n}\right)_{n \geq 1}$ und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = \exp(z)$$

3 Stetige Funktionen

3.1 Reellwertige Funktionen

Definition 3.1.1 f ist nach [oben/unten] beschränkt wenn $f(D) \subseteq \mathbb{R}$ nach [oben/unten] beschränkt ist.

Definition 3.1.2 Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, wobei $D \subseteq \mathbb{R}$, ist:

(1)[(2)] [streng] monoton wachsend, wenn
 $\forall x, y \in D \quad x \leq [<] y \Rightarrow f(x) \leq [<] f(y)$

(3)[(4)] [streng] monoton fallend, wenn
 $\forall x, y \in D \quad x \leq [<] y \Rightarrow f(x) \geq [>] f(y)$

(5)[(6)] [streng] monoton, wenn f [streng] monoton wachsend oder fallend ist.

3.2 Stetigkeit

Definition 3.2.1 Sei $D \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in D$. Die Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist in x_0 stetig, wenn $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$, so dass $\forall x \in D$ die Implikation: $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ gilt

Definition 3.2.2 Die Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig, wenn sie in jedem Punkt von D stetig ist.

Satz 3.2.4 Sei $x_0 \in D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Die Funktion f ist genau dann in x_0 stetig, wenn für jede Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ in D die folgende Implikation gilt:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(x_0)$.

Korollar 3.2.5 Seien $x_0 \in D \subseteq \mathbb{R}$, $\lambda \in \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ beide stetig in x_0 :

(1) $f + g$, $\lambda \cdot f$, $f \cdot g$ sind stetig in x_0 .

(2) Wenn $g(x_0) \neq 0$ ist, ist $\frac{f}{g} : D \cap \{x \in D : g(x) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$ stetig in x_0

Definition 3.2.6 Eine polynomielle Funktion $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist eine Funktion der Form: $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ wobei: $a_n, \dots, a_0 \in \mathbb{R}$. Wenn $a_n \neq 0$ ist, ist n der Grad von P .

Korollar 3.2.7 Polynomielle Funktionen sind auf ganz \mathbb{R} stetig.

Korollar 3.2.8 Seien P, Q polynomielle Funktionen

auf \mathbb{R} mit $Q \neq 0$. Seien x_1, \dots, x_m die Nullstellen von Q . Dann ist $\frac{P}{Q} : \mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_m\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$ stetig.

3.3 Zwischenwertsatz

Satz 3.3.1 (Zwischenwertsatz, Bolzano 1817) Seien $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und $a, b \in I$. Für jedes c zwischen $f(a)$ und $f(b)$ gibt es ein z zwischen a und b mit $f(z) = c$.

3.4 Min-Max Satz

Definition 3.4.2 Ein Intervall $I \subset \mathbb{R}$ ist kompakt, wenn es von der Form $I = [a, b]$, $a \leq b$ ist.

Lemma 3.4.3 Sei $D \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in D$ und $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in x_0 . So sind $|f|$, $\max(f, g)$, $\min(f, g)$ stetig in x_0 .

Lemma 3.4.4 Sei $(x_n)_{n \geq 1}$ eine konvergente Folge in \mathbb{R} mit Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \mathbb{R}$. Sei $a \leq b$. Wenn $\{x_n : n \geq 1\} \subseteq [a, b]$, folgt: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in [a, b]$.

Satz 3.4.5 Sei $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf einem kompakten Intervall I . Dann gibt es $u \in I$ und $v \in I$ mit: $f(u) \leq f(x) \leq f(v) \quad \forall x \in I$. Insbesondere ist f beschränkt.

3.5 Umkehrabbildung

Satz 3.5.1 Seien $D_1, D_2 \subseteq \mathbb{R}$, $f : D_1 \rightarrow D_2$, $g : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in D_1$. Wenn f in x_0 und g in $f(x_0)$ stetig sind, so ist $g \circ f : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$ in x_0 stetig.

Korollar 3.5.2 Wenn in Satz 3.5.1 f auf D_1 und g auf D_2 stetig sind, ist $g \circ f$ auf D_1 stetig.

Satz 3.5.3 Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, streng monoton. Dann ist $J := f(I) \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f^{-1} : J \rightarrow I$ ist stetig, streng monoton.

3.6 Reelle Exponentialfunktion

Satz 3.6.1 $\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$ ist streng monoton wachsend, stetig und surjektiv.

Korollar 3.6.2 $\exp(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Aus der Potenzreihendarstellung von \exp folgt ausserdem: $\exp(x) > 1 \quad \forall x > 0$. Wenn $y < z$ ist, folgt (aus 2.7.27) $\exp(z) = \exp(y + (z - y)) = \exp(y) \exp(z - y)$ und da $\exp(z - y) > 1$ ist folgt folgendes Korollar:

Korollar 3.6.3 $\exp(z) > \exp(y) \quad \forall z > y$

Korollar 3.6.4 $\exp(x) \geq 1 + x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Korollar 3.6.5 Der **natürlich Logarithmus** $\ln :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ ist eine **streng monoton wachsende, stetige, bijektive** Funktion. Des weiteren gilt $\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b \quad \forall a, b \in]0, +\infty[$.

Korollar 3.6.6 (1)/(2) Für $a > / < 0$ ist $]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[, x \mapsto x^a$ eine **stetige, streng monoton wachsende/fallende Bijektion**. $\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall x > 0$:

(3) $\ln(x^a) = a \ln(x)$

(4) $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$

(5) $(x^a)^b = x^{a \cdot b}$

3.7 Konvergenz von Funktionenfolgen

Definition 3.7.1 Die Funktionenfolge $(f_n)_{n \geq 0}$ **konvergiert punktweise** gegen eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, wenn $\forall x \in D : f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

Definition 3.7.3 (Weierstrass 1841) Die Folge $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ **konvergiert gleichmässig** in D gegen $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, wenn gilt: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$, so dass: $\forall n \geq N, \forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Satz 3.7.4 Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine **Funktionenfolge** bestehend aus (in D) **stetigen Funktionen**, die (in D) **gleichmässig gegen eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ konvergiert**. Dann ist f (in D) **stetig**.

Definition 3.7.5 Eine Funktionenfolge $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist **gleichmässig konvergent**, wenn $\forall x \in D$ der **Grenzwert** $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ existiert und die Folge $(f_n)_{n \geq 0}$ **gleichmässig gegen f konvergiert**.

Korollar 3.7.6 Die Funktionenfolge $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ **konvergiert genau dann gleichmässig** in D , wenn: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$, so dass $\forall n, m \geq N$ und $\forall x \in D : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$.

Korollar 3.7.7 Sei $D \subseteq \mathbb{R}$. Wenn $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine **gleichmässig konvergente Folge stetiger Funktionen** ist, dann ist die Funktion $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ **stetig**.

Definition 3.7.8 Die **Reihe** $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ **konvergiert gleichmässig** (in D), wenn die durch $S_n(x) :=$

$\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ definierte Funktionenfolge **gleichmässig konvergiert**.

Satz 3.7.9 Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge **stetiger Funktionen**. Wir nehmen an, dass $|f_n(x)| \leq c_n \quad \forall x \in D$ und, dass $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ **konvergiert**. Dann **konvergiert** die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ **gleichmässig** in D und deren Grenzwert $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ **ist eine in D stetige Funktion**.

Definition 3.7.10 Die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ hat **positiven Konvergenzradius**, wenn $\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}$ existiert.

Der **Konvergenzradius** ist dann definiert als: $\rho = +\infty$ für $\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = 0$, $\rho = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}}$ für

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} > 0.$$

Satz 3.7.11 Sei $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ eine **Potenzreihe** mit **positivem Konvergenzradius** $\rho > 0$ und $f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k, |x| < \rho$. Dann gilt: $\forall 0 \leq r < \rho$ **konvergiert** $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ **gleichmässig** auf $[-r, r]$, insbesondere ist $f :]-\rho, \rho[\rightarrow \mathbb{R}$ **stetig**.

3.8 Trigonometrische Funktionen

Satz 3.8.1 $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sind **stetige Funktionen**.

Satz 3.8.2 Sei $z \in \mathbb{C}$

(1) $\exp iz = \cos(z) + i \sin(z)$

(2) $\cos(z) = \cos(-z)$ und $\sin(-z) = -\sin(z)$

(3) $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

(4) $\sin(z + w) = \sin(z) \cos(w) + \cos(z) \sin(w),$
 $\cos(z + w) = \cos(z) \cos(w) - \sin(z) \sin(w)$

(5) $\cos^2(z) + \sin^2(z) = 1$

Korollar 3.8.3 $\sin(2z) = 2 \sin(z) \cos(z)$

$\cos(2z) = \cos^2(z) - \sin^2(z)$

3.9 Die Kreiszahl π

Satz 3.9.1 Die **Sinusfunktion** hat auf $]0, +\infty[$ **mindestens eine Nullstelle**. Sei $\pi := \inf\{t > 0 : \sin t = 0\}$.

(1) $\sin \pi = 0, \pi \in]2, 4[$

(2) $\forall x \in]0, \pi[: \sin x > 0$

(3) $e^{\frac{i\pi}{2}} = i$

Korollar 3.9.2 $x \geq \sin x \geq x - \frac{x^3}{3!} \quad \forall 0 \leq x \leq \sqrt{6}$

Korollar 3.9.3 Sei $x \in \mathbb{R}$

(1) $e^{i\pi} = -1, e^{2i\pi} = 1$

(2) $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x), \cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin(x)$

(3) $\sin(x + \pi) = -\sin(x), \sin(x + 2\pi) = \sin(x)$

(4) $\cos(x + \pi) = -\cos(x), \cos(x + 2\pi) = \cos(x)$

(5) **Nullstellen von Sinus** $= \{k \cdot \pi : k \in \mathbb{Z}\}$

$\sin(x) > 0 \quad \forall x \in]2k\pi, (2k+1)\pi[, k \in \mathbb{Z}$

$\sin(x) < 0 \quad \forall x \in](2k+1)\pi, (2k+2)\pi[, k \in \mathbb{Z}$

(6) **Nullstellen von Cosinus** $= \{\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi : k \in \mathbb{Z}\}$

$\cos(x) > 0 \quad \forall x \in]-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, -\frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi[, k \in \mathbb{Z}$

$\cos(x) < 0$

$\forall x \in]-\frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi, -\frac{\pi}{2} + (2k+2)\pi[, k \in \mathbb{Z}$

3.10 Grenzwerte von Funktionen

Definition 3.10.1 $x_0 \in \mathbb{R}$ ist ein **Häufungspunkt** der Menge D , wenn $\delta > 0 : (]x_0 - \delta, x_0 + \delta[) \setminus \{x_0\} \cap D \neq \emptyset$.

Definition 3.10.3 Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ ein **Häufungspunkt** von D . Dann ist $A \in \mathbb{R}$ der Grenzwert von $f(x)$ für $x \rightarrow x_0$, bezeichnet mit $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$,

wenn $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$, so dass $\forall x \in D \cap (]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\setminus \{x_0\}) : |f(x) - A| < \varepsilon$.

Bemerkung 3.10.4 (1) Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und x_0 ein **Häufungspunkt** von D . Dann gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

genau, dann wenn für jede Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ in $D \setminus \{x_0\}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0$ folgendes gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A$.

(2) Sei $x_0 \in D$. Dann ist f **genau dann stetig**, wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

(3) Mittels (1) zeigt man leicht, dass wenn $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ existieren: $\lim_{x \rightarrow x_0} (f +$

$g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ folgen.

(4) Seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f \leq g$. Dann folgt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ falls beide Grenzwerte existieren.

(5) Wenn $g_1 \leq f \leq g_2$ und $\lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_2(x)$, so existiert $l := \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ und $l = \lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x)$.

Satz 3.10.6 Seien $D, E \subseteq \mathbb{R}$, x_0 Häufungspunkt von D , $f : D \rightarrow E$ eine Funktion. Wir nehmen an, dass $y_0 := \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existiert und $y_0 \in E$. Wenn $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ in y_0 stetig ist, folgt: $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(y_0)$.

4 Differenzierbare Funktionen

4.1 Die Ableitung

Definition 4.1.1 f ist in x_0 differenzierbar, wenn der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existiert. Ist dies der Fall, wird der Grenzwert mit $f'(x_0)$ bezeichnet.

Bemerkung 4.1.2 Es ist oft von Vorteil in der Definition von $f'(x_0)$, $x = x_0 + h$ zu setzen, so dass: $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$.

Satz 4.1.3 (Weierstrass 1861) Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$ Häufungspunkt von D . Folgende Aussagen sind äquivalent:

(1) f ist in x_0 differenzierbar

(2) Es gibt $c \in \mathbb{R}$ und $r : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit:

2.1 $f(x) = f(x_0) + c(x - x_0) + r(x)(x - x_0)$

2.2 $r(x_0) = 0$ und r ist stetig in x_0

Wenn dies zutrifft, ist $c = f'(x_0)$ eindeutig bestimmt.

Satz 4.1.4 Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist in x_0 genau dann differenzierbar, wenn es eine Funktion $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}$ gibt, die in x_0 stetig ist und $f(x) = f(x_0) + \phi(x)(x - x_0) \quad \forall x \in D$. In diesem Fall gilt: $\phi(x) = f'(x)$.

Korollar 4.1.5 Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und x_0 ein Häufungspunkt von D . Wenn f in x_0 differenzierbar ist, ist f in x_0 stetig.

Definition 4.1.7 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist in D differenzierbar, wenn für jeden Häufungspunkt $x_0 \in D$, f in x_0 differenzierbar ist.

Satz 4.1.9 Sei $D \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in D$ ein Häufungspunkt von D und $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ in x_0 differenzierbar. Dann gelten:

(1) $f + g$ ist in x_0 differenzierbar und $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$

(2) $f \cdot g$ ist in x_0 differenzierbar und $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$

(3) Wenn $g(x_0) \neq 0$ ist, ist $\frac{f}{g}$ in x_0 differenzierbar und $(\frac{f}{g})'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$

Satz 4.1.11 Seien $D, E \subseteq \mathbb{R}$, sei $x_0 \in D$ ein Häufungspunkt, sei $f : D \rightarrow E$ eine in x_0 differenzierbare Funktion, so dass $y_0 := f(x_0)$ ein Häufungspunkt von E ist und sei $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ eine in y_0 differenzierbare Funktion. Dann ist $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$ in x_0 differenzierbar und $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0)$

Korollar 4.1.12 Sei $f : D \rightarrow E$ eine bijektive Funktion, sei $x_0 \in D$ ein Häufungspunkt. Wir nehmen an f ist in x_0 differenzierbar und $f'(x_0) \neq 0$. Zudem nehmen wir an f^{-1} ist in $y_0 = f(x_0)$ stetig. Dann ist y_0 ein Häufungspunkt von E , f^{-1} ist in y_0 differenzierbar und $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

4.2 Zentrale Sätze über die Ableitung

Definition 4.2.1 Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$.

(1) [(2)] f besitzt ein lokales Maximum [Minimum] in x_0 , wenn $\exists \delta > 0$ mit: $f(x) \leq [\geq] f(x_0) \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\cap D$

(3) f besitzt ein lokales Extremum in x_0 , wenn es ein lokales Minimum oder Maximum ist.

Satz 4.2.2 Sei $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in]a, b[$. Wir nehmen an, f ist in x_0 differenzierbar.

(1) Wenn $f'(x_0) > 0$ ist, $\exists \delta > 0$ mit: $f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in]x_0, x_0 + \delta[$ und $f(x) < f(x_0) \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0[$

(2) Wenn $f'(x_0) < 0$ ist, $\exists \delta > 0$ mit: $f(x) < f(x_0) \quad \forall x \in]x_0, x_0 + \delta[$ und $f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in]x_0 - \delta, x_0[$

(3) Wenn f in x_0 ein lokales Extremum besitzt, folgt $f'(x_0) = 0$.

Satz 4.2.3 (Rolle 1690) Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in $]a, b[$ differenzierbar. Wenn $f(a) = f(b)$, so gibt es $\xi \in]a, b[$ mit: $f'(\xi) = 0$.

Satz 4.2.4 (Lagrange 1797) Sei $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in $]a, b[$ differenzierbar. Es gibt $\xi \in]a, b[$ mit: $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

Korollar 4.2.5 Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in $]a, b[$ differenzierbar.

(1) Wenn $f'(\xi) = 0 \quad \forall \xi \in]a, b[$ ist, ist f konstant.

(2) Wenn $f'(\xi) = g'(\xi) \quad \forall \xi \in]a, b[$ ist, gibt es $c \in \mathbb{R}$ mit: $f(x) = g(x) + c \quad \forall x \in [a, b]$.

(3) [(4)] Wenn $f'(\xi) \geq [\geq] 0 \quad \forall \xi \in]a, b[$ ist, ist f auf $[a, b]$ [strikt] monoton wachsend.

(5) [(6)] Wenn $f'(\xi) \leq [\leq] 0 \quad \forall \xi \in]a, b[$ ist, ist f auf $[a, b]$ [strikt] monoton fallend.

(7) Wenn es $M \geq 0$ gibt, mit: $|f'(\xi)| \leq M \quad \forall \xi \in]a, b[$, folgt $\forall x_1, x_2 \in [a, b] : |f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|$.

Beispiel 4.2.6 (1) arcsin Da $\sin' = \cos$ und $\cos(x) > 0 \quad \forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ folgt aus **Korollar 4.2.5** (4), dass die Sinusfunktion auf $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ strikt monoton wachsend ist. Also ist $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ bijektiv. Wir definieren $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ als die Umkehrfunktion von \sin . Nach **Korollar 4.1.12** ist sie auf $] -1, 1[$ differenzierbar und für $y = \sin x$, $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ folgt nach 4.1.12: $\arcsin'(y) = \frac{1}{\sin'(x)} = \frac{1}{\cos x}$. Wir verwenden nun: $y^2 = \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ woraus mit $\cos x > 0$ folgt: $\cos x = \sqrt{1 - y^2}$. Wir erhalten also $\forall y \in] -1, 1[: \arcsin'(y) = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$.

(2) arccos Eine analoge Diskussion, wie in (1) zeigt, dass $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ strikt monoton fallend ist und $[0, \pi]$ auf $[-1, 1]$ bijektiv abbildet. Sei: $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ die Umkehrfunktion. Sie ist auf

$] -1, 1[$ differenzierbar und $\arccos'(y) = \frac{-1}{\sqrt{1-y^2}} \quad \forall y \in] -1, 1[$.

(3) **arctan** Für $x \notin \frac{\pi}{2} + \pi \cdot \mathbb{Z}$ hatten wir die Tangensfunktion definiert: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ und deren Ableitung berechnet: $\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x}$. Also ist \tan auf $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ streng monoton wachsend mit $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$,

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$. Also ist $\tan :] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow] -\infty, \infty[$ bijektiv. Sei $\arctan :] -\infty, \infty[\rightarrow] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ die Umkehrfunktion. Dann ist \arctan differenzierbar und für $y = \tan x$: $\arctan'(y) = \cos^2 x = \frac{1}{1+y^2}$.

Satz 4.2.9 (Cauchy) Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und in $]a, b[$ differenzierbar. Es gibt $\xi \in]a, b[$ mit: $g'(\xi)(f(b) - f(a)) = f'(\xi)(g(b) - g(a))$. Wenn $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in]a, b[$ ist, folgt: $g(a) \neq g(b)$ und $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

Satz 4.2.10 (Bernoulli 1691/92, de l'Hôpital 1696) Seien $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar mit $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in]a, b[$. Wenn $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = 0$ und $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} =: \lambda$ existiert, folgt: $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Bemerkung 4.2.11 Der Satz gilt auch wenn: $b = +\infty$ $\lambda = +\infty$ $x \rightarrow a^+$

Definition 4.2.13 (1) f ist **konvex** (auf I), wenn $\forall x, y \in I$, $x \leq y$ und $\lambda \in [0, 1]$ folgendes gilt: $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$

(2) f ist **streng konvex**, wenn $\forall x, y \in I$, $x < y$ und $\lambda \in]0, 1[$ folgendes gilt: $f(\lambda x + (1-\lambda)y) < \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$

Bemerkung 4.2.14 Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ konvex. Ein einfacher Induktionsbeweis zeigt, dass $\forall n \geq 1$, $\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq I$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ in $[0, 1]$ mit $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ folgendes gilt: $f(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$

Lemma 4.2.15 Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine beliebige Funktion. Die Funktion f ist **genau dann konvex**, wenn $\forall x_0 < x < x_1$ in I folgendes gilt: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leq \frac{f(x_1)-f(x)}{x_1-x}$

Satz 4.2.16 Sei $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar. f ist genau dann (streng) konvex, wenn f' (streng) monoton wachsend ist.

Korollar 4.2.17 Sei $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar in $]a, b[$. f ist (streng) konvex, wenn $f'' \geq 0$ (bzw. $f'' > 0$) auf $]a, b[$.

4.3 Höhere Ableitungen

Definition 4.3.1 (1) Für $n \geq 2$ ist f **n -mal differenzierbar** in D , wenn $f^{(n-1)}$ in D differenzierbar ist. Dann ist $f^{(n)} := (f^{(n-1)})'$ und nennt sich die **n -te Ableitung** von f

(2) f ist **n -mal stetig differenzierbar** in D , wenn f **n -mal differenzierbar** in D & $f^{(n)}$ in D stetig ist.

(3) Die Funktion f ist in D **glatt**, wenn sie $\forall n \geq 1$ **n -mal differenzierbar** ist.

Bemerkung 4.3.2 Es folgt aus **Korollar 4.1.5**, dass für $n \geq 1$ eine **n -mal differenzierbare** Funktion $(n-1)$ -mal stetig differenzierbar ist.

Satz 4.3.3 (analog zu Satz 4.1.9) Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ wie in **Definition 4.3.1**, $n \geq 1$ und $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ **n -mal differenzierbar** in D .

(1) $f + g$ ist **n -mal differenzierbar** und $(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$

(2) $f \cdot g$ ist **n -mal differenzierbar** und $(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.

Satz 4.3.5 Sei $D \subseteq \mathbb{R}$ wie in **Definition 4.3.1**, $n \geq 1$ und $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ **n -mal differenzierbar** in D . Wenn $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in D$ ist, ist $\frac{f}{g}$ in D **n -mal differenzierbar**.

Satz 4.3.6 Seien $E, D \subseteq \mathbb{R}$ Teilmengen für die **jeder Punkt Häufungspunkt** ist. Seien $f : D \rightarrow E$, $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ **n -mal differenzierbar**. Dann ist $f \circ g$ **n -mal differenzierbar** und $(g \circ f)^{(n)}(x) = \sum_{k=1}^n A_{n,k}(x) (g^{(k)} \circ f)(x)$ wobei $A_{n,k}$ ein Polynom in den Funktionen $f', f^{(2)}, \dots, f^{(n+1-k)}$ ist.

4.4 Potenzreihen & Taylor Approximation

Satz 4.4.1 Seien $f_n :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktionenfolge wobei f_n **einmal** in $]a, b[$ $\forall n \geq 1$ **stetig differenzierbar** ist. Wir nehmen an, dass sowohl die Folge $(f_n)_{n \geq 1}$ wie auch $(f'_n)_{n \geq 1}$ **gleichmässig** in $]a, b[$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n =: f$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n =: p$ **konvergieren**. Dann ist f **stetig differenzierbar** und $f' = p$.

Satz 4.4.2 Sei $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ eine **Potenzreihe** mit pos. Konvergenzradius $\rho > 0$. Dann ist $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k$ auf $]x_0 - \rho, x_0 + \rho[$ **differenzierbar** und $f'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} k c_k (x - x_0)^{k-1} \quad \forall x \in]x_0 - \rho, x_0 + \rho[$.

Korollar 4.4.3 Unter der Voraussetzung von **Satz 4.4.1** ist f auf $]x_0 - \rho, x_0 + \rho[$ **glatt** und $f^{(j)}(x) = \sum_{k=j}^{\infty} c_k \frac{k!}{(k-j)!} (x - x_0)^{k-j}$. Insbesondere ist $c_j = \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}$.

Satz 4.4.5 Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **stetig** und in $]a, b[$ **$(n+1)$ -mal differenzierbar**. Für jedes $a < x \leq b$ gibt es $\xi \in]a, x[$ mit: $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$.

Korollar 4.4.6 (Taylor Approximation) Sei $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ **stetig** und in $]c, d[$ **$(n+1)$ -mal differenzierbar**. Sei $c < a < d$. $\forall x \in [c, d] \exists \xi$ zwischen x und a , so dass: $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$.

Korollar 4.4.7 Sei $n \geq 0$, $a < x_0 < b$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ in $]a, b[$ **$(n+1)$ -mal stetig differenzierbar**. Annahme: $f'(x_0) = f^{(2)}(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0$.

(1) Wenn n **gerade** ist und x_0 eine **lokale Extremalstelle** ist, folgt $f^{(n+1)}(x_0) = 0$.

(2) Wenn n **ungerade** ist und $f^{(n+1)}(x_0) > 0$ ist, ist x_0 eine **strikt lokale Minimalstelle**.

(3) Wenn n **ungerade** ist und $f^{(n+1)}(x_0) < 0$ ist, x_0 eine **strikt lokale Maximalstelle**.

Korollar 4.4.8 Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **stetig** und in $]a, b[$ **zweimal stetig differenzierbar**. Sei $a < x_0 < b$. Annahme: $f'(x_0) = 0$.

(1) Wenn $f^{(2)}(x_0) > 0$ ist, ist x_0 eine **strikt lokale Minimalstelle**.

(2) Wenn $f^{(2)}(x_0) < 0$ ist, ist x_0 eine **strikt lokale Maximalstelle**.

5 Riemann Integral

5.1 Definition und Integrabilitätskriterien

Definition 5.1.1 Eine **Partition** von I ist eine endliche Teilmenge $P \subsetneq [a, b]$ wobei $\{a, b\} \subseteq P$. Es gilt: $n := \text{card } P - 1 \geq 1$ und es gibt **genau eine Bijektion** $\{0, 1, 2, \dots, n\} \rightarrow P, j \mapsto x_j$ mit der Eigenschaft $i < j \implies x_i < x_j$.

Eine **Partition** P' ist eine **Verfeinerung** von P , wenn $P \subset P'$. Offensichtlich ist die **Vereinigung** $P_1 \cup P_2$ **zweier Partitionen** wieder eine **Partition**. Insbesondere haben **zwei Partitionen** immer eine **gemeinsame Vereinigung**. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine **beschränkte Funktion**, das heisst es gibt $M \geq 0$ mit $|f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b]$. Sei $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ eine **Partition** von I . Insbesondere gilt: $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$ **Länge des Teilintervalls** $[x_{i-1}, x_i]$, $\delta_i := x_i - x_{i-1}, i \geq 1$

Untersumme $s(f, P) := \sum_{i=1}^n f_i \delta_i, f_i = \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)$

Obersumme $S(f, P) := \sum_{i=1}^n F_i \delta_i, F_i = \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)$

Lemma 5.1.2 (1) Sei P' eine **Verfeinerung** von P . Dann gilt: $s(f, P) \leq s(f, P') \leq S(f, P') \leq S(f, P)$.

(2) Für beliebige Partitionen P_1, P_2 gilt: $s(f, P_1) \leq S(f, P_2)$.

Sei $\mathcal{P}(I)$ die **Menge der Partitionen** von I . Wir definieren: $s(f) = \sup_{P \in \mathcal{P}(I)} s(f, P), S(f) = \inf_{P \in \mathcal{P}(I)} S(f, P)$.

$\inf_{P \in \mathcal{P}(I)} S(f, P)$.

Definition 5.1.3 Eine **beschränkte Funktion** $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist **(Riemann) integrierbar**, wenn $s(f) = S(f)$. In diesem Fall bezeichnen wir den **gemeinsamen Wert** von $s(f)$ und $S(f)$ mit $\int_a^b f(x) dx$.

Satz 5.1.4 Eine **beschränkte Funktion** ist genau dann integrierbar, wenn $\forall \varepsilon > 0 \exists P \in \mathcal{P}(I) : S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$.

Satz 5.1.8 (Du Bois-Reymond 1875, Darboux 1875) Eine **beschränkte Funktion** $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist **genau dann integrierbar**, wenn $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$, so dass: $\forall P \in \mathcal{P}_\delta(I), S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$. Hier bezeichnet $\mathcal{P}_\delta(I)$ die **Menge der Partitionen** P , für welche $\max_{1 \leq i \leq n} \delta_i \leq \delta$.

Korollar 5.1.9 Die **beschränkte Funktion** $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist **genau dann integrierbar** mit $A := \int_a^b f(x) dx$, wenn: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$, so dass $\forall P \in \mathcal{P}(I)$ mit $\delta(P) < \delta$ und ξ_1, \dots, ξ_n mit $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i], P = \{x_0, \dots, x_n\}$ $|A - \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})| < \varepsilon$.

5.2 Integrierbare Funktionen

Satz 5.2.1 Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **beschränkt, integrierbar** und $\lambda \in \mathbb{R}$. Dann sind $f + g, \lambda \cdot f, f \cdot g, |f|, \max(f, g), \min(f, g)$ und (falls $|g(x)| \geq \beta > 0 \quad \forall x \in [a, b]$) $\frac{f}{g}$ **integrierbar**.

Bemerkung 5.2.2 Sei $\phi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ eine **beschränkte Funktion**. Dann ist $(*) \sup_{x, y \in [c, d]} |\phi(x) - \phi(y)| =$

$\sup_{x \in [c, d]} \phi(x) - \inf_{x \in [c, d]} \phi(x)$. Einerseits gilt offensichtlich $\forall x, y \in [c, d]: \phi(x) \leq \sup_{[c, d]} \phi, \phi \geq \inf_{[c, d]} \phi$ also ist $\phi(x) -$

$\phi(y) \leq \sup_{[c, d]} \phi - \inf_{[c, d]} \phi$, woraus durch vertauschen von x, y folgt: $|\phi(x) - \phi(y)| \leq \sup_{[c, d]} \phi - \inf_{[c, d]} \phi$. Andererseits

sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es $\xi \in [c, d]$ und $\eta \in [c, d]$ $\phi(\xi) > \varepsilon$ und $\phi(\eta) < \inf_{[c, d]} \phi + \varepsilon$ woraus $\phi(\xi) - \phi(\eta) >$

$\sup_{[c, d]} \phi - \inf_{[c, d]} \phi - 2\varepsilon$ folgt. Dies zeigt die Aussage $(*)$

Korollar 5.2.3 Seien P, Q Polynome und $[a, b]$ ein **Intervall** in dem Q **keine Nullstelle** besitzt. Dann ist $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$ **integrierbar**.

Definition 5.2.4 Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subseteq \mathbb{R}$

ist in D **gleichmässig stetig**, wenn $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \forall x, y \in D: |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Satz 5.2.6 (Heine 1872) Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **stetig** in dem kompakten Intervall $[a, b]$. Dann ist f in $[a, b]$ **gleichmässig stetig**.

Satz 5.2.7 Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **stetig**. So ist f **integrierbar**.

Satz 5.2.8 Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **monoton**. So ist f **integrierbar**.

Bemerkung 5.2.9 Seien $a < b < c$ und $f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ **beschränkt** mit $f|_{[a, b]}$ und $f|_{[b, c]}$ **integrierbar**. Dann ist f integrierbar und $(*) \int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$. In der Tat ergibt die **Summe einer Obersumme (respektive Untersumme)** für $f|_{[a, b]}$ und $f|_{[b, c]}$ eine **Obersumme (respektive Untersumme)** für f .

Wir erweitern jetzt die Definition von $\int_a^b f(x) dx$ auf: $\int_a^a f(x) dx = 0$ und wenn $a < b, \int_b^a f(x) dx := -\int_a^b f(x) dx$. Dann gilt $(*)$ für alle Tripel a, b, c unter den entsprechenden Integrabilitätsvoraussetzungen.

Satz 5.2.10 Sei $I \subsetneq \mathbb{R}$ ein **kompaktes Intervall** mit Endpunkten a, b sowie $f_1, f_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ **beschränkt integrierbar** und $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Dann gilt: $\int_a^b (\lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x)) dx = \lambda_1 \int_a^b f_1(x) dx + \lambda_2 \int_a^b f_2(x) dx$.

5.3 Ungleichungen & Mittelwertsatz

Satz 5.3.1 Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **beschränkt integrierbar**, und $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b]$. Dann folgt: $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

Korollar 5.3.2 Wenn $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **beschränkt integrierbar**, folgt: $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

Satz 5.3.3 (**Cauchy-Schwarz Ungleichung**) Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **beschränkt integrierbar**. Dann gilt: $|\int_a^b f(x)g(x) dx| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx} \sqrt{\int_a^b g^2(x) dx}$.

Satz 5.3.4 (**Mittelwertsatz**, Cauchy 1821) Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ **stetig**. So $\exists \xi \in [a, b]: \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$.

Satz 5.3.6 (Cauchy 1821) Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

wobei f stetig, g beschränkt und integrierbar mit $g \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$. Dann gibt es $\xi \in [a, b]$ mit: $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$.

5.4 Fundamentalsatz Differentialrechnung

Satz 5.4.1 (Fundamentalsatz der Analysis) Seien $a < b$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Die Funktion $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, $a \leq x \leq b$ ist in $[a, b]$ stetig differenzierbar und $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$.

Definition 5.4.2 Sei $a < b$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Eine Funktion $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **Stammfunktion** von f , wenn F (stetig) differenzierbar in $[a, b]$ ist und $F' = f$ in $[a, b]$ gilt.

Satz 5.4.3 (Fundamentalsatz der Differentialrechnung) Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. So gibt es eine **Stammfunktion** F von f , die bis auf eine additive Konstante eindeutig bestimmt ist und: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

Satz 5.4.5 (Partielle Integration) Seien $a < b \in \mathbb{R}$ und $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar. Dann gilt: $\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x) dx$.

Satz 5.4.6 (Substitution) Sei $a < b$, $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar, $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall mit $\phi([a, b]) \subseteq I$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann gilt: $\int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\phi(t))\phi'(t) dt$.

Korollar 5.4.8 Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig.

(1) Seien $a, b, c \in \mathbb{R}$, so dass das abgeschlossene Intervall mit Endpunkten $a + c, b + c \in I$. Dann gilt: $\int_{a+c}^{b+c} f(x) dx = \int_a^b f(t + c) dt$.

(2) Seien $a, b, c \in \mathbb{R}$ mit $c \neq 0$, so dass das abgeschlossene Intervall mit den Endpunkten $ac, bc \in I$. Dann gilt: $\int_a^b f(ct) dt = \frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f(x) dx$.

5.5 Integration konvergenter Reihen

Satz 5.5.1 Sei $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge von beschränkten, integrierbaren Funktionen, die gleichmässig gegen eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

konvergiert. So ist f beschränkt integrierbar und $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$.

Korollar 5.5.2 Sei $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge beschränkter, integrierbarer Funktionen, so dass $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ auf $[a, b]$ gleichmässig konvergiert. Dann gilt: $\sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b (\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)) dx$.

Korollar 5.5.3 Sei $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ eine Potenzreihe mit positivem Konvergenzradius $\rho > 0$. Dann ist für jedes $0 \leq r < \rho$, f auf $[-r, r]$ integrierbar und es gilt $\forall x \in]-\rho, \rho[$: $\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} x^{n+1}$.

5.8 Uneigentliche Integrale

Definition 5.8.1 Sei $f : [a, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt und integrierbar auf $[a, b]$ für alle $b > a$. Wenn $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$ existiert, bezeichnen wir den Grenzwert mit $\int_a^{\infty} f(x) dx$ und sagen, dass f auf $[a, +\infty[$ integrierbar ist.

Lemma 5.8.3 Sei $f : [a, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt und integrierbar auf $[a, b] \quad \forall b > a$. (1) Wenn $|f(x)| \leq g(x) \quad \forall x \geq a$ und $g(x)$ auf $[a, \infty[$ integrierbar ist, ist f auf $[a, \infty[$ integrierbar. (2) Wenn $0 \leq g(x) \leq f(x)$ und $\int_a^{\infty} g(x) dx$ divergiert, divergiert auch $\int_a^{\infty} f(x) dx$.

Satz 5.8.5 (McLaurin 1742) Sei $f : [1, \infty[\rightarrow [0, \infty[$ monoton fallend. Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ konvergiert genau dann, wenn $\int_1^{\infty} f(x) dx$ konvergiert.

Eine Situation, die zu einem uneigentlichen Integral führt, ist wenn $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ auf jedem Intervall $[a + \varepsilon, b]$, $\varepsilon > 0$ beschränkt und integrierbar ist, aber auf $]a, b]$ nicht notwendigerweise beschränkt ist.

Definition 5.8.8 In dieser Situation ist $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrierbar, wenn $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$ existiert. In

diesem Fall wird der Grenzwert mit $\int_a^b f(x) dx$ bezeichnet.

Definition 5.8.11 Für $s > 0$ definieren wir $\Gamma(s) := \int_0^{\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$.

Satz 5.8.12 (Bohr-Mollerup)

(1) Die Gamma Funktion erfüllt die Relationen:

$$(a) \Gamma(1) = 1 \quad (b) \Gamma(s+1) = s\Gamma(s) \quad \forall s > 0$$

(c) γ ist logarithmisch konvex, d.h. $\Gamma(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \Gamma(x)^\lambda \Gamma(y)^{1-\lambda}$ für alle $x, y > 0$ und $0 \leq \lambda \leq 1$.

(2) Die Gamma Funktion ist die einzige Funktion $]0, \infty[\rightarrow]0, \infty[$, die (a), (b) und (c) erfüllt. Darüberhinaus gilt: $\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! n^x}{x(x+1)\dots(x+n)} \quad \forall x > 0$

Lemma 5.8.13 Sei $p > 1$ und $q > 1$ mit $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Dann gilt $\forall a, b \geq 0$: $a \cdot b \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$.

Satz 5.8.14 (Hölder Ungleichung) Seien $p, q > 1$ mit $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Für alle stetigen Funktionen $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ gilt: $\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \|f\|_p \|g\|_q$

5.9 Das unbestimmte Integral

Satz 5.9.3 Seien P, Q Polynome mit $\text{grad}(P) < \text{grad}(Q)$ und Q mit Produktzerlegung $(*)$ Dann gibt es $A_{ij}, B_{ij}, C_{ij} \in \mathbb{R}$ mit: $\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^{m_i} \frac{(A_{ij} + B_{ij}x)}{((x-a_i)^2 + \beta_i^2)^j} + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \frac{C_{ij}}{x-\gamma_i}$.

6 Anhang A

Satz A.0.1 (Binomialsatz) $\forall x, y \in \mathbb{C}, n \geq 1$ gilt: $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$.

7 Wichtige Beispiele

Ungerade und gerade Funktionen Sei $f(x)$ eine gerade Funktion. Dann: $f(x) = f(-x)$. Sei $g(x)$ eine ungerade Funktion. Dann: $-g(x) = g(-x)$. Das Produkt von 2 geraden Funktionen ist gerade. Das Produkt von 2 ungeraden Funktionen ist gerade. Das Produkt einer ungeraden und einer geraden Funktion, ist ungerade. Für ungerade Funktionen gilt: $\int_{-a}^a g(x) dx = 0$. (Dies kann man sich graphisch vorstellen).

Konvergenztest für Reihen Gegeben: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

(1) Spezieller Typ?

1.1 Geometrische Reihe: $\sum q^n$? **Konvergent**, wenn: $|q| < 1$.

1.2 Alternierende Reihe: $\sum (-1)^n a_n$? **Konvergent**, wenn: $\lim a_n = 0$.

1.3 Riemann Zeta: $\zeta(s) = \sum \frac{1}{n^s}$ **Konvergent**, wenn: $s > 1$.

1.4 Teleskopreihe $\sum (b_n - b_{n-1})$? **Konvergent**, wenn: $\lim b_n$ existiert.

(2) Kein spezieller Typ:

2.1 $\lim a_n = 0$? Nein: **divergent**.

2.2 Quotientenkriterium anwendbar?

2.3 Wurzelkriterium anwendbar?

2.4 Gibt es eine **konvergente Majorante**?

2.5 Gibt es eine **divergente Minorante**?

2.6 Nichts von all dem?

\Rightarrow **kreativ sein**.

Allgemeine Potenzen Wir können die Exponentialfunktion und den natürlichen Logarithmus verwenden, um allgemeine Potenzen zu definieren. Für $x > 0$ und $a \in \mathbb{R}$ beliebig definieren wir: $x^a := \exp(a \ln x)$. Insbesondere: $x^0 = 1 \quad \forall x > 0$.

Trigonometrische Funktionen Sinusfunktion für $z \in \mathbb{C}$: $\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$.

Kosinusfunktion für $z \in \mathbb{C}$: $\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}$. Tangensfunktion für $z \notin \frac{\pi}{2} + \pi \cdot \mathbb{Z}$: $\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$. Cotangensfunktion für $z \notin \pi \cdot \mathbb{Z}$: $\cot z = \frac{\cos z}{\sin z}$.

Hyperbelfunktionen $\forall x \in \mathbb{R}$: $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$. Es gilt offensichtlich: $\cosh x \geq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, $\sinh x \geq 1 \quad \forall x \in]0, +\infty[$, $\sinh(0) = 0$. Daraus folgt: \cosh ist auf $[0, \infty[$ strikt monoton wachsend, $\cosh(0) = 1$ und $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cosh x = +\infty$. Also ist $\cosh : [0, \infty[\rightarrow [1, \infty[$ bijektiv. Deren Umkehrfunktion wird mit $\operatorname{arcosh} : [1, \infty[\rightarrow [0, \infty[$ bezeichnet. Unter Verwendung von $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ folgt: $\operatorname{arcosh}' y =$

$\frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}} \quad \forall y \in]1, +\infty[$. Analog zeigt man, dass $\sinh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ streng monoton wachsend und bijektiv ist. Dessen Umkehrfunktion wird mit $\operatorname{arsinh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bezeichnet und es gilt: $\operatorname{arsinh}' y = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \quad \forall y \in \mathbb{R}$.

Für $\tanh x$ folgt: $\tanh' x = \frac{1}{\cosh^2 x} > 0$ Also ist \tanh auf \mathbb{R} streng monoton wachsend und man zeigt, dass $\lim_{x \rightarrow +\infty} \tanh x = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh x = -1$. Die Funktion $\tanh : \mathbb{R} \rightarrow]-1, 1[$ ist bijektiv. Ihre Umkehrfunktion wird mit $\operatorname{artanh} :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ bezeichnet. Es gilt dann: $\operatorname{artanh}' y = \frac{1}{1-y^2} \quad \forall y \in]-1, 1[$.

7.1 Ableitungen

$$(ax^z)' = azx^{z-1}$$

$$(x^x)' = (e^{x \ln x})' = (\ln(x) + 1)e^x$$

$$(x \ln x)' = \ln(x) + 1$$

$$e^{f(x)}' = e^{f(x)} f'(x)$$

$$\sin' x = \cos x$$

$$\cos' x = -\sin x$$

$$\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\cot' x = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\ln' x = \frac{1}{x}$$

$$\arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\arccos' x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\arctan' x = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\sinh' x = \cosh x$$

$$\cosh' x = \sinh x$$

$$\tanh' x = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

$$\operatorname{arsinh}' y = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \quad \forall y \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{arcosh}' y = \frac{1}{\sqrt{y^2-1}} \quad \forall y \in]1, +\infty[$$

$$\operatorname{artanh}' y = \frac{1}{1-y^2} \quad \forall y \in]-1, 1[$$

$$\int x^s dx = \frac{x^{s+1}}{s+1} + C \quad s \neq -1$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sinh x dx = \cosh x + C$$

$$\int \cosh x dx = \sinh x + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$$

$$\int \frac{1}{x^3} dx = -\frac{1}{2x^2} + C$$

$$\int \frac{1}{x^4} dx = -\frac{1}{3x^3} + C$$

$$\int \frac{1}{x^5} dx = -\frac{1}{4x^4} + C$$

$$\int \frac{1}{x^6} dx = -\frac{1}{5x^5} + C$$

$$\int \frac{1}{x^7} dx = -\frac{1}{6x^6} + C$$

$$\int \frac{1}{x^8} dx = -\frac{1}{7x^7} + C$$

$$\int \frac{1}{x^9} dx = -\frac{1}{8x^8} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{10}} dx = -\frac{1}{9x^9} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{11}} dx = -\frac{1}{10x^{10}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{12}} dx = -\frac{1}{11x^{11}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{13}} dx = -\frac{1}{12x^{12}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{14}} dx = -\frac{1}{13x^{13}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{15}} dx = -\frac{1}{14x^{14}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{16}} dx = -\frac{1}{15x^{15}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{17}} dx = -\frac{1}{16x^{16}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{18}} dx = -\frac{1}{17x^{17}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{19}} dx = -\frac{1}{18x^{18}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{20}} dx = -\frac{1}{19x^{19}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{21}} dx = -\frac{1}{20x^{20}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{22}} dx = -\frac{1}{21x^{21}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{23}} dx = -\frac{1}{22x^{22}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{24}} dx = -\frac{1}{23x^{23}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{25}} dx = -\frac{1}{24x^{24}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{26}} dx = -\frac{1}{25x^{25}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{27}} dx = -\frac{1}{26x^{26}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{28}} dx = -\frac{1}{27x^{27}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{29}} dx = -\frac{1}{28x^{28}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{30}} dx = -\frac{1}{29x^{29}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{31}} dx = -\frac{1}{30x^{30}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{32}} dx = -\frac{1}{31x^{31}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{33}} dx = -\frac{1}{32x^{32}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{34}} dx = -\frac{1}{33x^{33}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{35}} dx = -\frac{1}{34x^{34}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{36}} dx = -\frac{1}{35x^{35}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{37}} dx = -\frac{1}{36x^{36}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{38}} dx = -\frac{1}{37x^{37}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{39}} dx = -\frac{1}{38x^{38}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{40}} dx = -\frac{1}{39x^{39}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{41}} dx = -\frac{1}{40x^{40}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{42}} dx = -\frac{1}{41x^{41}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{43}} dx = -\frac{1}{42x^{42}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{44}} dx = -\frac{1}{43x^{43}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{45}} dx = -\frac{1}{44x^{44}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{46}} dx = -\frac{1}{45x^{45}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{47}} dx = -\frac{1}{46x^{46}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{48}} dx = -\frac{1}{47x^{47}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{49}} dx = -\frac{1}{48x^{48}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{50}} dx = -\frac{1}{49x^{49}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{51}} dx = -\frac{1}{50x^{50}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{52}} dx = -\frac{1}{51x^{51}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{53}} dx = -\frac{1}{52x^{52}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{54}} dx = -\frac{1}{53x^{53}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{55}} dx = -\frac{1}{54x^{54}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{56}} dx = -\frac{1}{55x^{55}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{57}} dx = -\frac{1}{56x^{56}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{58}} dx = -\frac{1}{57x^{57}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{59}} dx = -\frac{1}{58x^{58}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{60}} dx = -\frac{1}{59x^{59}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{61}} dx = -\frac{1}{60x^{60}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{62}} dx = -\frac{1}{61x^{61}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{63}} dx = -\frac{1}{62x^{62}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{64}} dx = -\frac{1}{63x^{63}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{65}} dx = -\frac{1}{64x^{64}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{66}} dx = -\frac{1}{65x^{65}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{67}} dx = -\frac{1}{66x^{66}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{68}} dx = -\frac{1}{67x^{67}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{69}} dx = -\frac{1}{68x^{68}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{70}} dx = -\frac{1}{69x^{69}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{71}} dx = -\frac{1}{70x^{70}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{72}} dx = -\frac{1}{71x^{71}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{73}} dx = -\frac{1}{72x^{72}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{74}} dx = -\frac{1}{73x^{73}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{75}} dx = -\frac{1}{74x^{74}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{76}} dx = -\frac{1}{75x^{75}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{77}} dx = -\frac{1}{76x^{76}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{78}} dx = -\frac{1}{77x^{77}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{79}} dx = -\frac{1}{78x^{78}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{80}} dx = -\frac{1}{79x^{79}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{81}} dx = -\frac{1}{80x^{80}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{82}} dx = -\frac{1}{81x^{81}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{83}} dx = -\frac{1}{82x^{82}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{84}} dx = -\frac{1}{83x^{83}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{85}} dx = -\frac{1}{84x^{84}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{86}} dx = -\frac{1}{85x^{85}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{87}} dx = -\frac{1}{86x^{86}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{88}} dx = -\frac{1}{87x^{87}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{89}} dx = -\frac{1}{88x^{88}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{90}} dx = -\frac{1}{89x^{89}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{91}} dx = -\frac{1}{90x^{90}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{92}} dx = -\frac{1}{89x^{91}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{93}} dx = -\frac{1}{90x^{92}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{94}} dx = -\frac{1}{89x^{93}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{95}} dx = -\frac{1}{90x^{94}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{96}} dx = -\frac{1}{89x^{95}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{97}} dx = -\frac{1}{90x^{96}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{98}} dx = -\frac{1}{89x^{97}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{99}} dx = -\frac{1}{90x^{98}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{100}} dx = -\frac{1}{89x^{99}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{101}} dx = -\frac{1}{90x^{100}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{102}} dx = -\frac{1}{89x^{101}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{103}} dx = -\frac{1}{90x^{102}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{104}} dx = -\frac{1}{89x^{103}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{105}} dx = -\frac{1}{90x^{104}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{106}} dx = -\frac{1}{89x^{105}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{107}} dx = -\frac{1}{90x^{106}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{108}} dx = -\frac{1}{89x^{107}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{109}} dx = -\frac{1}{90x^{108}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{110}} dx = -\frac{1}{89x^{109}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{111}} dx = -\frac{1}{90x^{110}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{112}} dx = -\frac{1}{89x^{111}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{113}} dx = -\frac{1}{90x^{112}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{114}} dx = -\frac{1}{89x^{113}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{115}} dx = -\frac{1}{90x^{114}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{116}} dx = -\frac{1}{89x^{115}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{117}} dx = -\frac{1}{90x^{116}} + C$$

$$\int \frac{1}{x^{118}} dx = -\frac{1}{89x^{117}} + C$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = \infty$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, |q| < 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} n^\alpha \cdot q^n = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[x]{x} = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^x = \dots$$