

# 1 Skript

## Kapitel 1

**Ordnungsvollständigkeit:** Seien  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  s. d. (i)  $A \neq \emptyset$  (ii)  $\forall a \in A \forall b \in B \ a \leq b$

Dann:  $\exists c \in \mathbb{R}$  s.d.  $\forall a \in A \ a \leq c \ \forall b \in B \ c \leq b$

**Korollar 1.1.7 (Archimedisches Prinzip)** Sei  $x > 0, y \in \mathbb{R}$  Dann:  $\exists n \in \mathbb{N} \ y \leq n \cdot x$

**Satz 1.1.8**  $\forall t \geq 0, t \in \mathbb{R}$  hat  $x^2 = t$  eine Lösung in  $\mathbb{R}$

**Satz 1.1.10**  $\forall x, y \in \mathbb{R}$  (i)  $|x| \geq 0$  (ii)  $|xy| = |x||y|$  (iii)  $|x + y| \leq |x| + |y|$  (iv)  $|x + y| \geq ||x| - |y||$

**Satz 1.1.11 (Young'sche Ungleichung)**  $\forall \varepsilon > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}$  gilt:  $2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$

**Definition 1.1.12** Sei  $A \subset \mathbb{R}$

(i) / (ii)  $c \in \mathbb{R}$  ist eine **obere/untere Schranke** von  $A$  wenn  $\forall a \in A \ a \leq / \geq c$ .  $A$  ist **nach oben/unten beschränkt**, wenn es eine obere/untere Schranke gibt.

(iii) / (iv)  $m \in \mathbb{R}$  ist ein **Maximum/Minimum** von  $A$  wenn  $m \in A$  und  $m$  **obere/untere Schranke** von  $A$  ist.

**Satz 1.1.15** Sei  $A \subseteq \mathbb{R}, A \neq \emptyset$  Sei  $A$  nach oben/unten beschränkt. Dann gibt es eine kleinste obere/ grösste untere Schranke von  $A$ :  $c := \sup A / c := \inf A$  genannt **Supremum/Infimum** von  $A$

**Korollar 1.1.16** Seien  $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$  Wenn  $B$  nach oben/unten beschränkt ist, folgt  $\sup A \leq \sup B / \inf B \leq \inf A$

**Konvention:** Wenn  $A$  nicht beschränkt ist, definieren wir  $\sup A = +\infty$  bzw.  $\inf A = -\infty$

**Satz 1.3.4 (Fundamentalsatz der Algebra)** Sei  $n \geq 1, n \in \mathbb{N}, a_j \in \mathbb{C}$  und  $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_0$   
Dann  $\exists z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ , so dass  $P(z) = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n)$

## Kapitel 2

**Definition 2.1.1** Eine **Folge (reeller Zahlen)** ist eine Abbildung  $a : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ . Wir schreiben  $a_n$  statt  $a(n)$  und bezeichnen eine Folge mit  $(a_n)_{n \geq 1}$

**Lemma 2.1.3** Sei  $(a_n)_{n \geq 1}$  eine Folge. Dann gibt es **höchstens eine reelle Zahl  $l \in \mathbb{R}$  mit der Eigenschaft:**  
 $\forall \varepsilon > 0$  ist die Menge  $\{n \in \mathbb{N} : a_n \notin ]l - \varepsilon, l + \varepsilon[ \}$  **endlich**.

**Definition 2.1.4** Eine Folge  $(a_n)_{n \geq 1}$  ist **konvergent**, wenn es  $l \in \mathbb{R}$  gibt, so dass  $\forall \varepsilon > 0$  die Menge  $\{n \in \mathbb{N} : a_n \notin ]l - \varepsilon, l + \varepsilon[ \}$  **endlich** ist.

**Lemma 2.1.6** Sei  $(a_n)_{n \geq 1}$  eine Folge. Folgende Aussagen sind äquivalent

(1)  $(a_n)_{n \geq 1}$  **konvergiert gegen  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$**  (2)  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$ , so dass  $|a_n - l| < \varepsilon \ \forall n \geq N$

**Satz 2.1.8** Seien  $(a_n)_{n \geq 1}, (b_n)_{n \geq 1}$  **konvergent** mit  $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

(1)  $(a_n + b_n)_{n \geq 1}$  ist **konvergent**:  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$  (2)  $(a_n \cdot b_n)_{n \geq 1}$  ist **konvergent**:  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$

(3) Sei  $\forall n \geq 1 \ b_n \neq 0$  und  $b \neq 0$ . Dann ist  $(\frac{a_n}{b_n})_{n \geq 1}$  **konvergent** und  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{a_n}{b_n})_{n \geq 1} = \frac{a}{b}$

(4) Wenn  $\exists K \geq 1$  mit  $\forall n \geq K : a_n \leq b_n$ , folgt  $a \leq b$

**Definition 2.2.1** (1) [(2)]  $(a_n)_{n \geq 1}$  ist **monoton wachsend [fallend]** wenn:  $a_n \leq [\geq] a_{n+1} \ \forall n \geq 1$

**Satz 2.2.2 (Weierstrass)** Sei  $(a_n)_{n \geq 1}$  **monoton wachsend [fallend]** und **nach oben [unten] beschränkt**. Dann **konvergiert**  $(a_n)_{n \geq 1}$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n : n \geq 1\}$  [ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_n : n \geq 1\}$ ]

**Bemerkung 2.2.24** In **Beispiel 2.2.3** wird zweimal die folgende einfache Tatsache verwendet: Sei  $(a_n)_{n \geq 1}$  eine **konvergente** Folge mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  und  $k \in \mathbb{N}$ . Dann ist die durch  $b_n := a_{n+k} \ n \geq 1$  definierte Folge **konvergent** und  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$ .

**Lemma 2.2.7 (Bernoulli Ungleichung)**  $(1 + x)^n \geq 1 + n \cdot x \ \forall n \in \mathbb{N}, x > -1$

**Limes inferior/ superior:** Sei  $(a_n)_{n \geq 1}$  eine **beschränkte** Folge. Sei  $\forall n \geq 1: b_n = \inf \{a_k : k \geq n\}$ ,  
 $c_n = \sup \{a_k : k \geq n\}$  Dann folgt  $\forall n \geq 1 \ b_n \leq b_{n+1}$  (**monoton wachsend**) und  $c_n \geq c_{n+1}$  (**monoton fallend**)  
und **beide Folgen beschränkt**. Wir definieren:  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$

**Lemma 2.4.1**  $(a_n)_{n \geq 1}$  **konvergiert genau dann, wenn  $(a_n)_{n \geq 1}$  beschränkt und  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$**

**Satz 2.4.2 (Cauchy Kriterium)**  $(a_n)_{n \geq 1}$  ist **genau dann konvergent**, wenn  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$ ,  
so dass  $|a_n - a_m| < \varepsilon \ \forall n, m \geq N$

**Definition 2.5.1** Ein **abgeschlossenes Intervall**  $I \subseteq \mathbb{R}$  ist von der Form

(1)  $[a, b] \ a \leq b \ a, b \in \mathbb{R}$  (2)  $[a, +\infty[ \ a \in \mathbb{R}$  (3)  $] -\infty, a] \ a \in \mathbb{R}$  (4)  $] -\infty, +\infty[ = \mathbb{R}$

**Bemerkung 2.5.2** Ein Intervall  $I \subseteq \mathbb{R}$  ist **genau dann abgeschlossen**, wenn für jede konvergente Folge  $(a_n)_{n \geq 1}$  mit  $a_n \in I \ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in I$ .

**Bemerkung 2.5.3** Seien  $I = [a, b]$ ,  $J = [c, d]$  mit  $a \leq b$ ,  $c \leq d$ ,  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ . Dann ist  $I \subseteq J$  genau dann, wenn  $c \leq a$ ,  $b \leq d$

**Satz 2.5.5.5 (Cauchy-Cantor)** Sei  $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots \supseteq I_n \supseteq I_{n+1} \supseteq \dots$  eine Folge abgeschlossener Intervalle mit  $\mathcal{L}(I_1) < +\infty$ . Dann gilt  $\bigcap_{n \geq 1} I_n \neq \emptyset$ . Falls zudem  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{L}(I_n) = 0$  gilt, enthält  $\bigcap_{n \geq 1} I_n$  genau einen Punkt.

**Definition 2.5.7** Eine **Teilfolge** einer Folge  $(a_n)_{n \geq 1}$  ist eine Folge  $(b_n)_{n \geq 1}$ , wobei  $b_n = a_{l(n)}$  und  $l: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$  eine **Abbildung** mit der Eigenschaft  $l(n) < l(n+1) \quad \forall n \geq 1$

**Satz 2.5.9 (Bolzano-Weierstrass)** Jede beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

**Definition 2.6.1** Eine **Folge in  $\mathbb{R}^d$**  ist eine Abbildung  $a: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}^d$ . Wir schreiben  $a_n$  statt  $a(n)$  und bezeichnen die Folge mit  $(a_n)_{n \geq 1}$

**Definition 2.6.2** Eine Folge  $(a_n)_{n \geq 1}$  in  $\mathbb{R}^d$  ist **konvergent**, wenn  $\exists a \in \mathbb{R}^d$ , so dass  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$  mit  $\|a_n - a\| < \varepsilon \quad \forall n \geq N$

**Satz 2.6.3** Sei  $b = (b_1, \dots, b_d)$ . Folgende Aussagen sind äquivalent: (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$  (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{nj} = b_j \quad \forall 1 \leq j \leq d$

**Bemerkung 2.6.4** Sei  $x = (x_1, \dots, x_d)$ . Dann ist  $\forall 1 \leq j \leq d: x_j^2 \leq \sum_{i=1}^d x_i^2 = \|x\|^2 \leq d \cdot \max_{1 \leq i \leq d} x_i^2$  woraus  $|x_j| \leq \|x\| \leq \sqrt{d} \cdot \max_{1 \leq i \leq d} |x_i|$  folgt.

**Bemerkung 2.6.5** Eine konvergente Folge  $(a_n)_{n \geq 1}$  in  $\mathbb{R}^d$  ist **beschränkt**. Das heisst:  $\exists R \geq 0$  mit  $\|a_n\| \leq R \quad \forall n \geq 1$

**Satz 2.6.6** (1) Eine Folge  $(a_n)_{n \geq 1}$  **konvergiert genau dann**, wenn sie eine **Cauchy Folge** ist:  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$  mit  $\|a_n - a_m\| < \varepsilon \quad \forall n, m \geq N$ . (2) Jede beschränkte Folge hat eine konvergente Teilfolge.

**Definition 2.7.1** Die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  ist **konvergent**, wenn die Folge  $(S_n)_{n \geq 1}$  der **Partialsommen** konvergiert. In diesem Fall definieren wir:  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

**Satz 2.7.4** Seien  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ,  $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$  konvergent sowie  $\alpha \in \mathbb{C}$ . Dann ist: (1)  $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)$  konvergent und  $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = (\sum_{k=1}^{\infty} a_k) + (\sum_{j=1}^{\infty} b_j)$  (2)  $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha \cdot a_k)$  konvergent und  $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha \cdot a_k) = \alpha \cdot \sum_{k=1}^{\infty} a_k$

**Satz 2.7.5 (Cauchy Kriterium)** Die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  ist genau dann konvergent, wenn:  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$  mit  $|\sum_{k=n}^m a_k| < \varepsilon \quad \forall m \geq n \geq N$ .

**Satz 2.7.6** Sei  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  eine Reihe mit  $a_k \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}^*$ .  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konvergiert genau dann, wenn die Folge  $(S_n)_{n \geq 1}$ ,  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$  der **Partialsommen nach oben beschränkt** ist.

**Korollar 2.7.7 (Vergleichssatz)** Seien  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ,  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  Reihen mit:  $0 \leq a_k \leq b_k \quad \forall k \geq 1$ . Dann gelten:  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  konvergent  $\implies \sum_{k=1}^{\infty} a_k$  konvergent  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  divergent  $\implies \sum_{k=1}^{\infty} b_k$  divergent Die Implikationen treffen auch zu, wenn  $\exists K \geq 1$  mit  $0 \leq a_k \leq b_k \quad \forall k \geq K$

**Definition 2.7.9** Die Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  ist **absolut konvergent**, wenn  $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$  konvergiert.

**Satz 2.7.10** Eine absolut konvergente Reihe  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  ist auch konvergent und es gilt:  $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$

**Satz 2.7.12 (Leibniz 1682)** Sei  $(a_n)_{n \geq 1}$  monoton fallend mit  $a_n \geq 0 \quad \forall n \geq 1$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

Dann konvergiert  $S := \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$  und es gilt:  $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$

**Definition 2.7.14** Eine Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n$  ist eine **Umordnung der Reihe**  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  wenn es eine **bijektive Abbildung**  $\phi: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$  gibt, so dass  $a'_n = a_{\phi(n)}$

**Satz 2.7.16** (Dichlet 1837) Wenn  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  absolut konvergiert, dann konvergiert jede Umordnung der Reihe mit demselben Grenzwert.

**Satz 2.7.17 (Quotientenkriterium, Cauchy 1821)** Sei  $(a_n)_{n \geq 1}$  mit  $a_n \neq 0 \quad \forall n \geq 1$  und  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  eine Reihe.

Wenn:  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$  konvergiert die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  absolut. Wenn:  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} > 1$  divergiert die Reihe

**Bemerkung 2.7.19** Das **Quotientenkriterium versagt**, wenn z. B. unendlich viele Glieder  $a_n$  der Reihe **verschwinden** (= 0 sind)

**Satz 2.7.20 (Wurzelkriterium, Cauchy 1821)** (1)  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konvergiert absolut.

(2)  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1 \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  und  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  divergieren.

**Konvergenzradius**  $\rho$ : Sei  $(c_k)_{k \geq 0}$  eine Folge (in  $\mathbb{R}$  oder  $\mathbb{C}$ ). Wenn  $\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}$  existiert, definieren wir:

$\rho = +\infty$  wenn  $\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = 0$  und  $\rho = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}}$  wenn  $\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} > 0$

**Korollar 2.7.21** Die **Potenzreihe**  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$  konvergiert absolut  $\forall |z| < \rho$  und divergiert  $\forall |z| > \rho$ .

**Definition 2.7.22**  $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$  ist eine **lineare Anordnung der Doppelreihe**  $\sum_{i,j \geq 0} a_{ij}$ , wenn es eine **Bijektion**  $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  gibt, mit  $b_k = a_{\sigma(k)}$ .

**Satz 2.7.23** (Cauchy 1821) Wir nehmen an, dass es  $B \geq 0$  gibt, so dass  $\sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^m |a_{ij}| \leq B \quad \forall m \geq 0$ . Dann **kongvergieren die folgenden Reihen absolut**:  $S_i := \sum_{j=0}^{\infty} a_{ij} \quad \forall i \geq 0$  und  $U_j := \sum_{i=0}^{\infty} a_{ij} \quad \forall j \geq 0$  sowie  $\sum_{i=0}^{\infty} S_i$  und  $\sum_{j=0}^{\infty} U_j$  und es gilt:  $\sum_{i=0}^{\infty} S_i = \sum_{j=0}^{\infty} U_j$  Und jede lineare Anordnung der Doppelreihe konvergiert absolut mit gleichem Grenzwert.

**Definition 2.7.74** Das **Cauchy Produkt** der Reihen  $\sum_{i=0}^{\infty} a_i, \sum_{j=0}^{\infty} b_j$  ist die Reihe:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{j=0}^n a_{n-j} b_j) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) + \dots$$

**Satz 2.7.26** Falls die Reihen  $\sum_{i=0}^{\infty} a_i, \sum_{j=0}^{\infty} b_j$  **absolut konvergieren**, **konvergiert ihr Cauchy Produkt** und es gilt:  $\sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{j=0}^n a_{n-j} b_j) = (\sum_{i=0}^{\infty} a_i) (\sum_{j=0}^{\infty} b_j)$ .

**Satz 2.7.28** Sei  $f_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  eine Folge. Wir nehmen an, dass: (1)  $f(j) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(j) \quad \forall j \in \mathbb{N}$  existiert

(2) es eine Funktion  $g : \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty[$  gibt, so dass 2.1  $|f_n(j)| \leq g(j) \quad \forall j \geq 0, \forall n \geq 0$

2.2  $\sum_{j=0}^{\infty} g(j)$  **konvergiert**. Dann folgt:  $\sum_{j=0}^{\infty} f(j) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^n f_n(j)$ .

**Korollar 2.7.29** (Exponentialfunktion)  $\forall z \in \mathbb{C}$  **konvergiert** die Folge  $((1 + \frac{z}{n})^n)_{n \geq 1}$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{z}{n})^n = \exp(z)$

## Kapitel 3

**Definition 3.1.1** [ (1) / (2) ] (3)  $f$  ist nach **[oben/unten] beschränkt** wenn  $f(D) \subseteq \mathbb{R}$  nach **[oben/unten] beschränkt**

**Definition 3.1.2** Eine Funktion  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ , wobei  $D \subseteq \mathbb{R}$ , ist:

(1) [ (2) ] **[streng] monoton wachsend**, wenn  $\forall x, y \in D \quad x \leq [ < ] y \Rightarrow f(x) \leq [ < ] f(y)$

(3) [ (4) ] **[streng] monoton fallend**, wenn  $\forall x, y \in D \quad x \leq [ < ] y \Rightarrow f(x) \geq [ > ] f(y)$

(5) [ (6) ] **[streng] monoton**, wenn  $f$  **[streng] monoton wachsend** oder **fallend** ist.

**Definition 3.2.1** Sei  $D \subseteq \mathbb{R}, x_0 \in D$ . Die Funktion  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  ist in  $x_0$  **stetig**, wenn  $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$ , so dass  $\forall x \in D$  die Implikation:  $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$  gilt

**Definition 3.2.2** Die Funktion  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  ist **stetig**, wenn sie in **jedem Punkt von D** stetig ist.

**Satz 3.2.4** Sei  $x_0 \in D \subseteq \mathbb{R}$  und  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ . Die Funktion  $f$  ist genau dann in  $x_0$  **stetig**, wenn für **jede Folge**  $(a_n)_{n \geq 1}$  in  $D$  die folgende Implikation gilt:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(x_0)$ .

**Korollar 3.2.5** Seien  $x_0 \in D \subseteq \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R}$  und  $f : D \rightarrow \mathbb{R}, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  beide **stetig** in  $x_0$ : (1)  $f + g, \lambda \cdot f, f \cdot g$  sind **stetig** in  $x_0$ . (2) Wenn  $g(x_0) \neq 0$  ist, ist  $\frac{f}{g} : D \cap \{x \in D : g(x) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$  **stetig** in  $x_0$

**Definition 3.2.6** Eine **polynomielle Funktion**  $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ist eine Funktion der Form:  $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$  wobei:  $a_n, \dots, a_0 \in \mathbb{R}$ . Wenn  $a_n \neq 0$  ist, ist  $n$  der **Grad** von  $P$ .

**Korollar 3.2.7** **Polynomielle Funktionen** sind auf ganz  $\mathbb{R}$  **stetig**

**Korollar 3.2.8** Seien  $P, Q$  **polynomielle Funktionen** auf  $\mathbb{R}$  mit  $Q \neq 0$ . Seien  $x_1, \dots, x_m$  die Nullstellen von  $Q$ .

Dann ist  $\frac{P}{Q} : \mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_m\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$  **stetig**.

**Satz 3.3.1** (**Zwischenwertsatz**, Bolzano 1817) Seien  $I \subseteq \mathbb{R}$  ein Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine **stetige Funktion** und  $a, b \in I$ . Für jedes  $c$  zwischen  $f(a)$  und  $f(b)$  gibt es ein  $z$  zwischen  $a$  und  $b$  mit  $f(z) = c$ .

**Definition 3.4.2** Ein Intervall  $I \subset \mathbb{R}$  ist **kompakt**, wenn es von der Form  $I = [a, b], \quad a \leq b$  ist.

**Lemma 3.4.3** Sei  $D \subseteq \mathbb{R}, x_0 \in D$  und  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  **stetig** in  $x_0$ . So sind  $|f|, \max(f, g), \min(f, g)$  **stetig** in  $x_0$ .

**Lemma 3.4.4** Sei  $(x_n)_{n \geq 1}$  eine **konvergente Folge** in  $\mathbb{R}$  mit Grenzwert  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in \mathbb{R}$ . Sei  $a \leq b$ .

Wenn  $\{x_n : n \geq 1\} \subseteq [a, b]$ , folgt:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in [a, b]$ .

**Satz 3.4.5** Sei  $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  **stetig auf einem kompakten Intervall I**. Dann gibt es  $u \in I$  und  $v \in I$  mit:  $f(u) \leq f(x) \leq f(v) \quad \forall x \in I$ . Insbesondere ist  $f$  **beschränkt**.

**Satz 3.5.1** Seien  $D_1, D_2 \subseteq \mathbb{R}, f : D_1 \rightarrow D_2, g : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$  und  $x_0 \in D_1$ . Wenn  $f$  in  $x_0$  und  $g$  in  $f(x_0)$  **stetig** sind, so ist  $g \circ f : D_1 \rightarrow \mathbb{R}$  in  $x_0$  **stetig**.

**Korollar 3.5.2** Wenn in **Satz 3.5.1**  $f$  auf  $D_1$  und  $g$  auf  $D_2$  **stetig** sind, ist  $g \circ f$  auf  $D_1$  **stetig**.

**Satz 3.5.3** Sei  $I \subseteq \mathbb{R}$  ein Intervall und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  **stetig, streng monoton**. Dann ist  $J := f(I) \subseteq \mathbb{R}$  ein Intervall und  $f^{-1} : J \rightarrow I$  ist **stetig, streng monoton**.

**Satz 3.6.1**  $\exp : \mathbb{R} \rightarrow ]0, +\infty[$  ist **streng monoton wachsend, stetig und surjektiv**.

**Korollar 3.6.2**  $\exp(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ . Aus der **Potenzreihendarstellung** von  $\exp$  folgt ausserdem:

$\exp(x) > 1 \quad \forall x > 0$ . Wenn  $y < z$  ist, folgt (aus 2.7.27)  $\exp(z) = \exp(y + (z - y)) = \exp(y) \exp(z - y)$  und da  $\exp(z - y) > 1$  ist folgt folgendes Korollar:

**Korollar 3.6.3**  $\exp(z) > \exp(y) \quad \forall z > y$

**Korollar 3.6.4**  $\exp(x) \geq 1 + x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

**Korollar 3.6.5** Der **natürliche Logarithmus**  $\ln : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  ist eine **streng monoton wachsende, stetige, bijektive Funktion**. Des weiteren gilt  $\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b \quad \forall a, b \in ]0, +\infty[$ .

**Korollar 3.6.6** (1) / (2) Für  $a > / < 0$  ist  $]0, +\infty[ \rightarrow ]0, +\infty[$ ,  $x \mapsto x^a$  eine **stetige, streng monoton**

**wachsende/fallende Bijektion**.  $\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall x > 0$ : (3)  $\ln(x^a) = a \ln(x)$  (4)  $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$  (5)  $(x^a)^b = x^{a \cdot b}$

**Definition 3.7.1** Die **Funktionenfolge**  $(f_n)_{n \geq 0}$  **konvergiert punktwise** gegen eine Funktion  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ , wenn  
 $\forall x \in D : f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ .

**Definition 3.7.3** (Weierstrass 1841) Die Folge  $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$  **konvergiert gleichmässig** in  $D$  gegen  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ , wenn gilt:  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$ , so dass:  $\forall n \geq N, \forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ .

**Satz 3.7.4** Sei  $D \subseteq \mathbb{R}$  und  $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$  eine **Funktionenfolge** bestehend aus (in  $D$ ) **stetigen Funktionen**, die (in  $D$ ) **gleichmässig gegen eine Funktion**  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  **konvergiert**. Dann ist  $f$  (in  $D$ ) **stetig**.

**Definition 3.7.5** Eine Funktionenfolge  $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$  ist **gleichmässig konvergent**, wenn  $\forall x \in D$  der Grenzwert  $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  **existiert und die Folge**  $(f_n)_{n \geq 0}$  **gleichmässig gegen**  $f$  **konvergiert**.

**Korollar 3.7.6** Die Funktionenfolge  $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$  **konvergiert genau dann gleichmässig** in  $D$ , wenn:  
 $\forall \varepsilon > 0 \exists N \geq 1$ , so dass  $\forall n, m \geq N$  und  $\forall x \in D : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ .

**Korollar 3.7.7** Sei  $D \subseteq \mathbb{R}$ . Wenn  $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$  eine **gleichmässig konvergente Folge stetiger Funktionen** ist, dann ist die Funktion  $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  **stetig**.

**Definition 3.7.8** Die **Reihe**  $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$  **konvergiert gleichmässig** (in  $D$ ), wenn die durch  $S_n(x) := \sum_{k=0}^n f_k(x)$  definierte Funktionenfolge **gleichmässig konvergiert**.

**Satz 3.7.9** Sei  $D \subseteq \mathbb{R}$  und  $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$  eine Folge **stetiger Funktionen**. Wir nehmen an, dass  $|f_n(x)| \leq c_n \forall x \in D$  und, dass  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$  **konvergiert**. Dann **konvergiert** die Reihe  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  **gleichmässig** in  $D$  und deren Grenzwert  $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  **ist eine in**  $D$  **stetige Funktion**.

**Definition 3.7.10** Die Potenzreihe  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$  hat **positiven Konvergenzradius**, wenn  $\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}$  existiert.

Der **Konvergenzradius** ist dann definiert als:  $\rho = +\infty$  für  $\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = 0$ ,  
 $\rho = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}}$  für  $\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} > 0$ .

**Satz 3.7.11** Sei  $\sum_{k=0}^{\infty}$  eine **Potenzreihe** mit **positivem Konvergenzradius**  $\rho > 0$  und  $f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ ,  $|x| < \rho$ .  
 Dann gilt:  $\forall 0 \leq r < \rho$  **konvergiert**  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$  **gleichmässig** auf  $[-r, r]$ , insbesondere ist  $f : ]-\rho, \rho[ \rightarrow \mathbb{R}$  **stetig**.

**Satz 3.8.1**  $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  und  $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sind **stetige Funktionen**.

**Satz 3.8.2** Sei  $z \in \mathbb{C}$  (1)  $\exp iz = \cos(z) + i \sin(z)$  (2)  $\cos(z) = \cos(-z)$  und  $\sin(-z) = -\sin(z)$

$$(3) \sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$(4) \sin(z+w) = \sin(z)\cos(w) + \cos(z)\sin(w), \cos(z+w) = \cos(z)\cos(w) - \sin(z)\sin(w)$$

$$(5) \cos^2(z) + \sin^2(z) = 1$$

**Korollar 3.8.3**  $\sin(2z) = 2\sin(z)\cos(z)$ ,  $\cos(2z) = \cos^2(z) - \sin^2(z)$

**Satz 3.9.1** Die **Sinusfunktion** hat auf  $]0, +\infty[$  **mindestens eine Nullstelle**. Sei  $\pi := \inf\{t > 0 : \sin t = 0\}$ .

$$(1) \sin \pi = 0, \pi \in ]2, 4[ \quad (2) \forall x \in ]0, \pi[: \sin x > 0 \quad (3) e^{\frac{i\pi}{2}} = i$$

**Korollar 3.9.2**  $x \geq \sin x \geq x - \frac{x^3}{3!} \quad \forall 0 \leq x \leq \sqrt{6}$

**Korollar 3.9.3** Sei  $x \in \mathbb{R}$  (1)  $e^{i\pi} = -1, e^{2i\pi} = 1$  (2)  $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos(x)$ ,  $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin(x)$

$$(3) \sin(x + \pi) = -\sin(x), \sin(x + 2\pi) = \sin(x) \quad (4) \cos(x + \pi) = -\cos(x), \cos(x + 2\pi) = \cos(x)$$

$$(5) \text{Nullstellen von Sinus} = \{k \cdot \pi : k \in \mathbb{Z}\} \quad \sin(x) > 0 \quad \forall x \in ]2k\pi, (2k+1)\pi[, k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin(x) < 0 \quad \forall x \in [(2k+1)\pi, (2k+2)\pi[, k \in \mathbb{Z}$$

$$(6) \text{Nullstellen von Cosinus} = \{\frac{\pi}{2} + k \cdot \pi : k \in \mathbb{Z}\} \quad \cos(x) > 0 \quad \forall x \in ]-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, -\frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi[, k \in \mathbb{Z}$$

$$\cos(x) < 0 \quad \forall x \in [-\frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi, -\frac{\pi}{2} + (2k+2)\pi[, k \in \mathbb{Z}$$

**Definition 3.10.1**  $x_0 \in \mathbb{R}$  ist ein **Häufungspunkt** der Menge  $D$ , wenn  $\delta > 0 : (]x_0 - \delta, x_0 + \delta[) \setminus \{x_0\} \cap D \neq \emptyset$ .

**Definition 3.10.3** Sei  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}$  ein **Häufungspunkt** von  $D$ . Dann ist  $A \in \mathbb{R}$  der Grenzwert von  $f(x)$  für  $x \rightarrow x_0$ , bezeichnet mit  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ , wenn  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ , so dass

$$\forall x \in D \cap (]x_0 - \delta, x_0 + \delta[ \setminus \{x_0\}) : |f(x) - A| < \varepsilon.$$

**Bemerkung 3.10.4** (1) Sei  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  und  $x_0$  ein **Häufungspunkt** von  $D$ . Dann gilt  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$  **genau**,

**dann wenn** für jede Folge  $(a_n)_{n \geq 1}$  in  $D \setminus \{x_0\}$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0$  folgendes gilt:  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A$ .

(2) Sei  $x_0 \in D$ . Dann ist  $f$  **genau dann stetig**, wenn  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ .

(3) Mittels (1) zeigt man leicht, dass wenn  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  und  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$  existieren:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f+g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \text{ und } \lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \text{ folgen.}$$



(4) Seien  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f \leq g$ . Dann folgt  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$  falls beide Grenzwerte existieren.

(5) Wenn  $g_1 \leq f \leq g_2$  und  $\lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g_2(x)$ , so existiert  $l := \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  und  $l = \lim_{x \rightarrow x_0} g_1(x)$ .

**Satz 3.10.6** Seien  $D, E \subseteq \mathbb{R}$ ,  $x_0$  Häufungspunkt von  $D$ ,  $f : D \rightarrow E$  eine Funktion. Wir nehmen an, dass  $y_0 := \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  existiert und  $y_0 \in E$ . Wenn  $g : E \rightarrow \mathbb{R}$  in  $y_0$  stetig ist, folgt:  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(y_0)$ .

## Kapitel 4

**Definition 4.1.1**  $f$  ist in  $x_0$  differenzierbar, wenn der Grenzwert  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$  existiert. Ist dies der Fall, wird der Grenzwert mit  $f'(x_0)$  bezeichnet.

**Bemerkung 4.1.2** Es ist oft von Vorteil in der Definition von  $f'(x_0)$ ,  $x = x_0 + h$  zu setzen, so dass:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

**Satz 4.1.3** (Weierstrass 1861) Sei  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in D$  Häufungspunkt von  $D$ . Folgende Aussagen sind

äquivalent: (1)  $f$  ist in  $x_0$  differenzierbar (2) Es gibt  $c \in \mathbb{R}$  und  $r : D \rightarrow \mathbb{R}$  mit:

$$2.1 \quad f(x) = f(x_0) + c(x - x_0) + r(x)(x - x_0) \quad 2.2 \quad r(x_0) = 0 \text{ und } r \text{ ist stetig in } x_0$$

Wenn dies zutrifft, ist  $c = f'(x_0)$  eindeutig bestimmt.

**Satz 4.1.4** Eine Funktion  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  ist in  $x_0$  genau dann differenzierbar, wenn es eine Funktion  $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}$  gibt, die in  $x_0$  stetig ist und  $f(x) = f(x_0) + \phi(x)(x - x_0) \quad \forall x \in D$ . In diesem Fall gilt:  $\phi(x) = f'(x)$ .

**Korollar 4.1.5** Sei  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  und  $x_0$  ein Häufungspunkt von  $D$ . Wenn  $f$  in  $x_0$  differenzierbar ist, ist  $f$  in  $x_0$  stetig.

**Definition 4.1.7**  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  ist in  $D$  differenzierbar, wenn für jeden Häufungspunkt  $x_0 \in D$ ,  $f$  in  $x_0$  differenzierbar ist.

**Satz 4.1.9** Sei  $D \subseteq \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in D$  ein Häufungspunkt von  $D$  und  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$  in  $x_0$  differenzierbar. Dann gelten:

(1)  $f + g$  ist in  $x_0$  differenzierbar und  $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$

(2)  $f \cdot g$  ist in  $x_0$  differenzierbar und  $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$

(3) Wenn  $g(x_0) \neq 0$  ist, ist  $\frac{f}{g}$  in  $x_0$  differenzierbar und  $(\frac{f}{g})'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$

**Satz 4.1.11** Seien  $D, E \subseteq \mathbb{R}$ , sei  $x_0 \in D$  ein Häufungspunkt, sei  $f : D \rightarrow E$  eine in  $x_0$  differenzierbare Funktion, so dass  $y_0 := f(x_0)$  ein Häufungspunkt von  $E$  ist und sei  $g : E \rightarrow \mathbb{R}$  eine in  $y_0$  differenzierbare Funktion. Dann ist  $g \circ f : D \rightarrow \mathbb{R}$  in  $x_0$  differenzierbar und  $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0)$

**Korollar 4.1.12** Sei  $f : D \rightarrow E$  eine bijektive Funktion, sei  $x_0 \in D$  ein Häufungspunkt. Wir nehmen an  $f$  ist in  $x_0$  differenzierbar und  $f'(x_0) \neq 0$ . Zudem nehmen wir an  $f^{-1}$  ist in  $y_0 = f(x_0)$  stetig. Dann ist  $y_0$  ein Häufungspunkt von  $E$ ,  $f^{-1}$  ist in  $y_0$  differenzierbar und  $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

**Definition 4.2.1** Sei  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $D \subseteq \mathbb{R}$  und  $x_0 \in D$ . (1) (2)  $f$  besitzt ein lokales Maximum [Minimum] in  $x_0$ , wenn  $\exists \delta > 0$  mit:  $f(x) \leq [\geq] f(x_0) \quad \forall x \in ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[ \cap D$

(3)  $f$  besitzt ein lokales Extremum in  $x_0$ , wenn es ein lokales Minimum oder Maximum ist.

**Satz 4.2.2** Sei  $f : ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in ]a, b[$ . Wir nehmen an,  $f$  ist in  $x_0$  differenzierbar.

(1) Wenn  $f'(x_0) > 0$  ist,  $\exists \delta > 0$  mit:  $f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in ]x_0, x_0 + \delta[ \quad f(x) < f(x_0) \quad \forall x \in ]x_0 - \delta, x_0[$

(2) Wenn  $f'(x_0) < 0$  ist,  $\exists \delta > 0$  mit:  $f(x) < f(x_0) \quad \forall x \in ]x_0, x_0 + \delta[ \quad f(x) > f(x_0) \quad \forall x \in ]x_0 - \delta, x_0[$

(3) Wenn  $f$  in  $x_0$  ein lokales Extremum besitzt, folgt  $f'(x_0) = 0$ .

**Satz 4.2.3** (Rolle 1690) Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und in  $]a, b[$  differenzierbar. Wenn  $f(a) = f(b)$ , so gibt es  $\xi \in ]a, b[$  mit:  $f'(\xi) = 0$ .

**Satz 4.2.4** (Lagrange 1797) Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und in  $]a, b[$  differenzierbar. Es gibt  $\xi \in ]a, b[$  mit:  $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ .

**Korollar 4.2.5** Seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und in  $]a, b[$  differenzierbar.

(1) Wenn  $f'(\xi) = 0 \quad \forall \xi \in ]a, b[$  ist, ist  $f$  konstant.

(2) Wenn  $f'(\xi) = g'(\xi) \quad \forall \xi \in ]a, b[$  ist, gibt es  $c \in \mathbb{R}$  mit:  $f(x) = g(x) + c \quad \forall x \in [a, b]$ .

(3) (4) Wenn  $f'(\xi) \geq [>] 0 \quad \forall \xi \in ]a, b[$  ist, ist  $f$  auf  $[a, b]$  [strikt] monoton wachsend.

(5) (6) Wenn  $f'(\xi) \leq [<] 0 \quad \forall \xi \in ]a, b[$  ist, ist  $f$  auf  $[a, b]$  [strikt] monoton fallend.

(7) Wenn es  $M \geq 0$  gibt, mit:  $|f'(\xi)| \leq M \quad \forall \xi \in ]a, b[$ , folgt  $\forall x_1, x_2 \in [a, b] : |f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|$ .

**Satz 4.2.9** (Cauchy) Seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und in  $]a, b[$  differenzierbar. Es gibt  $\xi \in ]a, b[$  mit:  $\frac{g(b) - g(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ . Wenn  $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in ]a, b[$  ist, folgt:  $g(a) \neq g(b)$  und

**Satz 4.2.10** (Bernoulli 1691/92, de l'Hôpital 1696) Seien  $f, g : ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar mit

$g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in ]a, b[$ . Wenn  $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = 0$  und  $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} =: \lambda$  existiert, folgt:

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

**Bemerkung 4.2.11** Der Satz gilt auch wenn:  $b = +\infty \quad \lambda = +\infty \quad x \rightarrow a^+$

**Definition 4.2.13** (1)  $f$  ist **konvex** (auf  $I$ ), wenn  $\forall x, y \in I, x \leq y$  und  $\lambda \in [0, 1]$  folgendes gilt:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

(2)  $f$  ist **streng konvex**, wenn  $\forall x, y \in I, x < y$  und  $\lambda \in ]0, 1[$  folgendes gilt:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

**Bemerkung 4.2.14** Sei  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  konvex. Ein einfacher Induktionsbeweis zeigt, dass  $\forall n \geq 1, \{x_1, \dots, x_n\} \subseteq I$  und  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  in  $[0, 1]$  mit  $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$  folgendes gilt:  $f(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$

**Lemma 4.2.15** Sei  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine beliebige Funktion. Die Funktion  $f$  ist genau dann konvex, wenn

$$\forall x_0 < x < x_1 \text{ in } I \text{ folgendes gilt: } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x}$$

**Satz 4.2.16** Sei  $f : ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$  differenzierbar.  $f$  ist genau dann (streng) konvex, wenn  $f'$  (streng) monoton wachsend ist.

**Korollar 4.2.17** Sei  $f : ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$  zweimal differenzierbar in  $]a, b[$ .  $f$  ist (streng) konvex, wenn  $f'' \geq 0$  (bzw.  $f'' > 0$ ) auf  $]a, b[$ .

**Definition 4.3.1** (1) Für  $n \geq 2$  ist  $f$   $n$ -mal differenzierbar in  $D$ , wenn  $f^{(n-1)}$  in  $D$  differenzierbar ist.

Dann ist  $f^{(n)} := (f^{(n-1)})'$  und nennt sich die  $n$ -te Ableitung von  $f$

(2)  $f$  ist  $n$ -mal stetig differenzierbar in  $D$ , wenn  $f$   $n$ -mal differenzierbar in  $D$  &  $f^{(n)}$  in  $D$  stetig ist.

(3) Die Funktion  $f$  ist in  $D$  glatt, wenn sie  $\forall n \geq 1$   $n$ -mal differenzierbar ist.

**Bemerkung 4.3.2** Es folgt aus Korollar 4.1.5, dass für  $n \geq 1$  eine  $n$ -mal differenzierbare Funktion  $(n - 1)$ -mal stetig differenzierbar ist.

**Satz 4.3.3** (analog zu Satz 4.1.9) Sei  $D \subseteq \mathbb{R}$  wie in Definition 4.3.1,  $n \geq 1$  und  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$   $n$ -mal differenzierbar in  $D$ . (1)  $f + g$  ist  $n$ -mal differenzierbar und  $(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$

(2)  $f \cdot g$  ist  $n$ -mal differenzierbar und  $(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$ .

**Satz 4.3.5** Sei  $D \subseteq \mathbb{R}$  wie in Definition 4.3.1,  $n \geq 1$  und  $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$   $n$ -mal differenzierbar in  $D$ . Wenn  $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in D$  ist, ist  $\frac{f}{g}$  in  $D$   $n$ -mal differenzierbar.

**Satz 4.3.6** Seien  $E, D \subseteq \mathbb{R}$  Teilmengen für die jeder Punkt Häufungspunkt ist. Seien  $f : D \rightarrow E, g : E \rightarrow \mathbb{R}$   $n$ -mal differenzierbar. Dann ist  $f \circ g$   $n$ -mal differenzierbar und  $(g \circ f)^{(n)}(x) = \sum_{k=1}^n A_{n,k}(x) (g^{(k)} \circ f)(x)$  wobei  $A_{n,k}$  ein Polynom in den Funktionen  $f', f^{(2)}, \dots, f^{(n+1-k)}$  ist.

**Satz 4.4.1** Seien  $f_n : ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktionenfolge wobei  $f_n$  einmal in  $]a, b[ \quad \forall n \geq 1$  stetig differenzierbar ist. Wir nehmen an, dass sowohl die Folge  $(f_n)_{n \geq 1}$  wie auch  $(f'_n)_{n \geq 1}$  gleichmäßig in  $]a, b[$  mit  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n =: f$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n =: p$  konvergieren. Dann ist  $f$  stetig differenzierbar und  $f' = p$ .

**Satz 4.4.2** Sei  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$  eine Potenzreihe mit pos. Konvergenzradius  $\rho > 0$ . Dann ist  $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k$  auf  $]x_0 - \rho, x_0 + \rho[$  differenzierbar und  $f'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} k c_k (x - x_0)^{k-1} \quad \forall x \in ]x_0 - \rho, x_0 + \rho[$ .

**Korollar 4.4.3** Unter der Voraussetzung von Satz 4.4.1 ist  $f$  auf  $]x_0 - \rho, x_0 + \rho[$  glatt und

$$f^{(j)}(x) = \sum_{k=j}^{\infty} c_k \frac{k!}{(k-j)!} (x - x_0)^{k-j}. \text{ Insbesondere ist } c_j = \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!}.$$

**Satz 4.4.5** Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und in  $]a, b[$   $(n + 1)$ -mal differenzierbar. Für jedes  $a < x \leq b$  gibt es  $\xi \in ]a, x[$  mit:  $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$ .

**Korollar 4.4.6** (Taylor Approximation) Sei  $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und in  $]c, d[$   $(n + 1)$ -mal differenzierbar. Sei  $c < a < d$ .  $\forall x \in [c, d] \exists \xi$  zwischen  $x$  und  $a$ , so dass:  $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$ .

**Korollar 4.4.7** Sei  $n \geq 0, a < x_0 < b$  und  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  in  $]a, b[$   $(n + 1)$ -mal stetig differenzierbar.

Annahme:  $f'(x_0) = f^{(2)}(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0$ .

(1) Wenn  $n$  gerade ist und  $x_0$  eine lokale Extremalstelle ist, folgt  $f^{(n+1)}(x_0) = 0$ .

(2) Wenn  $n$  ungerade ist und  $f^{(n+1)}(x_0) > 0$  ist, ist  $x_0$  eine strikt lokale Minimalstelle.

(3) Wenn  $n$  ungerade ist und  $f^{(n+1)}(x_0) < 0$  ist, ist  $x_0$  eine strikt lokale Maximalstelle.

**Korollar 4.4.8** Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und in  $]a, b[$  zweimal stetig differenzierbar. Sei  $a < x_0 < b$ .

Annahme:  $f'(x_0) = 0$ .

(1) Wenn  $f^{(2)}(x_0) > 0$  ist, ist  $x_0$  eine strikt lokale Minimalstelle.

(2) Wenn  $f^{(2)}(x_0) < 0$  ist, ist  $x_0$  eine **strikt lokale Maximalstelle**.

## Kapitel 5

**Definition 5.1.1** Eine **Partition** von  $I$  ist eine endliche Teilmenge  $P \subseteq [a, b]$  wobei  $\{a, b\} \subseteq P$ . Es gilt:  
 $n := \text{card } P - 1 \geq 1$  und es gibt **genau eine Bijektion**  $\{0, 1, 2, \dots, n\} \rightarrow P, j \mapsto x_j$  mit der Eigenschaft  
 $i < j \implies x_i < x_j$ .

Eine **Partition**  $P'$  ist eine **Verfeinerung** von  $P$ , wenn  $P \subset P'$ . Offensichtlich ist die **Vereinigung**  $P_1 \cup P_2$  zweier **Partitionen** wieder eine **Partition**. Insbesondere haben zwei **Partitionen** immer eine **gemeinsame Vereinigung**.  
 Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  eine **beschränkte Funktion**, das heisst es gibt  $M \geq 0$  mit  $|f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b]$ .

Sei  $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$  eine **Partition** von  $I$ . Insbesondere gilt:  $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$

**Länge des Teilintervalls**  $[x_{i-1}, x_i], \delta_i := x_i - x_{i-1}, i \geq 1$

**Untersumme**  $s(f, P) := \sum_{i=1}^n f_i \delta_i, \quad f_i = \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)$

**Obersumme**  $S(f, P) := \sum_{i=1}^n F_i \delta_i, \quad F_i = \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)$

**Lemma 5.1.2** (1) Sei  $P'$  eine **Verfeinerung** von  $P$ . Dann gilt:  $s(f, P) \leq s(f, P') \leq S(f, P') \leq S(f, P)$ .

(2) Für beliebige Partitionen  $P_1, P_2$  gilt:  $s(f, P_1) \leq S(f, P_2)$ .

Sei  $\mathcal{P}(I)$  die **Menge der Partitionen** von  $I$ . Wir definieren:  $s(f) = \sup_{P \in \mathcal{P}(I)} s(f, P), \quad S(f) = \inf_{P \in \mathcal{P}(I)} S(f, P)$ .

**Definition 5.1.3** Eine **beschränkte Funktion**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ist **(Riemann) integrierbar**, wenn  $s(f) = S(f)$ .

In diesem Fall bezeichnen wir den **gemeinsamen Wert** von  $s(f)$  und  $S(f)$  mit  $\int_a^b f(x) dx$ .

**Satz 5.1.4** Eine **beschränkte Funktion** ist genau dann integrierbar, wenn  $\forall \varepsilon > 0 \exists P \in \mathcal{P}(I): S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$ .

**Satz 5.1.8** (Du Bois-Reymond 1875, Darboux 1875) Eine **beschränkte Funktion**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ist **genau dann integrierbar**, wenn  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ , so dass:  $\forall P \in \mathcal{P}_\delta(I), S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$ .  
 Hier bezeichnet  $\mathcal{P}_\delta(I)$  die **Menge der Partitionen**  $P$ , für welche  $\max_{1 \leq i \leq n} \delta_i \leq \delta$ .

**Korollar 5.1.9** Die **beschränkte Funktion**  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  ist **genau dann integrierbar** mit  $A := \int_a^b f(x) dx$ ,  
 wenn:  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ , so dass  $\forall P \in \mathcal{P}(I)$  mit  $\delta(P) < \delta$  und  $\xi_1, \dots, \xi_n$  mit  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ,  
 $P = \{x_0, \dots, x_n\} | A - \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})| < \varepsilon$ .

**Satz 5.2.1** Seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  **beschränkt, integrierbar** und  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Dann sind  $f + g, \lambda \cdot f, f \cdot g, |f|, \max(f, g), \min(f, g)$  und (falls  $|g(x)| \geq \beta > 0 \quad \forall x \in [a, b]$ )  $\frac{f}{g}$  **integrierbar**.

**Bemerkung 5.2.2** Sei  $\phi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$  eine **beschränkte Funktion**. Dann ist

(\*)  $\sup_{x, y \in [c, d]} |\phi(x) - \phi(y)| = \sup_{x \in [c, d]} \phi(x) - \inf_{x \in [c, d]} \phi(x)$ . Einerseits gilt offensichtlich  $\forall x, y \in [c, d]$ :

$\phi(x) \leq \sup_{[c, d]} \phi, \quad \phi \geq \inf_{[c, d]} \phi$  also ist  $\phi(x) - \phi(y) \leq \sup_{[c, d]} \phi - \inf_{[c, d]} \phi$ , woraus durch vertauschen von  $x, y$  folgt:

$|\phi(x) - \phi(y)| \leq \sup_{[c, d]} \phi - \inf_{[c, d]} \phi$ . Andererseits sei  $\varepsilon > 0$ . Dann gibt es  $\xi \in [c, d]$  und  $\eta \in [c, d]$   $\phi(\xi) > \varepsilon$  und

$\phi(\eta) < \inf_{[c, d]} \phi + \varepsilon$  woraus  $\phi(\xi) - \phi(\eta) > \sup_{[c, d]} \phi - \inf_{[c, d]} \phi - 2\varepsilon$  folgt. Dies zeigt die Aussage (\*)

**Korollar 5.2.3** Seien  $P, Q$  Polynome und  $[a, b]$  ein **Intervall** in dem  $Q$  **keine Nullstelle** besitzt. Dann ist  
 $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$  **integrierbar**.

**Definition 5.2.4** Eine Funktion  $f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subseteq \mathbb{R}$  ist in  $D$  **gleichmässig stetig**, wenn

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \forall x, y \in D : |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$ .

**Satz 5.2.6** (Heine 1872) Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  **stetig** in dem kompakten Intervall  $[a, b]$ . Dann ist  $f$  in  $[a, b]$  **gleichmässig stetig**.

**Satz 5.2.7** Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  **stetig**. So ist  $f$  **integrierbar**.

**Satz 5.2.8** Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  **monoton**. So ist  $f$  **integrierbar**.

**Bemerkung 5.2.9** Seien  $a < b < c$  und  $f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$  **beschränkt** mit  $f|_{[a, b]}$  und  $f|_{[b, c]}$  **integrierbar**. Dann ist

$f$  **integrierbar** und (\*)  $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$ . In der Tat ergibt die **Summe einer Obersumme** (respektive **Untersumme**) für  $f|_{[a, b]}$  und  $f|_{[b, c]}$  eine **Obersumme** (respektive **Untersumme**) für  $f$ . Wir

erweitern jetzt die Definition von  $\int_a^b f(x) dx$  auf:  $\int_a^a f(x) dx = 0$  und wenn  $a < b, \int_b^a f(x) dx := -\int_a^b f(x) dx$ .  
 Dann gilt (\*) für alle Tripel  $a, b, c$  unter den entsprechenden Integrabilitätsvoraussetzungen.

**Satz 5.2.10** Sei  $I \subseteq \mathbb{R}$  ein **kompaktes Intervall** mit **Endpunkten**  $a, b$  sowie  $f_1, f_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$  **beschränkt integrierbar** und  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ . Dann gilt:  $\int_a^b (\lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x)) dx = \lambda_1 \int_a^b f_1(x) dx + \lambda_2 \int_a^b f_2(x) dx$ .

**Satz 5.3.1** Seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  **beschränkt integrierbar**, und  $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b]$ . Dann folgt:  
 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ .

**Korollar 5.3.2** Wenn  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  beschränkt integrierbar, folgt:  $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ .

**Satz 5.3.3** (Bunjakovski 1859, Cauchy 1821, Schwarz 1885: **Cauchy-Schwarz Ungleichung**) Seien

$f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  beschränkt integrierbar. Dann gilt:  $|\int_a^b f(x)g(x) dx| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx} \sqrt{\int_a^b g^2(x) dx}$ .

**Satz 5.3.4** (**Mittelwertsatz**, Cauchy 1821) Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. So  $\exists \xi \in [a, b]$ :  $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ .

**Satz 5.3.6** (Cauchy 1821) Seien  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  wobei  $f$  stetig,  $g$  beschränkt und integrierbar mit

$g \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$ . Dann gibt es  $\xi \in [a, b]$  mit:  $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$ .

**Satz 5.4.1** (**Fundamentalsatz der Analysis**) Seien  $a < b$  und  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Die Funktion

$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad a \leq x \leq b$  ist in  $[a, b]$  stetig differenzierbar und  $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$ .

**Definition 5.4.2** Sei  $a < b$  und  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Eine Funktion  $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  heisst **Stammfunktion** von  $f$ , wenn  $F$  (stetig) differenzierbar in  $[a, b]$  ist und  $F' = f$  in  $[a, b]$  gilt.

**Satz 5.4.3** (**Fundamentalsatz der Differentialrechnung**) Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. So gibt es eine **Stammfunktion**  $F$  von  $f$ , die bis auf eine additive Konstante eindeutig bestimmt ist und:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

**Satz 5.4.5** (**Partielle Integration**) Seien  $a < b \in \mathbb{R}$  und  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig differenzierbar. Dann gilt:

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x) dx.$$

**Satz 5.4.6** (**Substitution**) Sei  $a < b, \phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig differenzierbar,  $I \subseteq \mathbb{R}$  ein Intervall mit  $\phi([a, b]) \subseteq I$

und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion. Dann gilt:  $\int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\phi(t))\phi'(t) dt$ .

**Korollar 5.4.8** Sei  $I \subseteq \mathbb{R}$  ein Intervall und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig.

(1) Seien  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , so dass das abgeschlossene Intervall mit Endpunkten  $a+c, b+c \in I$ .

Dann gilt:  $\int_{a+c}^{b+c} f(x) dx = \int_a^b f(t+c) dt$ .

(2) Seien  $a, b, c \in \mathbb{R}$  mit  $c \neq 0$ , so dass das abgeschlossene Intervall mit den Endpunkten  $ac, bc \in I$ .

Dann gilt:  $\int_a^b f(ct) dt = \frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f(x) dx$ .

**Satz 5.5.1** Sei  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  eine Folge von beschränkten, integrierbaren Funktionen, die gleichmässig gegen eine Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  konvergiert. So ist  $f$  beschränkt integrierbar und  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$ .

**Korollar 5.5.2** Sei  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  eine Folge beschränkter, integrierbarer Funktionen, so dass  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$  auf  $[a, b]$  gleichmässig konvergiert. Dann gilt:  $\sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b (\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)) dx$ .

**Korollar 5.5.3** Sei  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$  eine Potenzreihe mit positivem Konvergenzradius  $\rho > 0$ . Dann ist für jedes  $0 \leq r < \rho$ ,  $f$  auf  $[-r, r]$  integrierbar und es gilt  $\forall x \in ]-\rho, \rho[$ :  $\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} x^{n+1}$ .

**Definition 5.8.1** Sei  $f : [a, \infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  beschränkt und integrierbar auf  $[a, b]$  für alle  $b > a$ . Wenn  $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$  existiert, bezeichnen wir den Grenzwert mit  $\int_a^{\infty} f(x) dx$  und sagen, dass  $f$  auf  $[a, +\infty[$  integrierbar ist.

**Lemma 5.8.3** Sei  $f : [a, \infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  beschränkt und integrierbar auf  $[a, b] \quad \forall b > a$ .

(1) Wenn  $|f(x)| \leq g(x) \quad \forall x \geq a$  und  $g(x)$  auf  $[a, \infty[$  integrierbar ist, ist  $f$  auf  $[a, \infty[$  integrierbar.

(2) Wenn  $0 \leq g(x) \leq f(x)$  und  $\int_a^{\infty} g(x) dx$  divergiert, divergiert auch  $\int_a^{\infty} f(x) dx$ .

**Satz 5.8.5** (McLaurin 1742) Sei  $f : [1, \infty[ \rightarrow [0, \infty[$  monoton fallend. Die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$  konvergiert genau dann, wenn  $\int_1^{\infty} f(x) dx$  konvergiert.

Eine Situation, die zu einem uneigentlichen Integral führt, ist wenn  $f : ]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  auf jedem Intervall  $[a + \varepsilon, b], \varepsilon > 0$  beschränkt und integrierbar ist, aber auf  $]a, b]$  nicht notwendigerweise beschränkt ist.

**Definition 5.8.8** In dieser Situation ist  $f : ]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  integrierbar, wenn  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$  existiert. In diesem

Fall wird der Grenzwert mit  $\int_a^b f(x) dx$  bezeichnet.

**Definition 5.8.11** Für  $s > 0$  definieren wir  $\Gamma(s) := \int_0^{\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$ .

**Satz 5.8.12** (Bohr-Mollerup) (1) Die Gamma Funktion erfüllt die Relationen:

$$(a) \Gamma(1) = 1 \quad (b) \Gamma(s+1) = s\Gamma(s) \quad \forall s > 0$$

$$(c) \gamma \text{ ist logarithmisch konvex, d.h. } \Gamma(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \Gamma(x)^\lambda \Gamma(y)^{1-\lambda} \text{ für alle } x, y > 0 \text{ und } 0 \leq \lambda \leq 1.$$

(2) Die Gamma Funktion ist die einzige Funktion  $]0, \infty[ \rightarrow ]0, \infty[$ , die (a), (b) und (c) erfüllt.

$$\text{Darüberhinaus gilt: } \Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! n^x}{x(x+1)\dots(x+n)} \quad \forall x > 0$$

**Lemma 5.8.13** Sei  $p > 1$  und  $q > 1$  mit  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . Dann gilt  $\forall a, b \geq 0$ :  $a \cdot b \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ .

**Satz 5.8.14** (**Hölder Ungleichung**) Seien  $p, q > 1$  mit  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . Für alle stetigen Funktionen  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  gilt:

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \|f\|_p \|g\|_q$$



**Satz 5.9.3** Seien  $P, Q$  Polynome mit  $\text{grad}(P) < \text{grad}(Q)$  und  $Q$  mit **Produktzerlegung**  $(*)$  Dann gibt es

$$A_{ij}, B_{ij}, C_{ij} \in \mathbb{R} \text{ mit: } \frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^{m_i} \frac{(A_{ij} + B_{ij}x)}{((x-a_i)^2 + \beta_i^2)^j} + \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \frac{C_{ij}}{(x-\gamma_i)^j}.$$

## Anhang A

**Satz A.0.1 (Binomialsatz)**  $\forall x, y \in \mathbb{C}, n \geq 1$  gilt:  $(x+y)^n = \sum_n kx^k y^{n-k}$ .

## 2 Wichtige Beispiele

**Ungerade und gerade Funktionen** Sei  $f(x)$  eine **gerade** Funktion. Dann:  $f(x) = f(-x)$ . Sei  $g(x)$  eine **ungerade** Funktion. Dann:  $-g(x) = g(-x)$ . Das **Produkt** von 2 **geraden** Funktionen ist **gerade**. Das **Produkt** von 2 **ungeraden** Funktionen ist **gerade**. Das **Produkt** einer **ungeraden** und einer **geraden** Funktion, ist **ungerade**. Für **ungerade** Funktionen gilt:  $\int_{-a}^a g(x) dx = 0$ . (Dies kann man sich graphisch vorstellen).

**Konvergenztest für Reihen** Gegeben:  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ .

(1) Spezieller Typ?

1.1 **Geometrische Reihe:**  $\sum q^n$ ? **Konvergent**, wenn:  $|q| < 1$ .

1.2 **Alternierende Reihe:**  $\sum (-1)^n a_n$ ? **Konvergent**, wenn:  $\lim a_n = 0$ .

1.3 **Riemann Zeta:**  $\zeta(s) = \sum \frac{1}{n^s}$  **Konvergent**, wenn:  $s > 1$ .

1.4 **Teleskopreihe**  $\sum (b_n - b_{n-1})$ ? **Konvergent**, wenn:  $\lim b_n$  existiert.

(2) Kein spezieller Typ:

2.1  $\lim a_n = 0$ ? Nein: **divergent**.

2.2 **Quotientenkriterium** anwendbar?

2.3 **Wurzelkriterium** anwendbar?

2.4 Gibt es eine **konvergente Majorante**?

2.5 Gibt es eine **divergente Minorante**?

2.6 Nichts von all dem?  $\Rightarrow$  **kreativ sein**.

**Beispiel 2.1.9**  $b \in \mathbb{Z} : \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^b = 1$ . Das folgt aus  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n}) = 1$  und wiederholter Anwendung von **Satz 2.1.8 (2) und (3)**.

**Beispiel 2.2.3** Sei  $a \in \mathbb{Z}$  und  $0 \leq q < 1$ . Dann gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^a q^n = 0$ . Wir können annehmen, dass  $q > 0$ . Sei

$x_n = n^a q^n$ ; dann folgt:  $x_{n+1} = (n+1)^a q^{n+1} = (\frac{n+1}{n})^a q \cdot n^a q^n = (1 + \frac{1}{n})^a \cdot q \cdot x_n$ . Also:  $x_{n+1} = (1 + \frac{1}{n})^a \cdot q \cdot x_n$ .

Da  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^a = 1$  (**Beispiel 2.1.9**), gibt es ein  $n_0$ , so dass  $(1 + \frac{1}{n})^a < \frac{1}{q} \quad \forall n \geq n_0$ . Es folgt:

$x_{n+1} < x_n \quad \forall n \geq n_0$ . Da für  $x_n > 0 \quad \forall n \geq 1$  die Folge nach **unten beschränkt** ist und für  $n \geq n_0$  **monoton fallend** ist. Sei  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^a \cdot q x_n = q \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = q \cdot l$ . Also  $(1-q) \cdot l = 0$  woraus  $l = 0$  folgt.

**Beispiel 2.7.2 (Geometrische Reihe)** Sei  $q \in \mathbb{C}$  mit  $|q| < 1$ . Dann konvergiert  $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$  und dessen Wert ist:  $\frac{1}{1-q}$ .

Sei  $S_n = \sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + \dots + q^n$ .  $q \cdot S_n = q + \dots + q^n + q^{n+1}$  woraus  $(1-q)S_n = 1 - q^{n+1}$  folgt. Es gilt

also:  $S_n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ . Nun zeigen wir die Konvergenz:  $|S_n - \frac{1}{1-q}| = |\frac{-q^{n+1}}{1-q}| = \frac{|q|^{n+1}}{|1-q|}$ . Es folgt aus **Beispiel 2.2.3**

und  $0 \leq |q| < 1$ :  $\lim_{n \rightarrow \infty} |S_n - \frac{1}{1-q}| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|q|^{n+1}}{|1-q|} = 0$ . Somit konvergiert  $(S_n)_{n \geq 1}$  gegen  $\frac{1}{1-q}$ .

**Beispiel 2.7.3 (Harmonische Reihe)** Die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  divergiert.

**Beispiel 2.7.18 (Exponentialfunktion)** Für  $z \in \mathbb{C}$  betrachte die Reihe:  $1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots$  mit allgemeinem Glied

$a_n = \frac{z^n}{n!}$ . Fann folgt für  $z \neq 0$ :  $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = |\frac{z^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{z^n}| = \frac{|z|}{n+1}$ . Also gilt:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = 0$  und die Reihe konvergiert

für alle  $z \in \mathbb{C}$ . Wir definieren die **Exponentialfunktion**:  $\exp z := 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$

**Anwendung 2.7.27 (Exponentialfunktion)**  $\forall z, w \in \mathbb{C} : \exp(w+z) = \exp(w) \exp(z)$ . Wir berechnen das Cauchy Produkt der

Reihen:  $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{w^i}{i!}, \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^j}{j!}$ . Dies ist:  $\sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{j=0}^n \frac{w^{n-j}}{(n-j)!} \frac{z^j}{j!})$  Woraus die Behauptung folgt.

**Allgemeine Potenzen** Wir können die Exponentialfunktion und den natürlichen Logarithmus verwenden, um allgemeine Potenzen zu definieren. Für  $x > 0$  und  $a \in \mathbb{R}$  beliebig definieren wir:  $x^a := \exp(a \ln x)$ .

Insbesondere:  $x^0 = 1 \quad \forall x > 0$ .

**Riemann Zeta Funktion** Sei  $s > 1$  und  $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ . Wir wissen, dass  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  konvergiert. Die Reihe konvergiert  $\forall s > 1$

**Trigonometrische Funktionen** Sinusfunktion für  $z \in \mathbb{C} : \sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}$ .

Kosinusfunktion für  $z \in \mathbb{C} : \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}$ .

Tangensfunktion für  $z \notin \frac{\pi}{2} + \pi \cdot \mathbb{Z}$ :  $\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$ . Cotangensfunktion für  $z \notin \pi \cdot \mathbb{Z}$ :  $\cot z = \frac{\cos z}{\sin z}$ .

**Hyperbelfunktionen**  $\forall x \in \mathbb{R}$ :  $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ .  $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ .  $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ .

Es gilt offensichtlich:  $\cosh x \geq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ ,  $\sinh x \geq 1 \quad \forall x \in ]0, +\infty[$ ,  $\sinh(0) = 0$ . Daraus folgt:  $\cosh$  ist auf  $[0, \infty[$  strikt monoton wachsend,  $\cosh(0) = 1$  und  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cosh x = +\infty$ . Also ist  $\cosh : [0, \infty[ \rightarrow [1, \infty[$  bijektiv. Deren Umkehrfunktion wird mit  $\operatorname{arcosh} : [1, \infty[ \rightarrow [0, \infty[$  bezeichnet. Unter Verwendung von  $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$  folgt:  $\operatorname{arcosh}' y = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}} \quad \forall y \in ]1, +\infty[$ .

Analog zeigt man, dass  $\sinh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  streng monoton wachsend und bijektiv ist. Dessen Umkehrfunktion wird mit  $\operatorname{arsinh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  bezeichnet und es gilt:  $\operatorname{arsinh}' y = \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}} \quad \forall y \in \mathbb{R}$ .

Für  $\tanh x$  folgt:  $\tanh' x = \frac{1}{\cosh^2 x} > 0$ . Also ist  $\tanh$  auf  $\mathbb{R}$  streng monoton wachsend und man zeigt, dass  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \tanh x = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh x = -1$ . Die Funktion  $\tanh : \mathbb{R} \rightarrow ]-1, 1[$  ist bijektiv. Ihre Umkehrfunktion wird mit  $\operatorname{artanh} : ]-1, 1[ \rightarrow \mathbb{R}$  bezeichnet. Es gilt dann:  $\operatorname{artanh}' y = \frac{1}{1 - y^2} \quad \forall y \in ]-1, 1[$ .

**Arcusfunktionen** Beispiel 4.2.6 (1)  $\arcsin$ : Da  $\sin' = \cos$  und  $\cos(x) > 0 \quad \forall x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  folgt aus Korollar 4.2.5 (4), dass die Sinusfunktion auf  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  strikt monoton wachsend ist. Also ist  $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$  bijektiv. Wir definieren  $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  als die Umkehrfunktion von  $\sin$ . Nach Korollar 4.1.12 ist sie auf  $] -1, 1[$  differenzierbar und für  $y = \sin x$ ,  $x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  folgt nach 4.1.12:  $\arcsin'(y) = \frac{1}{\sin'(x)} = \frac{1}{\cos x}$ . Wir verwenden nun:  $y^2 = \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$  woraus mit  $\cos x > 0$  folgt:  $\cos x = \sqrt{1 - y^2}$ . Wir erhalten also  $\forall y \in ]-1, 1[ \arcsin'(y) = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$ .

(2)  $\arccos$ : Eine analoge Diskussion, wie in (1) zeigt, dass  $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$  strikt monoton fallend ist und  $[0, \pi]$  auf  $[-1, 1]$  bijektiv abbildet. Sei:  $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$  die Umkehrfunktion. Sie ist auf  $] -1, 1[$  differenzierbar und  $\arccos'(y) = \frac{-1}{\sqrt{1 - y^2}} \quad \forall y \in ]-1, 1[$ .

(3)  $\arctan$ : Für  $x \notin \frac{\pi}{2} + \pi \cdot \mathbb{Z}$  hatten wir die Tangensfunktion definiert:  $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$  und deren Ableitung berechnet:  $\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x}$ . Also ist  $\tan$  auf  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  streng monoton wachsend mit  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$ ,

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$ . Also ist  $\tan : ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[ \rightarrow ]-\infty, \infty[$  bijektiv. Sei  $\arctan : ]-\infty, \infty[ \rightarrow ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  die

Umkehrfunktion. Dann ist  $\arctan$  differenzierbar und für  $y = \tan x$ :  $\arctan'(y) = \cos x = \frac{1}{1 + y^2}$ .

## 2.1 Ableitungen

$$(ax^z)' = azx^{z-1}$$

$$(x^x)' = (e^{x \ln x})' = (\ln(x) + 1)e^x$$

$$(x \ln x)' = \ln(x) + 1$$

$$e^{f(x)} = e^x$$

$$\sin' x = \cos x$$

$$\cos' x = -\sin x$$

$$\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\cot' x = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\ln' x = \frac{1}{x}$$

$$\arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$\arccos' x = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$\arctan' x = \frac{1}{1 + x^2}$$

$$\sinh' x = \cosh x$$

$$\cosh' x = \sinh x$$

$$\tanh' x = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

$$\operatorname{arsinh}' y = \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}} \quad \forall y \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{arcosh}' y = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}} \quad \forall y \in ]1, +\infty[$$

$$\operatorname{artanh}' y = \frac{1}{1 - y^2} \quad \forall y \in ]-1, 1[$$

## 2.2 Integrale

$$\int x^s dx = \frac{x^{s+1}}{s+1} + C \quad s \neq -1 \quad \int x^s dx = \ln x + C \quad s = -1$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sinh x dx = \cosh x + C$$

$$\int \cosh x \, dx = \sinh x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \arcsin x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \, dx = \operatorname{arsinh} x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \, dx = \operatorname{arcosh} x + C$$

$$\int e^x \, dx = e^x + C$$

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C \quad (\text{verwende } \ln x = \ln x \cdot 1)$$

$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$$

$$\int x^2 \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x$$

$$n \geq 1 \quad I_n = \int \sin^n x \, dx = -\frac{1}{n} \cos x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

$$\int (ax+b)^s \, dx = \frac{1}{a(s+1)} (ax+b)^{s+1} + C \quad s \neq -1 \quad \int (ax+b)^s \, dx = \frac{1}{a} \ln |ax+b| + C$$

### 2.3 Additionstheoreme

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

$$\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

$$\tan 3x = \frac{3 \tan x - \tan^3 x}{1 - 3 \tan^2 x}$$

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}$$

$$\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}$$

$$\tan^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$$

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2} (\cos(x-y) - \cos(x+y))$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} (\cos(x-y) + \cos(x+y))$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} (\sin(x-y) + \sin(x+y))$$

### 2.4 Grenzwerte

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^\alpha} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = \infty$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, |q| < 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} n^\alpha \cdot q^n = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[x]{x} = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^x = \dots$$