Lista de marcadores ativos e/ou analíticos

Aqui são apresentados os marcadores químicos de algumas espécies medicinais abordadas neste curso, definidos em literaturas oficiais (atualizadas em fevereiro/2026).

Espécie	Marcador
Achillea millefolium	As **flores** devem conter não menos do que 0,2% (v/p) de **óleo essencial**, e 0,02% de proazulenos expressos em chamazuleno[1]. As **partes aéreas** devem conter no mínimo 0,1% (v/p) de **óleo essencial**[1].
Actaea racemosa	Glicosídeos triterpênicos expressos em 23-epi-26-desoxiacteína[2].
Aesculus hippocastanum	A **droga vegetal** é constituída de **sementes** maduras e dessecadas contendo, no mínimo, 3,0% de glicosídeos triterpênicos, calculados como escina anidra[3]. A **tintura** é obtida a partir das **sementes** secas, contendo, no mínimo, 0,3% de glicosídeos triterpênicos expressos em escina anidra[3].
Allium sativum	Compostos sulfurados (aliina, alicina)[4].
Aloe vera	A **droga vegetal** consiste no **gel incolor, mucilaginoso,** obtido das células parenquimáticas de folhas frescas, contendo, no mínimo, 0,3% de carboidratos totais[3].
Alpinia zerumbet	O **extrato** deve conter 2,5% de flavonoides[5].
Baccharis trimera	A **droga vegetal** deve conter, mínimo, 1,7% de ácidos cafeicos totais, calculados como ácido clorogênico[3].
Calendula officinalis	A **droga vegetal** não deve conter menos que 0,4% de flavonoides totais, calculados como hiperosídeo, em relação ao material dessecado[2,3]. A **tintura** é obtida a partir de **flores secas**, contendo, no mínimo, 0,04% de flavonoides totais, expressos como hiperosídeo[3]. O **extrato fluido** é obtido a partir de **flores secas**, contendo, no mínimo, 0,4% de flavonoides totais, expressos como hiperosídeo[3].
Centella asiatica	Derivados triterpênicos pentacíclicos, expressos em asiaticosídeo[4]. A **droga vegetal** é constituída pelas **folhas secas**, contendo, no mínimo, 2,0% de glicosídeos ésteres triterpênicos (asiaticosídeo e madecassosídeo), em relação ao material dessecado[3].

Cinnamomum cassia	A **droga vegetal** consiste de **cascas secas,** contendo, no mínimo, 1,0% de óleo volátil, constituído por 70 a 90% de trans-cinamaldeído[3]. **Óleo volátil** obtido por hidrodestilação, a partir de **folhas e ramos jovens**[3] deve conter 90% de cinamaldeído[4].
Cinnamomum verum	A **droga vegetal** consiste de **cascas secas**, isentas da periderme e do parênquima cortical externo, provenientes do caule principal e de ramificações desse, contendo, no mínimo, 1,2% de óleo volátil contendo, no mínimo, 60% de trans-cinamaldeído[3]. A **tintura** é obtida a partir de **cascas secas**, contendo, no mínimo, 0,25% (p/p) de aldeído trans-cinâmico[3]. O **extrato fluido** é obtido a partir de **cascas secas**, contendo, no mínimo, 9,5% (p/p) de aldeído trans-cinâmico[3]. O **óleo volátil** obtido por hidrodestilação, a partir de **folhas**[3] deve conter, no mínimo, 65% de cinamaldeído[4].
Citrus aurantium	A **droga vegetal** é constituída por porções secas do **exocarpo**, correspondente ao flavedo do fruto maduro, isenta da maior parte do mesocarpo, que é o tecido branco esponjoso, correspondente ao albedo, contendo, no mínimo, 2% de óleo volátil[3]. A **tintura** é obtida a partir do **exocarpo**, correspondente ao flavedo do fruto maduro, isento da maior parte do mesocarpo, correspondente ao albedo, contendo, no mínimo, 0,25% de naringina[3]. O **extrato fluido** é obtido a partir de porções secas do **exocarpo**, correspondente ao flavedo do fruto maduro, isento da maior parte do mesocarpo, correspondente ao albedo, contendo, no mínimo, 2% de naringina[3]. O **óleo volátil** é obtido por procedimento mecânico adequado sem aquecimento a partir do **exocarpo** de frutos frescos, contendo, no mínimo, 92% de limoneno[3].
Crataegus spp.	A **droga vegetal** deve conter, no mínimo, 1,5% de flavonoides totais expressos como hiperosídeo, em relação à droga seca[3].
Curcuma longa	A **droga vegetal** deve conter, no mínimo, 2,5% de **óleo volátil** e, no mínimo, 2,5% de derivados do dicinamoilmetano expressos em curcumina[3]. A **tintura** é obtida a partir de **rizomas secos,** contendo, no mínimo, 0,25% de derivados do dicinamoilmetano expressos em curcumina[3].
Cymbopogon citratus	A **droga vegetal** é constituída de **folhas dessecadas** contendo, no mínimo, 0,5% de óleo volátil. O óleo volátil é constituído de, no mínimo, 60% de citral[3].

Cynara scolymus	A **droga vegetal** consiste de **folhas secas**, inteiras ou fragmentadas, contendo, no mínimo, 0,7% de ácido clorogênico[3]. O **extrato fluido** é obtido a partir de **folhas secas**, contendo, no mínimo, 0,7% de ácido clorogênico[3].
Echinacea angustifolia	**Raiz.** Alcamidas e poliacetilenos como principais constituintes bioativos[6].
Echinacea pallida	**Raiz.** Alcamidas e poliacetilenos como principais constituintes bioativos[7].
Echinacea purpurea	**Parte aérea fresca. Óleos essenciais** (0,08 a 0,32%) e ácido chicórico (1,2 a 3,1%), ou análise quantitativa de equinacosídeo, ácido chicórico, isobutilamidas, alcamidas e derivados do ácido cafeico[4,8]. Segundo a EMA, a qualidade e o uso clínico estão associados principalmente a suco prensado da planta fresca ou suco seco correspondente, padronizado em derivados fenólicos[9]. **Raiz.** O **extrato seco** etanólico (RDE 5,5–7,5:1; EtOH 45%) deve conter alcamidas como principais marcadores de qualidade; derivados fenólicos como constituintes secundários[10].
Echinodorus grandiflorus	A **droga vegetal** é constituída pelas **folhas secas** contendo, no mínimo, 2,8% de derivados do ácido *o*-hidroxicinâmico, expressos em verbascosídeo[3].
Eucalyptus globulus	O **óleo essencial** contém pelo menos 70% de 1,8-cineol (também conhecido como cineol ou eucaliptol)[2].
Foeniculum vulgare	A **droga vegetal** deve conter não menos do que 1,4% (v/p) de **óleo essencial**[11].
Frangula purshiana	A **casca fresca** contém antronas livres e deve ser seca por pelo menos 1 ano ou envelhecida artificialmente por calor ou aeração antes da utilização terapêutica. Todas as preparações padronizadas para conter 20 a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos calculados como cascarosídeo A[8]. A **droga vegetal** é constituída de **cascas secas de caules e ramos**, contendo, no mínimo, 8,0% de glicosídeos hidroxiantracênicos, dos quais, no mínimo, 60,0% são cascarosídeos, expressos como cascarosídeo A[3]. A **tintura** é obtida a partir de **cascas secas**, contendo, no mínimo, 0,75% de glicosídeos hidroxiantracênicos, dos quais, no mínimo, 60% são cascarosídeos, expressos como cascarosídeo A[3]. O **extrato fluido** é obtido a partir de **cascas secas**, contendo, no mínimo, 8,0% de glicosídeos hidroxiantracênicos, dos quais, no mínimo, 60% são cascarosídeos, expressos como cascarosídeo A[3].

Garcinia cambogia	**Fruto.** Ácido hidroxicítrico (HCA), presente no **pericarpo do fruto** em concentração de até 30% do peso. **Extratos.** Os comercialmente disponíveis geralmente contêm 50–60% de HCA[12–14].
Ginkgo biloba	A **droga vegetal** deve conter não menos do que 0,5% de flavonoides, calculados como flavonol glicosídeos, ou 0,2–0,4%, calculados como agliconas. Deve conter ginkgolídeos (até 0,23%) e bilobalídeos (até 0,26%)[4]. O **extrato padronizado** EGb761, que contém no mínimo 24% de flavonoides e 6% de ginkgolídeos, é usado na maioria dos ensaios clínicos e está presente na maioria das apresentações comerciais de *G. biloba*.
Glycine max	**Isoflavonas**[8,*] . **Extratos secos** de **sementes de soja**, de acordo com a RDE devem conter[15]: • RDE 100:400:1 (etanol 60–70%): 40% de isoflavonas totais (26% de genisteína); • RDE 47.61–190.47:1 (metanol 80%): 26% de isoflavonas totais; • RDE 43–53:1 (etanol 60%): 10% de isoflavonas (glicosídeos); • RDE 50–70:1 (etanol 60%): 30% de isoflavonas (glicosídeos). Comercialmente são encontrados extratos secos com 40% de isoflavonas totais[14].
Glycyrrhiza spp.	A **droga vegetal** consiste de **raízes e estolões secos**, inteiros ou fragmentados, contendo, no mínimo, 2,5% de ácido glicirrizínico, calculado em relação ao material dessecado[3]. Segundo a WHO, a droga vegetal consiste de raízes e rizomas secos e deve conter, no mínimo, 4% de glicirrizina (ácido glicirrízico, ácido glicirrizínico)[4]. O **extrato fluido** é obtido a partir de **raízes e estolões secos**, contendo, no mínimo, 2,5% (p/p) de ácido glicirrizínico[3].
Hamamelis virginiana	A **droga vegetal** consiste de **folhas secas**, inteiras ou fragmentadas, contendo, no mínimo, 3% de taninos, expressos em pirogalol[3]. Segundo a EMA, as folhas secas devem conter não menos do que 3% de taninos totais, expressos em pirogalol, e as cascas (colhidas na primavera) devem conter não menos do que 4% de taninos precipitáveis, expressos em pirogalol[16]. A **tintura** é obtida a partir das **folhas**, contendo, no mínimo, 0,6% de taninos totais, expressos em pirogalol[3]. O **extrato fluido** é obtido a partir de **folhas secas**, contendo, no mínimo, 3,0% de taninos (p/p) expressos em pirogalol[3].

* A composição de isoflavonas, que difere entre produtos, pode ser afetada pelo método de processamento. É comum se expressar o teor de isoflavonas sem especificar se a quantidade se refere ao valor de aglicona ou de glicosídeo. Esta distinção é crítica, uma vez que a quantidade de aglicona presente é aproximadamente 60% do peso total do glicosídeo. Assim, é importante definir a porção expressa porque, dessa forma, 100 mg de isoflavonas podem representar entre 60 e 100 mg de isoflavonas ativas, dependendo do produto.

Harpagophytum spp.	Iridoides totais expressos em harpagosídeo[8]. A **droga vegetal** deve conter não menos que 1,2% de harpagosídeo, utilizado como marcador químico principal, sendo recomendada a diferenciação botânica entre *H. procumbens* e *H. zeyheri*[3].
Hypericum perforatum	A **droga vegetal** deve conter não menos do que 0,08% de hipericinas, calculadas como hipericina[2].
Justicia pectoralis	A **droga vegetal** consiste de **folhas secas**, rasuradas ou pulverizadas, contendo, no mínimo, 0,2% de cumarina[3].
Lavandula angustifolia	**Óleos essenciais**[11], que devem conter 20–45% de linalol e 25–47% de acetato de linalila[17].
Lippia origanoides	Timol e carvacrol[18,19].
Matricaria chamomilla	A **droga vegetal** consiste de **capítulos florais secos**, contendo, no mínimo, 0,4% de óleo volátil, e, no mínimo, 0,25% de apigenina-7-*O*-glucosídeo[3]. A **tintura** é obtida a partir de **capítulos florais secos** contendo, no mínimo, 0,025% de apigenina-7-*O*-glicosídeo[3]. O **óleo volátil** é obtido por hidrodestilação, a partir de **inflorescências frescas ou secas**. São encontrados dois tipos de óleos voláteis de camomila que diferem por apresentar teores elevados de óxidos de bisabolol ou α-bisabolol[3]. O **extrato seco** deve conter 1,2% de apigenina[8].
Melaleuca alternifolia	O **óleo essencial**, obtido por hidrodestilação a partir de folhas e ramos terminais, deve conter não menos do que 30% (p/p) de terpinen-4-ol (4-terpineol)[3] e não mais do que 15% (p/p) de 1,8-cineol (eucaliptol)[2].
Melissa officinalis	A **droga vegetal** deve conter não menos do que 1% de ácido rosmarínico[2]. A **droga vegetal** deve conter **óleo essencial**, rico em aldeídos monoterpênicos (citral = neral + geranial), e derivados fenólicos, com destaque para o ácido rosmarínico, utilizado como marcador químico em preparações padronizadas[3].
Mentha × piperita	A **droga vegetal** deve conter, no mínimo, 1,2% de **óleo volátil** em folhas inteiras e, no mínimo, 0,9% de óleo volátil em folhas rasuradas[3], padronizado em 30% a 55% de mentol e 14% a 32% de mentona. Devem ser observados limites para pulegona, considerada marcador negativo de segurança[2].
Mikania spp.	A **droga vegetal** consiste nas **folhas secas**, contendo, no mínimo, 0,15% de cumarina[3].

Monteverdia ilicifolia	A **droga vegetal** deve conter, no mínimo, 2,0% de taninos totais, expressos em pirogalol, dos quais pelo menos 0,28% correspondem à epicatequina[3]. O **extrato** deve conter, no mínimo, 3,1% de taninos totais[5].
Oenothera biennis	Os limites de concentração do ácido linoleico e gama-linolênico precisam ser melhor estabelecidas. Entretanto, valores de, no mínimo, 60% e 7%, respectivamente, podem ser considerados[2].
Panax ginseng	A **droga vegetal** deve conter não menos do que 1,5% de saponinas, calculadas como ginsenosídeo Rg1[4].
Passiflora alata	A **droga vegetal** deve conter, no mínimo, 1,0% de flavonoides totais, expressos em apigenina[3].
Passiflora edulis	A **droga vegetal** deve conter, no mínimo, 1,0% de flavonoides totais, expressos em apigenina[3].
Passiflora incarnata	A **droga vegetal** deve conter não menos do que 1,5% de flavonoides totais, expressos em vitexina, e não mais do que 0,01% de alcaloides harmanos[11].
Paullinia cupana	A **droga vegetal** consiste de **sementes secas,** desprovidas de arilo e tegumento (casquilho), contendo, no mínimo, 4,0% de taninos totais, no mínimo, 5,0% de metilxantinas, e, no mínimo, 3,5% de cafeína[3]. A **tintura** é obtida a partir de **sementes secas**, desprovidas de arilo e tegumento (casquilho), contendo, no mínimo, 0,35% de cafeína[3]. O **extrato fluido** é obtido a partir de **sementes secas**, desprovidas de arilo e tegumento (casquilho), contendo, no mínimo, 3,5% de cafeína[3].
Peumus boldus	A **droga vegetal** consiste de **folhas secas**, contendo, no mínimo, 0,1% de alcaloides totais expressos em boldina[3]. Segundo a WHO, droga vegetal deve conter não menos que 0,25% de boldina, em relação ao material seco[4]. A **tintura** é obtida a partir de **folhas secas**, contendo, no mínimo, 0,01% de alcaloides totais expressos em boldina[3]. O **extrato fluido** é obtido a partir de **folhas secas**, contendo, no mínimo, 0,10% de alcaloides totais expressos em boldina[3].
Phyllanthus niruri	A **droga vegetal** deve conter, no mínimo, 6,5% de taninos totais e 0,15% de ácido gálico[3].
Plantago indica	Índice de intumescência e mucilagens (10–30%)[4,11].

Plantago major	As **folhas** contêm iridoides, com destaque para aucubina, além de mucilagens e flavonoides, utilizados como marcadores químicos para controle de qualidade da droga vegetal[3].
Plantago ovata	Índice de intumescência e mucilagens (10–30%)[4,11].
Psidium guajava	A **droga vegetal** deve conter não menos do que 14% de taninos (p/p) e não menos do que 0,6% de óleo essencial (v/p)[1].
Punica granatum	Taninos totais, não menos do que 10%[1].
Salix spp.	A **droga vegetal** deve conter, no mínimo, 1,5% de derivados de salicina expressos em salicina, podendo conter ainda polifenóis e flavonoides como marcadores secundários[1,3].
Sambucus spp.	A **flor** deve conter flavonoides totais (rutina, isoquercitrina)[2]. O **fruto** deve conter antocianinas totais (cianidina-3-glicosídeo, cianidina-3-sambubiosídeo)[2].
Schinus terebinthifolia	A **droga vegetal** consiste de **cascas secas do caule**, contendo, no mínimo, 8% de taninos totais, no mínimo, 0,20% de ácido gálico, e, no mínimo, 0,65% de catequina[3].
Senna alexandrina	A **droga vegetal** é constituída dos **folíolos secos** contendo, no mínimo, 2,5% de derivados hidroxiantracênicos expressos em senosídeo B, e 0,6% de senosídeo B e 0,5% de senosídeo A[3]. A **droga vegetal** consiste de **frutos secos** contendo, no mínimo, 2,2% de derivados hidroxiantracênicos expressos em senosídeo B e, no mínimo, 0,92% de senosídeo B e 0,49% de senosídeo A. Não deve ser utilizada antes de um ano após a colheita[3].
Serenoa repens	O **extrato** lipidoesterólico deve ser padronizado para conter 70–95% ácidos graxos livres e ésteres etílicos correspondentes.[2].
Silybum marianum	A **droga vegetal** consiste do **fruto maduro seco**, desprovido de papus, deve conter não menos do que 1,5% de silimarina, expressa em silibilina[20]. O **extrato seco** padronizado deve conter 70–80% de silimarina, expressa em silibina[11].
Solidago chilensis	Solidagenona[21 *apud* 14], ou flavonoides e diterpenos[22].
Stryphnodendron adstringens	A **droga vegetal** deve conter, no mínimo, 8% de taninos totais, expressos em pirogalol, dos quais no mínino 0,2 mg/g equivalem a ácido gálico e 0,3 mg/g correspondem a galocatequina, em relação à droga seca[3].

Symphytum officinale	Alantoína (**marcador ativo**) e mucilagens. **Marcador negativo:** alcaloides pirrolizidínicos[11].
Trifolium pratense	A **droga vegetal** deve conter pelo menos 0,5% de isoflavonas, calculadas como a soma das concentrações de daidzeína, genisteína, formononetina e biochanina A[1].
Uncaria spp.	Alcaloides oxindólicos (pentacíclicos e tetracíclicos), utilizados como marcadores de identidade química[2]. Os alcaloides oxindólicos pentacíclicos possuem atividade anti-inflamatória, enquanto os tetracíclicos têm ação no sistema nervoso central, podendo ser considerados marcadores indesejáveis.
Vaccinium macrocarpon	A **droga vegetal** consiste do **fruto fresco** e contém entre 13,6 e 171 mg/100 g de PAC[23]. Comercialmente são encontrados **extratos secos** padronizados com 25% de PAC[14].
Valeriana officinalis	A **droga vegetal** consiste dos órgãos subterrâneos (**raízes, rizomas e estolões), secos**, inteiros ou fragmentados, contendo, no mínimo, 0,3% de óleos essenciais e, no mínimo, 0,17% de ácidos sesquiterpênicos totais, expressos em ácido valerênico[3]. A **tintura** é obtida a partir dos órgãos subterrâneos (**raízes, rizomas e estolões), secos**, contendo, no mínimo, 0,015% (p/p) de ácidos sesquiterpênicos totais, expressos em ácido valerênico[3]. O **extrato fluido** é obtido a partir de órgãos subterrâneos (**raízes, rizomas e estolões**), secos, contendo, no mínimo, 0,15% de ácidos sesquiterpênicos totais, expressos em ácido valerênico[3].
Varronia curassavica	O **óleo essencial** deve conter no mínimo 2% de alfa-humuleno[24].
Vitex agnus-castus	Contém pelo menos 0,05% de agnusídeo e 0,08% de casticina[1].
Vitis vinifera	Flavonoides totais calculados como quercetina-3-O-beta-D-glucuronida; ou procianidinas totais[25].
Zingiber officinale	**Óleos voláteis** (pelo menos 2%): gingerois, shogaol, zingibereno, bisaboleno, sesquifelandreno e ar-curcumeno[4].

Referências bibliográficas

1. WHO. WHO Monographs on selected medicinal plants (Volume 4). 1. ed. Vol. 4. Geneva: World Health Organization; 2009. 456 p.
2. WHO. WHO Monographs on selected medicinal plants (Volume 2). 1. ed. Vol. 2. Geneva: World Health Organization; 1999. 357 p.
3. Brasil. Farmacopeia Brasileira (Volume II – Monografias, Plantas Medicinais). 7. ed. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 2024.
4. WHO. WHO Monographs on selected medicinal plants (Volume 1). 1. ed. Vol. 1. Geneva: World Health Organization; 1999. 289 p.
5. Brasil. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. 2. ed. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 2021. 223 p.
6. EMA. Community herbal monograph on Echinacea angustifolia DC., radix [Internet]. Vol. 44. 2012 [citado 28 de fevereiro de 2017]. p. 1–8. Disponível em: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_Community_herbal_monograph/2012/05/WC500127890.pdf.
7. EMA. Community Herbal Monograph on Echinacea pallida (Nutt.) Nutt., Radix [Internet]. 2009 [citado 28 de fevereiro de 2017]. Disponível em: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_Community_herbal_monograph/2009/12/WC500018248.pdf.
8. Brasil. Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. 1. ed. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 2016. 115 p.
9. EMA. European Union herbal monograph on Echinacea purpurea (L.) Moench, herba recens [Internet]. 2014 [citado 28 de fevereiro de 2017]. Disponível em: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_Community_herbal_monograph/2015/04/WC500185437.pdf.
10. EMA. European Union herbal monograph on Echinacea purpurea (L.) Moench, radix [Internet]. 2017 [citado 28 de fevereiro de 2017]. p. 7. Disponível em: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_Herbal_monograph/2017/08/WC500233238.pdf.
11. WHO. WHO Monographs on selected medicinal plants (Volume 3). 1st ed. Vol. 3. Geneva: World Health Organization; 2007. 390 p.
12. Mattes RD, Bormann L. Effects of (−)-hydroxycitric acid on appetitive variables. Physiol Behav. outubro de 2000;71(1–2):87–94.
13. Jena BS, Jayaprakasha GK, Singh RP, Sakariah KK. Chemistry and Biochemistry of (−)-Hydroxycitric Acid from *Garcinia*. J Agric Food Chem. 1º de janeiro de 2002; 50(1):10–22.
14. Saad G de A, Léda PH de O, Sá IM, Seixlack AC de C. Fitoterapia Contemporânea - Tradição e Ciência na Prática Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2021. 1–578 p.
15. EMA. Assessment report on Glycine max (L.) Merr., semen [Internet]. 2018 [citado 18 de junho de 2024]. Disponível em: https://www.fitoterapia.net/archivos/201809/wc500252713.pdf?1.

16. EMA. Assessment report on Hamamelis virginiana L., cortex and Hamamelis virginiana L., folium [Internet]. 2009 [citado 18 de junho de 2024]. Disponível em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/assessment-report-hamamelis-virginiana-l-cortex-hamamelis-virginiana-l-folium-hamamelis-virginiana-l-folium-et-cortex-aut-ramunculus-destillatum_en.pdf.
17. ISO International Standards. Oil of lavender (Lavandula angustifolia Mill.) [Internet]. ISO 3515:2002. 2002 [citado 19 de junho de 2024]. Disponível em: https://www.iso.org/standard/36253.html.
18. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência Tecnologia Inovação e Complexo da Saúde, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Lippia sidoides Cham., Verbenaceae (Alecrim-pimenta) [Internet]. Informações Sistematizadas da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS. Brasília: Ministério da Saúde; 2018 [citado 7 de janeiro de 2024]. p. 72. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/informacoes_sistematizadas_relacao_nacional_plantas_medicinais_interesse_sus_alecrim_pimenta.pdf.
19. Medeiros MGC. Contribuições tecnológicas para formas farmacêuticas a partir de óleos essenciais de Lippia sidoides Cham. e Lippia origanoides H.B.K. para tratamento das leishmanioses [Tese (Doutorado em Biotecnologia)]. [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará; 2011.
20. EMA. Assessment report on Silybum marianum (L.) Gaertn., Fructus [Internet]. 2018 [citado 18 de junho de 2024]. Disponível em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/final-assessment-report-silybum-marianum-l-gaertn-fructus_en.pdf.
21. Roque NF, Vilegas W, Gianella TL, Knudsen FS, Rondella GP, Torres LMB, et al. Compostas medicinais do Brasil. 2. Estudo químico de Solidago microglossa, Mikania triangularis, M. diversifolia, M. smilacina, M. microlepsis e Wedelia paludosa. Supl Acta Amazonica. 1988;18(1–2):473–6.
22. Souza DMF, Sá RD, Araújo EL, Randau KP. Anatomical, phytochemical and histochemical study of Solidago chilensis Meyen. An Acad Bras Cienc. agosto de 2018;90(2 suppl 1):2107–20.
23. EMA. Assessment report on Vaccinium macrocarpon Aiton, fructus [Internet]. 2022 [citado 18 de junho de 2024]. Disponível em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/final-assessment-report-vaccinium-macrocarpon-aiton-fructus_en.pdf.
24. Gilbert B, Alves LF, Favoreto R de F. Varronia curassavica (Cordia verbenacea). Em: Monografias de Plantas Medicinais Brasileiras e Aclimatadas: Volume II. Editora FIOCRUZ; 2022. p. 275–91.
25. Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C. Physician's Desk Reference (PDR) for Herbal Medicines. 4. ed. Connecticut: Thomson; 2007. 1034 p.