Exointerações bem documentadas entre produtos vegetais, fitoterápicos e medicamentos.

Fonte fitoquímica	Reduz a atividade de...
Vegetais crus	Fenacetina, cafeína
Hypericum perforatum L. (hipérico, Hypericaceae)	Ciclosporina, indinavir, varfarina, teofilina, digoxina, agentes psicotrópicos e narcóticos, anticoncepcionais
Allium sativum L. (alho, Amaryllidaceae)	Saquinavir
Fibras	Digoxina, lovastatina
Filoquinona (nos vegetais verdes)	Varfarina
Echinacea spp. (equinácea, Compositae)	Corticosteroides
Fonte fitoquímica	**Aumenta a atividade de...**
Sucos de *Citrus* spp. (laranja, limão etc., Rutaceae)	Felodipina, ciclosporina, eritromicina, etinil-estradiol, lovastatina, midazolam, saquinavir, terfenadina, triazolam, quinidina
Óleos vegetais	Albendazola, isotretinoína, griseofulvina, halofantrina
Gingko biloba L. (ginkgo, Ginkgoaceae), *Piper methysticum* G.Forst. (kava-kava, *Piperaceae*), *Echinacea* spp. (equinácea, Compositae)	Barbitúricos
Ginkgo biloba L. (ginkgo, *Ginkgoaceae*), *Panax ginseng* C.A.Mey. (ginseng coreano, *Araliaceae*)	Aspirina
Piperina (de *Piper nigrum L.*, pimenta-do-reino, Piperaceae)	Fenitoína, teofilina, propranolol

Allium sativum L. (alho, *Amaryllidaceae*)	Drogas anti-hipertensivas e antidiabéticas, aspirina, clopidogrel, varfarina
Crataegus spp. (cratego, Rosaceae)	Drogas anti-hipertensivas

Fonte: Adaptado de Lila e Raskin (2005).

Medicamentos convencionais e fitoterápicos afetados ou metabolizados pela isoenzima CYP1A2 do citocromo P450.

Indutores	Substrato*	Inibidores
Cannabis sativa L. (maconha, *Cannabaceae*)	Cafeína	*Boswellia serrata* Roxb. ex Colebr. (bosvélia, Burseraceae)
Salvia officinalis L. (sálvia, *Lamiaceae)*	Clomipramina	*Matricaria camomilla L.* (camomila, Compositae)
Glycyrrhiza glabra L. (alcaçuz, *Leguminosae)*	Clozapina	*Taraxacum officinale L.* (*syn. Taraxacum campylodes* G.E.Haglund., dente-de-leão, *Compositae)*
Hypericum perforatum L. (hipérico, *Hypericaceae)*	Duloxetina, frovatriptano, olanzapina, rasagilina, ropinirol, tacrina, teofilina, tizanidina, zolmitriptano	*Tanacetum parthenium* (L.) Sch.Bip. (tanaceto, Compositae) *Ginkgo biloba L.* (ginkgo, Ginkgoaceae)

Fonte: Adaptado de Williamsom *et al.* (2012). Legenda: *Demonstra ser clinicamente relevante nos estudos de interação fármaco-fármaco.

Medicamentos convencionais e fitoterápicos afetados ou metabolizados pela isoenzima CYP3A4 do citocromo P450.

Indutores	Substrato*	Inibidores
Echinacea spp. (equinácea, *Compositae)*	**Antiarrítmicos** (amiodarona, disopiramida, lidocaína oral, propafenona, quinidina)	*Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. (uva-de-urso, *Ericaceae)*

Ginkgo biloba L. (ginkgo, *Ginkgoaceae)* *Glycyrrhiza glabra L.* (alcaçuz, *Leguminosae)*	**Anticolinesterase**, ação central (donepezil, galantamina) **Anti-histamínico** (astemizol, terfenadina)	*Citrus × aurantium L.* (laranja-amarga, *Rutaceae)* *Actaea racemosa L.* (cimicífuga, *Ranunculaceae)*
Aspalathus linearis (Burm.f.) R.Dahlgren (rooibos, *Leguminosae*) *Hypericum perforatum L.* (hipérico, *Hypericaceae*)	Fármacos antienxaqueca (eletripano, derivados do ergot) Antineoplásicos (busulfan, ciclofosfamida, ifosfamida, imatinibe, irinotecan, tamoxifeno, taxanos, teniposide, toremifeno, vimblastina, vincristina) Antipsicóticos (pimozida, quetiapina) Azóis (itraconazol, voriconazol) Benzodiazepínicos e fármacos afins (alprazolam, triazolam, midazolam, buspirona, zolpidem, zopiclona) Bloqueadores dos canais de cálcio (diltiazem, felodipina, lercanidipina) Corticosteroides (budesonida, dexametasona, fluticasona, hidrocortisona, metilprednisona) Agonistas dopaminérgicos (bromocriptina, cabergolina) Hormônios (contraceptivos hormonais, estrógenos, progestógenos) Imunossupressores (ciclosporina, sirolimo, tacrolimo) Opioides (alfentanil, buprenorfina, fentanil, metadona) Inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil)	*Uncaria* spp. (unha-de-gato, *Rubiaceae)* *Vaccinium* spp. (blueberry, cranberry etc., *Ericaceae*) *Echinacea* spp. (equinácea, *Compositae*) *Tanacetum parthenium* (L.) Sch.Bip. (tanaceto, *Compositae*) *Allium sativum L.* (alho, *Amaryllidaceae)* *Ginkgo biloba L.* (ginkgo, *Ginkgoaceae*) *Panax ginseng* C.A.Mey. (ginseng coreano, *Araliaceae*) *Hydrastis canadensis* L. (hidraste, *Ranunculaceae*) *Citrus paradisi* Macfad. (toranja, *Rutaceae*) *Silybum marianum* (L.) Gaertn. (cardo-mariano, *Compositae*) *Piper nigrum* L. (pimenta-do-reino, *Piperaceae*) *Resveratrol* (presente em *Vitis vinifera* L., videira, *Vitaceae*) *Rhodiola rosea* L. *(syn. Sedum roseum (L.)* Scop., raiz-de-ouro, *Crassulaceae)* *Serenoa repens* (W.Bartram) Small *(saw palmetto, Arecaceae*) *Curcuma* longa L. (cúrcuma, *Zingiberaceae)*

	Inibidores da protease (amprenavir, atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir) Estatinas (atorvastatina, lovastatina, sinvastatina) Variados (aprepitant, bosentana, carbamazepina, cilotazol, cisaprida, delavirdina, dutasterisa, eplerenona, maraviroc, reboxetina, rofabutina, sibutramina, solifenacin, tolterodina)	

Fonte: Adaptado de Williamsom *et al*. (2012). Legenda: *Demonstra ser clinicamente relevante nos estudos de interação fármaco-fármaco.