

RELATÓRIO ULTRASSONOGRAFIA DA TIREÓIDE COM AVALIAÇÃO DOPPLER

Dados clínicos e motivo do exame: Avaliação da tireóide.

Exames anteriores: Disponível para comparação exame de 18/06/2020.

Técnica de exame: Utilizou-se transdutor linear, multifrequencial, de até 14 MHz para estudo tireoidiano e uso complementar de Doppler colorido. Paciente posicionada em decúbito dorsal, com hiperextensão cervical.

Os seguintes aspectos foram observados:

O padrão glandular é heterogêneo, identificando-se nódulos, descritos a seguir:

LOBO ESQUERDO:

No terço superior, nódulo heterogêneo com calcificação periférica, medindo 0,6 x 0,6 cm (padrão III de Chammas) (menor).

No terço inferior, nódulo hipoecoico, medindo 0,5 x 0,3 cm (padrão III de Chammas) (estável).

A tireóide apresenta contornos regulares e dimensões reduzidas.

Ao Doppler colorido a glândula apresenta vascularização habitual.

Medidas da glândula:

Lobo direito medindo 0,9 x 1,0 x 4,0 cm em seus eixos longitudinal, transversal e antero posterior respectivamente, com volume de 1,97 cm³.

Lobo esquerdo medindo 0,8 x 1,1 x 4,1 cm em seus eixos longitudinal, transversal e antero posterior respectivamente, com volume de 1,91 cm³.

O istmo mediu 1,0 x 1,2 x 0,2 cm de espessura em seus eixos transversal e antero posterior respectivamente, com volume de 0,18 cm³.

Volume total da tireoide de 4,06 cm³.

As regiões cervicais direita e esquerda apresentaram linfonodos de aspecto habitual, a direita medindo 1,4 cm e a esquerda medindo 0,8 cm, sem fluxo vascular anômalo ao Doppler colorido.

As glândulas submandibulares e parótidas apresentaram aspecto ecográfico normal.

Em relação ao exame anterior observa-se alterações no conteúdo do nódulo no terço superior do lobo esquerdo, apresentando agora conteúdo mais denso.

Impressão diagnóstica: Exame ultrassonográfico da tireoide evidencia nódulos no lobo esquerdo conforme descritos acima. Linfonodo cervical aumentado a direita de aspecto reacional.

Obs: Exame documentado em 2 páginas de papel fotográfico colorido, que deve ser guardado, bem como os demais e, todos devem ser fornecidos por ocasião das consultas médicas e exames de controle por imagem, para as análises comparativas. ***Fim do relatório da ultrassonografia tireoidiana.**



RICARDO ISSA
MÉDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
CRM: 67417 / SP