



RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA FACE

Contexto clínico:

Avaliar lesão em partes moles frontal à direita.

Técnica:

Exame de ressonância magnética da face realizado com aquisições multiplanares, pelas técnicas de spin-eco com sequências pesadas em T1, antes e após a administração endovenosa de contraste paramagnético, técnica de fast spin-eco pesada em T2 e difusão.

Análise:

Espessamento e obliteração das partes moles subgaleais frontal à direita, medindo cerca de 0,3 cm de espessura, de aspecto laminar, com baixo sinal em todas as sequências e sem realce pelo meio de contraste, com efeito de susceptibilidade magnética, que pode representar algum componente hemático crônico subgaleal, determinando abaulamento das partes moles superficiais, que apresentam com algumas estriações de permeio, mais provavelmente sequelar. Não foram caracterizadas lesões nodulares com realce bem definidas nesta topografia.

Irregularidades nos septo nasal, que podem estar relacionadas à septoplastia, a depender do contexto clínico.

Sinais turbinectomia parcial inferior bilateral (variação anatômica).

Discreto espessamento revestimento mucoso de todas as cavidades paranasais.

Rinofaringe de aspecto preservado.

Proeminência das paredes laterais da orofaringe e palato mole espessado, determinando redução da coluna aérea retropalatal.

Obliteração parcial dos planos mioadiposos superficiais da face, achados que podem resultar de alterações decorrentes de procedimento estético, no contexto clínico apropriado.


Glândulas parótidas e submandibulares sem alterações.

Não se evidenciam linfonodomegalias.

Não se observam realces anômalos focais.

Aspecto normal das estruturas orbitárias.





Aprovado por: Dr.(a) Luiz Ricardo Araujo Uchoa - CRM/SP 220106

Validado atualizado em: 10/06/2026 19:35:54

Versão do laudo: v.1

Laudo Validado

