

Paciente: PAULO AUGUSTO SILOTTO DIAS DE SOUZA
Médico: FABIO AUGUSTO DOS SANTOS WATANABE
Data: 31/03/2022 **Sexo:** M
Convenio: BRADESCO SAUDE

Ident.: 2609373
Data Nasc: 14/07/1961
Idade: 60 A 08 M
Usuário: 2609373
Senha: 19004



TC DE ABDOME SUPERIOR E PELVE

Técnica: Exame realizado em aparelho multislice com colimação de 2 mm, após administração de contraste oral e antes e após a injeção E.V. de contraste iodado, nas fases arterial, portal e excretora, com reconstruções nos planos axial, coronal e sagital.

Relatório:

Fígado de contornos levemente lobulados, apresentando textura homogênea, com densidade dentro dos limites normais, discreta redução de amplitude do lobo direito e sem dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas.

Pequeno espessamento da hemicúpula diafragmática direita em suas porções anterior e posterior.

Contornos levemente lobulados da hemicúpula diafragmática esquerda com pequeno espessamento da sua porção anterior.

Não se identifica imagem compatível com nódulo hepático pelo presente método de exame, observando-se maior lobulação na porção anterior do lobo esquerdo, inespecífica pelo método.

Diminuta imagem hipodensa pouco definida no segmento IVb do fígado, junto à estrutura vascular, com aproximadamente 4 mm, com densidade de -6 U.H., não se podendo descartar definitivamente a possibilidade de diminuto cisto pelo presente método.

Vesícula biliar com dimensões normais, não se identificando imagem cálcica sugestiva de cálculo no seu interior.

Veia porta com calibre normal, sem falhas de enchimento.

Baço com forma, contornos, densidade e dimensões normais.

Pâncreas com diminuição da espessura e substituição adiposa moderada, sem dilatação do Wirsung.

Gordura peripancreática conservada.

Estômago com volume normal e com passagem satisfatória do contraste para alças intestinais.

Adrenais com forma e dimensões normais.

Houve excreção simultânea do contraste por ambos os rins que apresentam forma e dimensões normais, de contornos levemente lobulados, com espessuras corticais preservadas.

Mínimo borramento das gorduras perirrenais (inespecífico).

Impregnação homogênea do contraste nos parênquimas renais, nas diferentes fases do exame, principalmente na fase portal.

Não se observa imagem cálcica sugestiva de cálculo calicinal.

Sistemas pielocalicinais com dimensões normais.

Paciente: PAULO AUGUSTO SILOTTO DIAS DE SOUZA
Médico: FABIO AUGUSTO DOS SANTOS WATANABE
Data: 31/03/2022 **Sexo:** M
Convenio: BRADESCO SAUDE

Ident.: 2609373
Data Nasc: 14/07/1961
Idade: 60 A 08 M
Usuário: 2609373
Senha: 19004



Ureteres com calibre normal e livres ao fluxo do contraste.

Não se observa imagem cálcica sugestiva de cálculo em trajeto ureteral.

Bexiga urinária de pequeno volume pelo presente exame, com espessamentos de suas paredes e contornos levemente irregulares.

Próstata levemente globosa, com impressão no assoalho vesical.

Para melhor avaliação da bexiga urinária e próstata pode ser complementada com estudo específico por US.

Pequenas calcificações na próstata.

Vesículas seminais sem alterações detectáveis ao método.

Não se detectam linfonodomegalias na região pélvica e na região periaortocava.

Gordura perirretal conservada.

Aorta e veia cava inferior com calibre normal.

Pequena calcificação ateromatosa na parede da aorta.

Ausência de ascite e derrame pleural.

Presença de gases e fezes no cólon e no reto.

Pequeno calibre do cólon descendente, do reto e do cólon sigmoide, limitando a avaliação de suas paredes.

Pequenos divertículos nos contornos do cólon descendente e sigmoide, não se observando borramento da gordura pericólica.

Apêndice cecal com calibre normal com ar no seu interior, sem borramento da gordura periapendicular.

Alças intestinais delgadas com calibre normal.

Atitude escoliótica lombar sinistroconvexa.

Alterações degenerativas acentuadas da coluna dorsolombar.

Para melhor avaliação da coluna pode ser indicado estudo específico com RM ou com TC.

Redução volumétrica da musculatura regional, principalmente paravertebral e nas regiões glúteas.

Granuloma calcificado no subcutâneo da região glútea do lado esquerdo.

Índice cardiotorácico dentro dos limites normais.

Moderada quantidade de gordura junto aos seios cardiofrênicos.

Paciente: PAULO AUGUSTO SILOTTO DIAS DE SOUZA
Médico: FABIO AUGUSTO DOS SANTOS WATANABE
Data: 31/03/2022 **Sexo:** M
Convenio: BRADESCO SAUDE

Ident.: 2609373
Data Nasc: 14/07/1961
Idade: 60 A 08 M
Usuário: 2609373
Senha: 19004



ID:

Fígado de contornos levemente lobulados, principalmente na região anterior do lobo esquerdo (inespecífico).

Diminuta imagem hipodensa mal definida no segmento IVb do fígado, junto à estrutura vascular, de etiologia a esclarecer (diminuto cisto?).

Moderada quantidade de gordura junto aos seios cardiofrênicos.

Discreta redução volumétrica do lobo hepático direito.

Espessamento discreto das porções anterior e posterior da hemicúpula diafragmática direita e da porção anterior da hemicúpula diafragmática esquerda.

Contornos lobulados nas hemicúpulas diafragmáticas, principalmente do lado esquerdo.

Substituição adiposa pancreática moderada.

Pequenina calcificação na parede da aorta.

Espessamento de paredes da bexiga urinária de contornos irregulares, próstata levemente globosa com impressão no assoalho vesical, não se identificando satisfatoriamente os limites da próstata com o assoalho vesical, podendo ser complementado com estudo específico.

Pequenas calcificações na próstata.

Diverticulose intestinal nos cólons descendente e sigmoide.

Alterações degenerativas acentuadas da coluna dorsolombar, com discopatia degenerativa acentuada em L4-L5.

Para melhor avaliação da coluna lombar pode ser realizado complementação com estudo específico de RM ou de TC.

Redução volumétrica da musculatura regional, principalmente paravertebral e regiões glúteas.

Pequeno granuloma calcificado no subcutâneo da região glútea esquerda.

Dr ° Rodney Jose Massa Ferro Ferraz
CRM: 38561-SP