


OCCLUSÃO ARTERIAL AGUDA — TEMPO É MÚSCULO

FLUXOGRAMA — 6 Ps E RUTHERFORD



QUANDO SUSPEITAR — OS 6 Ps

RECONHECIMENTO RÁPIDO

- Pain (dor): início súbito, intensa no membro afetado
- Pallor (palidez): pele pálida, cerosa
- Pulselessness: pulso distal ausente/diminuído (COMPARAR com o contralateral)
- Paresthesia: formigamento, dormência
- Paralysis: fraqueza/incapacidade de mover (isquemia crítica)
- Poikilothermia (frieira): membro frio. Início < 6h = melhor prognóstico

CLASSIFICAÇÃO DE RUTHERFORD

Classe	Achados	Conduta
I - Viável	Sem déficit motor/sensitivo; não ameaçado	Urgência (horas)
IIA - Marginal	Sem déficit motor, parestesia mínima	URGÊNCIA (< 6h)
IIB - Imediato	Fraqueza leve-moderada, perda sensitiva além dos dedos	EMERGÊNCIA (< 6h)
III - Irreversível	Paralisia completa, anestesia, rigidez muscular	Amputação

RED FLAGS — ISQUEMIA IRREVERSÍVEL (Rutherford III)

PROVÁVEL AMPUTAÇÃO

- Paralisia completa do membro + anestesia (perda total da sensibilidade)
- Rigidez muscular (contratura) — síndrome compartimental
- Marmóreo FIXO (livedo que não clareia à elevação)
- Rabdomiólise (urina escura, CPK elevada)
- Diagnóstico é CLÍNICO — não postergar conduta aguardando exames se isquemia grave

ETIOLOGIA — EMBOLIA x TROMBOSE

Característica	Embolia (50-60%)	Trombose (30-40%)
Início	Súbito, dor intensa imediata	Mais gradual (horas)
Claudicação prévia	Ausente	Presente (DAP crônica)
Membro contralateral	Pulsos normais	Pulsos diminuídos bilateral
Fonte/contexto	FA (80%), IAM, prótese, endocardite	Aterosclerose, tabagismo, DM, HAS

CONDUTA — EMERGÊNCIA VASCULAR**Rx MEDIDAS IMEDIATAS + HEPARINA**

2 acessos calibrosos, O₂ se SatO₂ < 94%, analgesia (morfina fracionada / dipirona)
Hidratação SF para manter diurese (prevenir rabdomiólise); JEJUM (provável cirurgia)
Membro em posição neutra ou levemente em DECLIVE (NÃO elevar); proteger/acolchoar
HEPARINA não fracionada JÁ (se sem contraindicação): bolus 80 UI/kg (máx 5.000) + 18 UI/kg/h em BIC
Alvo TTPA 1,5-2,5x; contraindicações: sangramento ativo, AVCh recente, plaq < 50.000
ACIONAR cirurgia vascular IMEDIATAMENTE — IIA/IIB = revascularizar em < 6h

SÍNDROME DE REPERFUSÃO (pós-revascularização)**ANTECIPAR E PREVENIR**

- Liberação de metabólitos: acidose metabólica, HIPERCALEMIA (arritmia/PCR), mioglobínúria (IRA), SDRA
- Síndrome compartimental -> fasciotomia
- Hidratação vigorosa (200-300 mL/h SF); monitorar K+ rigorosamente
- Alcalinização (bicarbonato 1-2 mEq/kg se acidose grave); considerar manitol 0,5 g/kg
- Manter diurese > 0,5 mL/kg/h

EXAMES (sem atrasar a conduta)**ENQUANTO MOBILIZA A CIRURGIA**

- Doppler arterial confirma ausência de fluxo e localiza — NÃO postergar tratamento para fazê-lo
- AngioTC/arteriografia: anatomia para planejar revascularização (se tempo permitir / no preparo)
- Laboratório: hemograma, coagulograma, ureia/creatinina, eletrólitos, CPK/mioglobina, gaso/lactato, ECG
- ECG: avaliar FA (fonte embólica); se suspeita de IAM, troponina + avaliação cardiológica

INTERNAÇÃO**TODOS OS CASOS INTERNAM**

- ☐ Classe I: internação para revascularização programada (horas)
- ☐ Classe IIA/IIB: UTI/centro cirúrgico imediato (< 6h)
- ☐ Classe III: internação para amputação ou cuidados
- ☐ Se FA: controle de FC e anticoagulação prolongada após cirurgia
- ☐ Monitorar K+, função renal e diurese (reperfusão)

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO (EMERGÊNCIA)

- OAA de ____ (membro/artéria), início há ____ h. Rutherford ____.
- Pulsos ____; temperatura ____; sensibilidade ____; motricidade ____.
- Etiologia provável: embólica/trombótica.
- Heparina iniciada (dose) / não iniciada (motivo). ECG: FA/sinusal.
- NECESSITA REVASCULARIZAÇÃO URGENTE. Janela: ____ h. Transferência IMEDIATA para cirurgia vascular.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com FA, dor súbita e intensa em MID, palidez, frialdade, ausência de pulso pedioso e parestesia mínima sem déficit motor. Classificação e conduta?

- A) Rutherford III — amputação imediata
- B) Rutherford IIA — heparinizar e revascularizar com urgência (< 6h)
- C) Rutherford I — observar ambulatorialmente
- D) Não é oclusão arterial — alta
- E) Trombose venosa — anticoagular e alta

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado caracteriza isquemia IRREVERSÍVEL (Rutherford III)?

- A) Parestesia mínima
- B) Paralisia completa + anestesia + rigidez muscular
- C) Pulso diminuído com dor leve
- D) Palidez isolada
- E) Claudicação intermitente

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual medida deve ser iniciada imediatamente na oclusão arterial aguda, salvo contraindicação?

- A) Elevar o membro afetado
- B) Heparina não fracionada (bolus + manutenção em BIC)
- C) Antibiótico de amplo espectro
- D) Trombolítico oral
- E) Compressão do membro

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Após a revascularização, o paciente pode desenvolver hipercalemia, mioglobínúria e acidose. Como se chama essa complicação e qual medida a previne?

- A) Síndrome de reperfusão — hidratação vigorosa e monitorização do potássio
- B) Choque séptico — antibiótico
- C) Embolia gordurosa — corticoide
- D) Síndrome nefrótica — albumina
- E) Crise tireotóxica — betabloqueador

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre embolia x trombose como causa de OAA, é correto:

- A) A embolia cursa com claudicação prévia e pulsos contralaterais diminuídos
- B) A embolia tem início súbito, sem claudicação prévia, frequentemente por FA, com pulsos normais no membro contralateral
- C) A trombose tem início abrupto sem fatores de risco
- D) Ambas têm exatamente a mesma apresentação
- E) A trombose nunca ocorre em ateroscleróticos

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Membro viável com parestesia mínima e sem déficit motor é Rutherford IIA (ameaçado marginal): heparinização imediata e revascularização urgente (< 6h). A fonte (FA) sugere embolia.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Rutherford III (irreversível) = paralisia completa + anestesia + rigidez muscular (e marmóreo fixo), indicando inviabilidade do membro e provável amputação.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na OAA, inicia-se heparina não fracionada de imediato (bolus 80 UI/kg + 18 UI/kg/h em BIC, salvo contraindicação) para evitar propagação do trombo e embolia distal, enquanto se aciona a cirurgia vascular.

QUESTÃO 4 → Resposta: A

A síndrome de reperfusão (acidose, hipercalemia, mioglobínúria, SDRA) ocorre após restaurar o fluxo. Previne-se com hidratação vigorosa, monitorização rigorosa do K+, alcalinização e atenção à síndrome compartimental.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A embolia (geralmente por FA) tem início súbito, sem claudicação prévia e com pulsos normais no membro contralateral; a trombose é mais gradual, em aterosclerótico com claudicação prévia e pulsos diminuídos bilateralmente.

SM24
Suporte ao Plantão Médico