


SUTURA — LIMPAR, ANESTESIAR, FECHAR

TIPOS DE FECHAMENTO — QUANDO USAR

Técnica	Indicação	Contraindicação
Sutura primária (1ª intenção)	Ferida limpa, <8h, sem contaminação (face: até 24h)	Ferida infectada, contaminada, esmagamento
Fechamento primário tardio (3ª intenção)	Ferida contaminada — limpar, desbridar, fechar em 3-5 dias	Sem desbridamento adequado
Cicatrização por 2ª intenção	Ferida infectada, mordidas, pé diabético, tecido desvitalizado	Necessidade de cobertura imediata
Grampos cirúrgicos	Couro cabeludo, tronco (rápido, seguro)	Face, mãos, pés, áreas com tensão alta
Fitas adesivas (Steri-Strip)	Feridas pequenas, superficiais, baixa tensão	Feridas com tração, áreas úmidas, infectada
Cola tissular (Dermabond)	Feridas superficiais, lineares <5cm, face, crianças	Feridas profundas, sujas, mordidas, alta tensão

ABORDAGEM — FERIDA NO PS



ANESTESIA LOCAL — LIDOCAÍNA

Parâmetro	Sem Epinefrina	Com Epinefrina
Concentração	1% ou 2%	1% ou 2% com epi 1:100.000
Dose máxima	4-5 mg/kg (sem epi)	7 mg/kg (com epi)
Duração	30-60 min	90-120 min (maior campo, menor sangramento)
Uso em extremidades	PODE usar — mito o contrário	PODE usar (pé, dedo, pênis) — evidência atual
Técnica de injeção	Lento, intradermal (menor dor); aspirar antes	Igual; esperar 7-10 min para vasoconstricção
Toxicidade (superdose)	Zumbido, gosto metálico, convulsão, PCR	Taquicardia, HAS, arritmia + tox. lidocaína

PONTOS DE SUTURA — RETIRADA E ALTA

QUANDO RETIRAR OS PONTOS

- Face: 5-7 dias (boa vascularização, cicatrização rápida)
- Couro cabeludo: 7-10 dias
- Tronco e abdome: 10-14 dias
- Membros superiores: 10-12 dias
- Membros inferiores: 12-14 dias (circulação mais lenta)
- Sobre articulações: 14 dias (tensão maior)

MORDEDURAS E FERIDAS ESPECIAIS

Mordidas — Animal e Humano

- Não fechar mordidas de animais (<8h): alto risco de infecção
- Exceção: face e pescoço — fechar após limpeza (cosméticos)
- ATB profilático: amoxicilina-clavulanato 875/125 mg 12/12h x 5-7d
- Humana = pior que animal (flora mista + Eikenella corrodens)
- Avaliar: antirábica + hepatite B + raiva segundo o animal
- Profilaxia pós-exposição (PEP): mordida de morcego, cão sem vacinação

Profilaxia Antitetânica

- Ferida limpa pequena: vacina se >5 anos da última dose
- Ferida suja (terra, fezes, >6h): vacina se >5 anos + Ig antitetânica se não vacinado
- Não vacinado ou esquema incompleto + ferida suja: Ig antitetânica 250 UI IM
- Sítio diferente da vacina se administradas juntas
- Toxoide tetânico 0,5 mL IM (deltóide)
- Registrar e completar esquema (3 doses)

TÉCNICA DE SUTURA SIMPLES INTERROMPIDA

PASSO A PASSO

- ☐ Anestesia local: lidocaína + epinefrina 1:100.000, injeção lenta na derme
- ☐ Irrigação: SF sob pressão com seringa de 20 mL + agulha 18G (150-200 mL/cm de ferida)
- ☐ Agulha: porta-agulha + pinça anatômica; entrar perpendicular à pele; sair simétrico
- ☐ Profundidade: incluir toda a derme e alguma hipoderme; evitar inverter bordas
- ☐ Tensão: mínima para aproximar sem estrangular (isquemia → necrose → deiscência)
- ☐ Espaçamento: 4-5 mm entre pontos na face; 8-10 mm em tronco/membros
- ☐ Curativo: não-aderente (petrolato) por 24-48h; manter limpo e seco

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com ferida por mordida de cão na mão, há 4 horas. Qual conduta é CORRETA?

- A) Fechar imediatamente com sutura primária
- B) Irrigação + desbridamento + NÃO fechar (2ª intenção ou fechamento tardio) + amoxicilina-clavulanato
- C) Fechar apenas com fitas adesivas
- D) Aguardar 24h e fechar cirurgicamente
- E) Antibiótico IV por 7 dias sem necessidade de limpeza

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente de 30 anos com corte linear na face de 3 cm, há 6 horas, limpo. Qual é o prazo máximo para sutura primária?

- A) 2 horas após o trauma
- B) 6 horas (mesmas regras do restante do corpo)
- C) Até 24 horas na face pela rica vascularização
- D) Não se fecha na face — apenas fitas
- E) 48 horas

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

O uso de lidocaína com epinefrina é CONTRAINDICADO em:

- A) Extremidades (dedos, pé)
- B) Face
- C) Pacientes com arritmia grave usando IMAO
- D) Couro cabeludo
- E) Palma da mão

QUESTÃO 4

SES-DF / Adaptada

Paciente NÃO vacinado contra tétano com ferida suja (terra). Qual é a profilaxia correta?

- A) Apenas toxoide tetânico 0,5 mL IM
- B) Toxoide tetânico + imunoglobulina antitetânica 250 UI IM em sítio diferente
- C) Apenas imunoglobulina antitetânica
- D) Penicilina benzatina profilática
- E) Não há indicação — apenas lavar bem a ferida

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Em quantos dias devem ser retirados os pontos de sutura em uma ferida no membro inferior?

- A) 5-7 dias (mesmo que na face)
- B) 7-10 dias
- C) 12-14 dias
- D) 21 dias
- E) Nunca — pontos absorvíveis são preferidos

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Mordida de animal na mão: NÃO fechar (alto risco infecção). Exceção: face. Lavar copiosamente, desbridar, ATB profilático (amoxicilina-clavulanato). Avaliar profilaxia rábica e antitetânica. Retornar em 48h para fechamento tardio se sem infecção.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Face: rica vascularização → resistência maior à infecção → pode fechar até 24h. Demais regiões: limite de 6-8h. Ferida suja: reduzir o tempo. Face é a exceção cosmética mais importante para sutura primária tardia.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Epinefrina é CONTRAINDICADA (relativa) quando há risco de interação com IMAO (hipertensão grave) ou em pacientes com arritmia grave ou doença coronariana severa não controlada. O uso em dedos/extremidades é SEGURO — o mito foi derrubado por estudos recentes.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Não vacinado + ferida suja: toxoide tetânico 0,5 mL IM + imunoglobulina antitetânica 250 UI IM em sítio contralateral. A Ig dá imunidade passiva imediata enquanto o toxoide promove imunidade ativa. Completar esquema de 3 doses.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Retirada de pontos: face 5-7d, couro cabeludo 7-10d, tronco 10-14d, MMSS 10-12d, MMII 12-14d, articulações 14d. Membros inferiores têm circulação mais lenta e maior tensão, exigindo mais tempo de cicatrização.

SM24
Suporte ao Plantão Médico