

Aula 07 – Filtragem espacial II

Prof. João Fernando Mari

<u>joaofmari.github.io</u>

joaof.mari@ufv.br

Roteiro




- Derivadas de funções discretas 1D
- O Laplaciano
- Variações do Laplaciano
- O Gradiente
- Operadores diagonais de Roberts
- Operadores de Prewitt e Sobel



DERIVADAS DE FUNÇÕES DISCRETAS 1D






Derivada de primeira ordem de uma função 1D f(x):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$






Derivada de primeira ordem de uma função 1D f(x):



$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$






Derivada de primeira ordem de uma função 1D f(x):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$





Derivada de primeira ordem de uma função 1D f(x):

I

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$



O LAPLACIANO

O Laplaciano



• O Laplaciano de uma função de duas dimensões f(x, y) é:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Se separarmos o Laplaciano nas direções x e y, temos:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1,y) + f(x-1,y) - 2f(x,y)$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x,y+1) + f(x,y-1) - 2f(x,y)$$

Dessa forma, o Laplaciano discreto de duas variáveis é:

$$\nabla^2 f = f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1) - 4f(x,y)$$

	-1	0	1
-1	0	1	0
0	1	-4	1
1	0	1	0

Variações do Laplaciano



	-1	0	1
-1	0	1	0
0	1	-4	1
1	0	1	0

	-1	U	
-1	1	1	1
0	1	-8	1
1	1	1	1

	-1	0	1
-1	-1	-1	-1
0	-1	8	-1
1	-1	-1	-1



O GRADIENTE

O gradiente



• O gradiente de uma função de duas dimensões f(x, y) é:

$$abla f \equiv \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} rac{\partial f}{\partial x} \\ rac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix},$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x, y) - f(x + 1, y), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = f(x, y) - f(x, y + 1)$$

• A magnitude (tamanho) do vetor gradiente (∇f) , M(x, y) é:

$$M(x,y) = mag(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

Ou pode ser aproximada por valores absolutos:

$$M(x,y) \approx |g_x| + |g_y|$$

0	1
1	0
-1	0

0

O gradiente – Operadores diagonais de Roberts



Os operadores diagonais de Roberts consideram as diferenças diagonais:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x,y) - f(x+1,y+1), \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = f(x+1,y) - f(x,y+1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = f(x+1,y) - f(x,y+1)$$

$$\begin{array}{c|cccc}
0 & 1 \\
0 & 0 & -1 \\
1 & 1 & 0
\end{array}$$

O gradiente – Operadores de Prewitt e Sobel



Prewitt:

Sobel:

Bibliografia



- MARQUES FILHO, O.; VIEIRA NETO, H. Processamento digital de imagens. Brasport, 1999.
 - Disponível para download no site do autor (Exclusivo para uso pessoal)
 - http://dainf.ct.utfpr.edu.br/~hvieir/pub.html
- GONZALEZ, R.C.; WOODS, R.E.; Processamento Digital de Imagens. 3ª edição. Editora Pearson, 2009.
- J. E. R. Queiroz, H. M. Gomes. Introdução ao Processamento Digital de Imagens. RITA. v. 13, 2006.
 - http://www.dsc.ufcg.edu.br/~hmg/disciplinas/graduacao/vc-2016.2/Rita-Tutorial-PDI.pdf



FIM