Fermentação de kombucha: efeito da temperatura

Este texto fictício, criado para testes, descreve um experimento conduzido pela pesquisadora Luísa Fontenele em um laboratório de microbiologia de alimentos, ao longo de 21 dias.

Metodologia

Foram preparados 30 frascos de chá preto adoçado com 70 gramas de açúcar por litro. Os frascos foram divididos em três grupos de 10, mantidos a 22, 27 e 32 graus Celsius. Cada frasco recebeu uma cultura simbiótica (SCOBY) de 40 gramas.

Medições

O pH foi medido nos dias 0, 7, 14 e 21. A acidez final desejada pelo estudo era um pH próximo de 3,0, considerado seguro e saboroso pelos avaliadores do laboratório.

Resultados

O grupo mantido a 27 graus atingiu pH 3,0 em 14 dias, o mais rápido entre os grupos. O grupo a 32 graus chegou a pH 2,6 em 21 dias, resultado considerado excessivamente ácido. O grupo a 22 graus só alcançou pH 3,4 ao final do experimento.

Discussão

A autora observou que a temperatura intermediária equilibrou velocidade e acidez. Ela alerta que frascos acima de 30 graus favoreceram o surgimento de manchas escuras no SCOBY em 4 dos 10 frascos.

Conclusão

Recomenda-se fermentar entre 26 e 28 graus Celsius por cerca de 14 dias para uso doméstico.